

**Asteraceae, Compositae**  
**Körbchenblütler**


**Zierpflanzen I im**  
**Botanischen Garten**  
**der Universität Tübingen**

**Zusammenstellung, Bilder und Texte  
von Franz Oberwinkler (© FO).  
Fakultative Ergänzung zur Vorlesung  
„Farne“ im Grundstudium an  
der Universität Tübingen im  
Sommersemester 2005.**

**Als Texte werden Gattungs- und Familien-Kurzdiagnosen verwendet. Es werden Arten angegeben die im Botanischen Garten Tübingen an unterschiedlichen Orten kultiviert werden.**

**Artnamen sind mit Autoren und vereinfachten Verbreitungsangaben (als Abkürzungen) versehen.**

# Zierpflanzen der Körbchenblütler im Botanischen Garten: (1), (2), (3)





(1)  
Asteraceen in  
Zierrabatten

(2)  
Asteraceen  
im System

(3)  
Asteraceen in  
Nordamerika

**ACHILLEA**  
**SCHAFGARBE**



**Achillea filipendulina**

**Achillea** L., *Schafgarbe*, ca. 200 NHem; aromatische Stauden mit gefiederten Blättern und scheindoldigen Blütenständen; einige Arten als Zierpflanzen verwendet; nach dem griechischen Helden Achilles benannt; Asteraceae-Anthemideae

abrotanoides Vis., WEu  
ageratifolia (Sibth. & Sm.) Boiss., Balk  
asplenifolia Vent., SO-Eu  
atrata L., M/O-Alp  
barbeyana Heldr. & Heimerl, Gri  
canescens Form., Monten/Alb/W-Gri  
chrysocoma Friv., Alb/Maz/KIAs  
clavenae L., *Steinraute*, S/N/NO-Alp  
clypeolata Sibth. & Sm., Balk, "Moonshine"  
collina Becker, M/SEu/N-Balk  
distan Waldst. & Kit., WAlp/Balk  
erba-rotta All. (herba-rotta), SW-Alp  
filipendulina Lam., Kauk/KIAs, "Coronation Gold"  
fraasii Schultz Bip., Gri/Alb  
grandifolia Friv., M-Balk  
holosericea Sibth. & Sm., Balk

x jaborneggii = clavenae x erba-rotta  
x kellereri = clypeolata x pseudopectinata  
x kolbiana = clavenae x umbellata  
leptophylla M.B., Naf  
x lewisii = clavenae x tomentosa  
lingulata Waldst. & Kit., Karp/N-Gri  
millefolium L., *Schafgarbe*, Eu/WAs/Iran, "Kirschkönigin"  
nana L., W-Alp/Apen  
nobilis L., SW/M/SEu/WAs  
pannonica Scheele, O-MEu/SO-Eu/Ruß  
ptarmica L., *Bertramsgarbe*; *Weißer Dorant*, Eu/WAs  
pyrenaica Sibth. & Godr., Pyr/S-Fra  
roseo-alba Ehrend., SEu  
serbica Nym., Alp/Z-Apen  
tomentosa L., SWEu/S-Alp/M-Ital  
umbellata Sibth. & Sm., Gri  
x wilczekii = ageratifolia x lingulata





**Achillea filipendulina**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 28.7.2002



**Achillea filipendulina**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 28.7.2002

**AGERATUM**



**Ageratum houstonianum**

**Ageratum** L., 43 neotrop; aufrechte Kräuter mit überwiegend gegenständigen, ungeteilten, gezähnten und gestielten Blättern; vielköpfige Blütenstände mit Röhrenblüten und 2/3reihigen, linealischen Hüllblättchen; Pappus aus 5-20 Schuppen; Gattung mit wichtigen Zierpflanzenarten und -hybriden; Name: Griech. agératos - nicht alternd, ewig jung; Asteraceae

conyzoides L., neotrop

corymbosum Zucc., Mex

houstonianum Mill. (mexicanum), *Leberbalsam*, Mex/Hond

Hybr. "Nordmeer"



**Ageratum houstonianum**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 4.8.2002

**ASTER**



**Aster novae-angliae**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 4.10.1985



**Aster** L., *Aster*, ca. 500 NAm/As/Eu/SAf; überwiegend ausdauernde, selten einjährige Kräuter mit einfachen und wechselständigen Blättern; Blütenköpfchen mit mehrreihigen, sich überlappenden, krautigen bis hautrandigen Hüllblättchen; Köpfchenboden ohne Spreublätter; die meisten Arten mit zungenförmigen, blauen, roten oder weißen, einreihigen, überwiegend weibliche Randblüten; Röhrenblüten gelb und zwittrig; Achänen glatt aber zusammengedrückt, mit ein- bis mehrreihigen Pappi aus kurz bewimperten Strahlen; mehrere Arten und Hybriden liefern hervorragende Zierstauden; Asteraceae

ageratoides = amellus

var. ovatus (Franch. & Sav.) Nakai, Jap

alpinus L., *Alpenaster*, M/OEu/W/Z/OAs/W-NAm

amellus L., *Bergaster*, M/SEu/Kauk/WAs/Sib, "Alba", "Breslau", "Dr. Otto Petschek", "Lady Hindlip", "Sternkugel", "Veilchenkönigin"

andersonii A.Gray, W-NAm

asteroides (DC.) O.Kuntze (Ikiangensis), Tib/W-Chi

azureus Lindl., O/S-NAm

bellidiastrum (L.) Scop., *Alpenmaßliebchen*, Jura//Alp/Apen/Karp

brachyactis Blake, W-USA

brachytrichus Franch., Chi

cordifolius L., O-NAm

diplostephioides (DC.) C.B.Clarke, Him/Tib/W-Chi

divaricatus L., O-NAm

dumosus L., Maine/Ont/Flor/Tex

dumosus-Hybr. = dumosus x novi-belgii, *Kissenastern*

ericoides L. (multiflorus), NAm/Mex

farrereri W.W.Sm. & Jeffrey, W-Chi/Tib

flaccidus Bunge, Afg/Him/N-Chi

x frikartii = amellus x thomsonii

himalaicus C.B.Clarke, Him/Chi

laevis L., NAm

lateriflorus (L.) Britt., O-NAm

linosyris (L.) Bernh., *Goldaster*, M-Ruß/M/W/SEu/NAf

lowrieanus Porter, O-NAm

macrophyllus L., O-NAm

mongolicus Franch., OAs

natalensis = Felicia rosulata

novae-angliae L., *Rauhblattaster*, NAm, "Barr's Blue"

novi-belgii L., *Glattblattaster*, O-NAm

oblongifolius Nutt., India/NDak/Wyom/NewM

parviceps (Burgess) Mackenz. & Bush, NAm

"Edi Niedermeier"

ptarmicoides (Nees) Torr. & A.Gray, N-NAm

puniceus L., NAm

pyrenaicus Desf., Pyr, "Lutetia"

schreberi Nees, O-NAm

sedifolius L. (acris), S/OEu/NAs

shortii Lindl., O-NAm

sibiricus L., Norw/N-Ruß/Sibir/OAs/NW/W-NAm

simplex Willd., NAm

var. rarissimus (Torr. & A.Gray) Cronq., Virg/Mont

stracheyi Hook.f., W-Him

tataricus L.f., Ruß/Sib/Mand/Chi/Jap

thomsonii C.B.Clarke, W-Him

tibeticus Hook.f., Tib/Him

tongolensis Franch. (subcaeruleus), W-Chi

tradescantii L. (parviflorus), O-NAm

tripolium L., *Strandaster*, Eu/As

trinervius = ageratoides, amellus

umbellatus Mill., O-NAm

vimineus Lam., O-NAm

yunnanensis Franch., Yunn/SO-Tib

**BELLIS**  
**GÄNSEBLÜMCHEN**



**Bellis perennis Hybrid**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 18.3.2003

**Bellis** L., *Maßliebchen*, ca. 10 Eu/As; zumeist ausdauernde, aber auch einjährige Kräuter mit Basalrosetten und kurzen Ausläufern; Köpfchen einzeln, gestielt, zierlich bis dekorativ (Name: Lat. bellus - schön), mit weiß bis rosa Strahlenblüten und gelben Röhrenblüten; als früh blühende Zwergstauden beliebt und häufig in gefüllten Sorten verwendet; Asteraceae

perennis L., *Gänseblümchen*, Eu/Syr/KIAs

"Pomponette Rosa", "Pomponette Rot",

"Pomponette Weiß", "Weißer Teppich"

rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reut., NAf/S-Span



**Bellis perennis Hybrid**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 18.3.2003

**CATANANCHE**  
**RASSELBLUME**



**Catananche caerulea, Rasselblume**

**Catananche** L., *Rasselblume*, 5 Med; einjährige und ausdauernde Kräuter mit einfachen und schmalen, basal gehäuften Blättern; Köpfchen von mehrreihigen, trockenhäutigen Hüllblättchen umgeben (deutscher Name); Blüten blau, selten gelb oder weiß, nur zungenförmig; Name: Griech. katanagke - Zwang, Zwangsmittel, hier im Sinne von Liebestrank, der aus diesen Pflanzen bereitet wurde; Asteraceae  
caerulea L. SW-Eu/NW-Af



**CENTAUREA**  
**FLOCKENBLUME**



***Centaurea macrocephala***

**Centaurea** L. *Flockenblume*, 500-600 Eu/SW-As, bes. Med, einige Af/N/SAm;  
einjährige bis ausdauernde Kräuter, seltener Sträucher mit einfachen bis fiederspaltigen und wechselständigen Blättern; Hüllblättchen dachig und hautrandig, mit artspezifischen Anhängseln; Blütenboden spreuschuppig; Röhrenblüten zwittrig; randliche Strahlenblüten steril; Achänen zusammengedrückt mit zwei- bis mehrreihigem Pappus aus federigen Haaren oder Schuppen; nach einem der griechischen Zentauren benannt, der die Heilkräfte von Flockenblumen erkannt haben soll; Asteraceae

alpestris Hegetschw., M/SEu Gbg  
arbutifolia Svent., GranC  
aspera L., SEu  
bella Trautv., Kauk  
cyanus L., *Kornblume*, Med (Eu eingebürgert)  
dealbata Willd., NAm, "Steenbergii"  
grineensis Reut., S-Alp  
jacea L., NW-Af/Eu/KIAs/Kauk/NAs  
macrocephala Puschk., Arm/Kauk  
maculosa Lam., SEu  
montana L., M/SEu  
nervosa Willd., Alp/Karp  
pannonica (Heuff.) Simonkai, M/SO-Eu/Ruß  
phrygia L., O-MEu/M-Rußl  
pseudophrygia C.A.Mey., Alp/Balk/MEu/S-Skan  
pulcherrima Willd., KIAs/Kauk  
rhaetica Moritzi, Garda, Schw: Mittelbünden  
rhenana Boreau, M/SO-Eu/Ruß  
rupestris L., Ital/Balk  
salicifolia M.B., Kauk/Anat  
scabiosa L., Eu/As  
solstitialis L., Med/Iran  
transalpina Schleich., S-Alp  
triumfetti All., SO-Eu  
uniflora L., W-Alp  
vallesiaca (DC.) Jord., Schw



**Centaurea montana**

**CHRYSOGONUM**  
**GOLDKÖRBCHEN**



**Chrysogonum virginianum, Goldkörbchen**

**Chrysogonum** L., *Goldkörbchen*, 1; behaarte Staude mit langen, beblätterten Ausläufern, einfachen, grob gezähnten, gestielten, gegenständigen Blättern und ziemlich großen Köpfchen mit 5 dreispitzigen, gelben Strahlen- und vielen Röhrenblüten (Name: Griech. chrysós - golden, góny, gónatos - gekniet); als Zierstaude verwendbar; Asteraceae

virginianum L., Pen/Ohio/Flor/Alab



**Chrysogonum virginianum, Goldkörbchen**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 26.5.1985



**COSMOS**

**COSMEA**



**Cosmos bipinnatus**

**Cosmos** Cav., *Cosmea*, *Schmuckkörbchen*, ca. 25 Am; einjährige oder ausdauernde Kräuter mit fiederteiligen, gelappten oder auch einfachen, gegenständigen Blättern, lang gestielten, einzelnen oder wenigköpfigen Infloreszenzen; Hüllblättchen 2reihig und basal verwachsen; Körbchen flach, mit attraktiven (Name: Griech. kósmos - Schönheit, Schmuck), sterilen Strahlenblüten und zwittrigen Röhrenblüten; Achänen schmal, geschnäbelt mit meist 2-4, rückwärts behaarten Pappus-Grannen; häufig als einjährige Zierpflanzen verwendet; Asteraceae

bipinnatus Cav., Mex

diversifolius Otto, Mex

**ECHINACEA**  
**IGELKOPF**  
**SONNENHUT**



**Echinacea purpurea**

Bad Reichenhall  
© FO, 28.7.2002

**Echinacea** Moench, *Igelkopf*, *Sonnenhut*, 9 M/O-NAm; winterharte Stauden mit mächtigen, schwarzen Wurzeln, aufrechten Stengeln, einfachen, wechselständigen Blättern und einzeln stehenden, großen Köpfchen; Köpfchenboden konisch, mit vorstehenden Spreuschuppen (Name: Griech. échinos - Igel); Zungenblüten purpur bis rosa, selten weißlich, steril, am Köpfchen verbleibend und vertrocknend; als Gartenzierstauden, besonders mit verschiedenen Zuchtformen verwendet; Asteraceae

*angustifolia* DC., NAm

*laevigata* Blake (*Brauneria* l.), NAm

*pallida* (Nutt.) Nutt., USA

*purpurea* (L.) Moench (*Rudbeckia* p.), M/SO-USA

**ECHINOPS**  
**KUGELDISTEL**



**Kugeldistel, *Echinops sphaerocephalus***

Bad Reichenhall  
© FO, 28.7.2002



**Echinops** L., *Kugeldistel*, ca. 120 Eu/SW/ZAs/OAf;  
distelartige Stauden mit fiederschnittigen, unterseits  
weiß-filzigen, stacheligen, wechselständigen Blättern;  
Köpfchen einblütig, zu kugeligen Gesamtinfloreszenzen  
zusammengelagert (Name: Griech. échinos - Igel, -  
opsis - ähnlich); Kronen röhrig, tief gespalten; Antheren  
basal bärtig; Achänen 5kantig, seidig behaart; Pappus  
aus bewimperten Schuppen gebildet; mehrere Arten als  
Zierpflanzen verwendet; Asteraceae  
ritro L., S/O/O-MEu/O-Ruß  
sphaerocephalus L., *Kugeldistel*, Pyr/Alp/Kauk/S-Sib

**EUPATORIUM  
WASSERDOST**



**Eupatorium purpureum, Purpur-Wasserhanf**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 29.9.2002

**Eupatorium** L., *Wasserdost*, 38 O-NAm/As/Eu (im weiteren Sinne ca. 500 bes. neotrop); Stauden mit gegenständigen Blättern und wenigblütigen Köpfchen in doldigen Rispen; Hüllen zylindrisch, mit dachziegelartig angeordneten Hüllblättern; Köpfchenboden flach, ohne Spreublätter; Blüten zwittrig; Kronen röhrig, rötlich bis blau; Achänen 5kantig mit weißborstigen Pappi; giftig durch Eupatoriopikrin und Pyrrolizidinalkaloide (Echinatin, Supinin); möglicherweise nach König Mithridates Eupator († 63 v.Chr.) benannt, der den Wasserdost gegen Leberleiden verwendet haben soll;

### Asteraceae

album L., O-NAm

altissimum L., Pen/Misso/Tex

aromaticum L., Mass/Flor

bogotense DC., Kol

cannabinum L., *Wasserhanf*, Eu/NAf/WAs/W-Sib

coelestinum L., NewJ/Kans/Flor/Tex

glaucum Schultz Bip., Mex

incarnatum Walt., Virg/Flor/Mex

maculatum L., NAm

perfoliatum L., Queb/Mani/Flor/Tex

purpureum L., NewH/Mani/Flor/Tex

rugosum Houtt., Queb/Sask/Virg/Geor/Flor/Tex

sordidum Less. (ianthinum), Mex



**Eupatorium purpureum, Purpur-Wasserhanf**

**EURYOPOS**



**Euryops pectinatus**

**Euryops** Cass., 100 S/OAf/Arab, bes. SAf; Sträucher und Halbsträucher, selten Stauden und Annuelle mit dicht sitzenden, wechselständigen, rosettigen bis büscheligen Blättern und seitlichen Infloreszenzen mit auffälligen, überwiegend gelben Köpfchen (Name: Griech. euryx - breit, ops - Gesicht); Hüllblättchen 1-2reihig; Köpfchenboden wabig; Strahlenblüten weiblich, Röhrenblüten zwittrig; als teilweise winterharte Zierpflanzen verwendet; Asteraceae

acraeus M.D.Henders. (evansii hort.), SAf

pectinatus (L.) Cass., SAf



**FELICIA**



**Euryops pectinatus**


Botan. Garten Tübingen  
© FO, 5.6.2002

**Felicia** Cass., ca. 80 SAf/Abes; Kräuter und Halbsträucher mit ganzrandigen bis gezähnten, wechsel- bis gegenständigen Blättern und einzelnen, langgestielten Köpfchen; Hüllblätter dachig; Strahlenblüten blau oder weiß, Röhrenblüten gelb; Pappusborsten einreihig; beliebte Sommerzierpflanzen; nach dem Regensburger Legationsrat Felix († 1846) benannt; Asteraceae

rosulata Yeo (*Aster natalensis*), SAf

tenella (L.) Nees (*fragilis*), SAf

**GAILLARDIA**  
**KOKARDENBLUME**



**Gaillardia aristata, Kokardenblume**

**Gaillardia** Foug., *Kokardenblume*, 28 M/NAmer, 2 SAm; einjährige oder ausdauernde Kräuter mit einfachen bis fiederteiligen, basalen oder wechselständigen Blättern und großen, einzeln stehenden Blütenköpfchen; Hüllblätter 2-3reihig, zur Fruchtzeit zurückgekrümmt; Köpfchenboden gewölbt, mit Spreublättern; Zungenblüten auffällig groß und strahlend, steril oder weiblich, gelb bis rot und purpurbraun; Röhrenblüten zwittrig; Achänen zumindest basal behaart; Pappus schuppig und oft begrannt; nach dem französischen Botaniker Gaillard de Charentonneau (18. Jh.) benannt; Gattung mit geschätzten Zierstauden; Asteraceae

*aristata* Pursh, BrCol/NewM

Hybr.: "Fackelschein"



**Gaillardia aristata, Kokardenblume**

**GAZANIA**





**Gazania rigens „Goldgelb“**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 23.6.2002

**Gazania** Gaertn., 16-40 S/SW-Af; nicht winterharte Stauden, selten  
Annuelle mit Grundblattrosetten und aufrechten, blattlosen,  
einköpfigen Stengeln; Köpfchen meist groß und durch auffällige  
und intensiv gefärbte Zungenblüten attraktiv, die sich nachts  
zusammenneigen und tagsüber ausbreiten; sehr beliebte  
Sommerzierpflanzen mit vielen Hybriden und Zuchtformen; nach  
dem Gelehrten Theodoros von Gaza (1398-1478) benannt;

### Asteraceae

Hybriden: "Mini-Star Gelb", "Mini-Star Weiß", "Mini-Star  
Tangerine"

*krebsiana* Less., SAf

*ssp. serrulata* (DC.) Roessler (*nivea*), SAf

*linearis* (Thunb.) Druce (*longiscapa*), SAf

*pavonia* (Andr.) R.Br., SAf

*pinnata* (Thunb.) Less., Kap

*rigens* (L.) Gaertn. (*splendens*, *uniflora*), SAf, "Goldgelb",

"Kupferglut", "Kupferrad", "Mondlicht", "Schwefelgelb",

"Schwefelglut"



**Gazania rigens „Goldgelb“, fruchtend**

**HELENIUM**  
**SONNENBRAUT**



**Helenium autumnale „Golddrausch“**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 9.8.2002

**Helenium** L., *Sonnenbraut*, 40 M/NAm; einjährige oder ausdauernde Kräuter mit zumeist herablaufenden, drüsig-punktierten, wechselständigen Blättern und einköpfigen bis zusammengesetzten Infloreszenzen; Hüllblätter 1-3reihig, häufig zurückgebogen; Köpfchenboden kahl; Strahlen- und Röhrenblüten zumeist goldgelb; Pappus schuppig und oft begrannt; einige Arten als Zierstauden verwendet; nach Helena von Troia benannte Pflanzen (helenion); Asteraceae

autumnale L., NAm

hoopesii A.Gray, RockyM/Calif/Oreg



**Helenium autumnale „Goldrausch“**

**HELIANTHUS**  
**SONNENBLUME**





**Helianthus decapetalus**

**Helianthus** L., *Sonnenblume*, ca. 110 Am; einjährige bis ausdauernde, aufrechte und langstengelige Kräuter mit gegenständigen (oft untere) und wechselständigen (mittlere und obere), einfachen, großspreitigen Blättern; Hüllblätter oft mit blattartigen Spitzen in 2 bis mehreren Reihen; Körbchen meist groß mit "sonnenartigem" Aussehen (Name: Griech. helios - Sonne, ánthos - Blüte); Körbchenboden flach bis schwach gewölbt, mit Spreuschuppen; Zungenblüten steril, gelb, abfallend; Röhrenblüten zwittrig, gelb bis braun; Achänen abgeflacht mit 2(-4) Pappuschuppen oder -borsten; mehrere Arten als Nutzpflanzen (H. annuus mit weltwirtschaftlicher Bedeutung) und als Zierpflanzen weit verbreitet; Asteraceae

angustifolius L., O-NAm/Flor/Tex

annuus L., *Sonnenblume*, W/M-NAm

argophyllus Torr. & A.Gray, Tex

atrorubens L., Virg/Tenn/Louis/Flor

debilis Nutt., Flor/Tex

decapetalus L., O-NAm

giganteus L., Queb/Sask/Flor

x laetiflorus = rigidus x tuberosus

microcephalus Torr. & A.Gray, Pen/Flor

mollis Lam., Ohio/Geor/Tex

nuttallii Torr. & A.Gray, M/W-NAm

resinosus Small, NAm

rigidus (Cass.) Desf., Ont/Geor/Tex

salicifolius A.Dietr., M-NAm/Tex

strumosus L., Queb/Geor/Ark

tracheliifolius Mill., O-USA

tuberosus L., *Erdbirne*, *Topinambur* M-NAm

**HELICHRYSUM  
STROHBLUME**



**Helichrysum cooperi**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 11.7.2003

**Helichrysum** Mill., *Strohblume*, ca. 500 Eu/Af/As/Aus/Neus; einjährige und ausdauernde, zumeist dichthaarige bis wollige Kräuter oder Halbsträucher mit wechselständigen, basal gelegentlich gegenständigen Blättern und einzelnen bis gehäuften Köpfchen mit gelben Blüten (Name: Griech. hélios - Sonne, chrysos - Gold); Hüllblätter oft strahlig und gefärbt, so die fehlenden Strahlenblüten als Schauapparat ersetzend, meist auch häutig und im trockenen Zustand kaum verändert; Zierpflanzen, häufig für Trockensträube verwendet; Asteraceae

arenarium (L.) Moench, Eu/Mong

bellidioides (G.Forst.) Willd., Neus

bracteatum (Vent.) Andr., Aus

cooperi Harv., SAf

coralloides Benth. & Hook., Neus

crispum D.Don, SAf

frigidum (Labill.) Willd., Kors

italicum (Roth) G.Don, Med?

ssp. serotinum (Boiss.) P.FURN., SW-Eu

milfordiae Killick, SAf: Drakensberge

orientale (L.) Gaertn., O-Med

petiolare Hilliard & B.L.Burtt (petiolatum), SAf

plicatum DC., S-Balk/Arm

plumbeum Allan, Neus

selago (Hook.f.) Benth. & Hook., Neus

sibthorpii Rouy, Gri: Athos

tianschanicum Regel, Turk



**Helichrysum cooperi**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 11.7.2003

**HELIOPSIS**  
**SONNENAUGE**



**Heliopsis helianthoides**

Botan. Garten Tübingen  
© FO, 3.8.2003



**Heliopsis** Pers., *Sonnenauge*, 7-13 NAm; aufrechte Stauden mit einfachen, gegenständigen Blättern und großen, end- oder achselständigen Köpfchen gelber Strahlen- und Röhrenblüten (Name: Griech. hélios - Sonne, -opsis - ähnlich); Achänen 3-4kantig mit krönchen- oder zahnartigem, bisweilen auch fehlendem Pappus; einige Arten und Zuchtformen als Zierpflanzen verwendet;  
Asteraceae

helianthoides (L.) Sweet, O-NAm

scabra Dun., O-NAm



**Heliopsis scabra**

**HIERACIUM**  
**HABICHTSKRAUT**



**Hieracium aurantiacum**

**Hieracium** L., *Habichtskraut*, ca. 1000 subkosm excl. Aus; mehrjährige Kräuter. Blattrosetten und Ausläufer vorhanden oder fehlend; ein bis mehrere Stengel mit oder ohne Stengelblätter; ein- bis mehrköpfig; Hüllblätter unterschiedlich angeordnet, Spreuschuppen fehlend, Achänen nie geschnäbelt, Pappus 1/2-reihig; Pappusstrahlen ungleich, brüchig, weiß bis hellbräunlich; Name: Griech. híerax - Habicht; Asteraceae

alpinum L., Grönl/N/MEu/Balk/Ural/W-Sib

amplexicaule L., Seu, ssp. pseudoligusticum (Gremli) ZAHN, S-Alp

aurantiacum L., N/MEu/SO-Eu/NW-Ruß/WAs

auricula L., Eu

bupleuroides C.C.Gmel., Apen/Alp/Karp/Balk

echioides Lumn., M/SEu/WAs

x floribundum C.Wimmer & Grab., M/NEu

gothicum Fr., Eu

hoppeanum Schult., O-Alp

intybaceum All. (albidum), Alp

lachenalii Gmel., Eu/WAs

lactucella Wallr., Eu

lanatum (L.) Vill. ssp. lanatum, W-Alp

murorum (L.) Zahn (sylvaticum) Eu/WAs

murorum x amplexicaule

piliferum Hoppe, Pyr/Alp/Karp/W-Balk

pilosella L., Eu/KIAs/NW-Sib, "Niveum", grex incanum Zahn, W-Alp

piloselloides Vill., Eu/Med/NAf/Kauk

staticifolium All., Alp

tomentosum (L.) L. (lanatum), Jura/ApuAlp

villosum Jacq., Jura/Alp/Apen/Karp/N-Bulg

wiesbaurianum Uechtr., S-MEu