

NIEUWE OOGST

CATALOGUS 2015

NIJSSEN BULBS HEEMSTEDE
WWW.NIJSSENBULBS.NL



Afbeelding omslag: *Allium 'Ambassador'*, zie pagina 5

Fotografie: Gert-Pieter Nijssen en vele enthousiaste kwekers, waarvoor mijn dank.

Deze uitgave kwam tot stand door samenwerking tussen:

Tekst: Gert-Pieter Nijssen en archief Peter C. Nijssen

Lithografie/Productie: LNO drukkerij, Zierikzee.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Nijssen Bulbs Heemstede. Lichte kleurafwijkingen van foto's en eventuele zet- of drukfouten in de catalogus voorbehouden.

Een bezoek aan ons plantencentrum in Heemstede is altijd de moeite waard.



Adres: Sportparklaan 25A, 2103 VR Heemstede.

Voor actuele openingstijden kijk op: www.nijsssenbulbs.nl

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer:

Vanaf station Heemstede-Aerdenhout, stadsbus 4 richting Heemstede. Na ongeveer zes minuten uitstappen bij halte Glipdreef/Begraafplaats. Nog ongeveer vijf minuten lopen in zuidelijke richting, na ong. 200 meter linksaf, de Sportparklaan in. Het plantencentrum bevindt zich aan de linkerzijde, schuin tegenover het zwembad.

Algemene voorwaarden Nijssen Bulbs Heemstede

Deze kunt u raadplegen op www.nijsssenbulbs.nl, maar sturen wij u ook, op verzoek, kosteloos toe.

Prijs catalogus € 10.00 voor Nederland, overige landen binnen de E.U. € 15.00

Bol- en Knolgewassen

Een Nieuwe Oogst

Nijssen Bulbs Heemstede

Bijzondere bol- en knolgewassen

Sportparklaan 25a
2103 VR HEEMSTEDE
Tel.: 023 - 5471056
Fax: 023 - 5282208

Correspondentie-adres:
Postbus 653
2100 AR HEEMSTEDE

www.nijssenbulbs.nl
info@nijssenbulbs.nl



Catalogus 2015

Bloembollen voor in huis



Rijkbloeiende Amaryllis, heerlijk geurende geprepareerde hyacinten en narcissen voor in huis.

Narcissus tazetta 'Chinese Sacred Lady'

Geurende trosnarcis voor kamercultuur. Te planten op aarde of in grind. In delen van China wordt deze narcis als traditie met Nieuwjaar onder andere gebruikt in decoraties.

Bestelnr. 6037	5 st.	3.75
	10 st.	7.00

Paeonia, pioenrozen



De lievelingsplanten van de Griekse goden en Chinese keizers, voor velen de 'Koningin der vaste planten'. Een schitterend aanbod van 50 variëteiten dat tot stand is gekomen met pioenspecialist Ruud Warmerdam. De vollegrondsknollen worden met minimaal 3 tot 5 neuzen in de beste planttijd, oktober-november, uitgeleverd.

Bijvoorbeeld deze:

Paeonia 'Gay Paree'

Sterk en heerlijk geurend.

Bestelnr. 410020	p.st.	14.00
-------------------------	--------------	--------------

Bekking & Blitz Museum collectie



Kaarten en kaartenmapjes, agenda's, kalenders en papeterie.

Bijvoorbeeld dit kaartenmapje met 10 dubbele wenskaarten met enveloppen:

Redouté Tulipa, Teylers Museum.

2 x 5 motieven. 14,5 x 14,5 x 1,5 cm. 150 gr.

Bestelnr. 5810170	p.st.	8.99
--------------------------	--------------	-------------

Rood met Zwarte Stippen



Tuinplaagbestrijding met respect voor de natuur. Zet lieveheersbeestjes in bij de bestrijding van bladluis! Maar ook aaltjes tegen o.a. slakken en taxuskever. Natuurlijke vijanden inzetten kan heel goed en is volledig biologisch en ecologisch verantwoord. Vanaf voorjaar 2016 bij ons te bestellen. Maar nu al leveren wij het complete programma insectenhoeven, nestkassen en bloemzadenmengsels voor bijen en lieveheersbeestjes van Rood met Zwarte Stippen.

Huisje voor lieveheersbeestjes

gerecycled hout 9,5 x 20,5 x 9,5 cm (lxhxb)

Bestelnr. 5300001	p.st.	16.50
--------------------------	--------------	--------------

Een nieuwe naam

Een oude bekende, een oude vertrouwde.


Peter C. Nijssen Bijzondere Bol- en Knolgewassen wordt: **Nijssen Bulbs Heemstede**.

Een nieuwe bekende, een nieuwe vertrouwde.

Een korte, krachtige naam, internationaal te gebruiken en geeft duidelijk onze kernactiviteit aan.

De activiteiten van het plantencentrum in Heemstede (voorheen Tuincentrum Peter C. Nijssen) gaan verder onder de naam: **Nijssen Tuin Heemstede**.


Nijssen Bulbs Keurmerk

Nieuw dit jaar is het Nijssen Bulbs Keurmerk. Indien een product afkomstig is van een kwekerij die ons ervan overtuigd heeft de bedrijfsvoering op een duurzame wijze uit te voeren en daarbij zo veel mogelijk rekening houdt met het milieu, dan geven wij dit in de catalogus aan met het symbool . Dit kunnen zij doen doordat zij een keurmerk zoals MPS, FFFF of Skal voeren, of omdat zij ons persoonlijk overtuigd hebben zo milieuvriendelijk mogelijk te produceren.

Bloembollen- en Siergrassenweekend 26 en 27 september 2015

U kunt dagelijks terecht op ons plantencentrum in Heemstede, kijk voor onze openingstijden op de website. In dit weekend presenteren we een grote collectie siergrassen en zorgen we voor een overvloed aan bijzondere bol- en knolgewassen. U kunt zich laten adviseren door deskundige medewerkers. Zaterdag 26 september geopend vanaf 9.00 uur, zondag 27 september vanaf 10.00 uur, beide dagen tot 17.00 uur. Gratis koffie en thee.


Herfstbloeiende bol- en knolgewassen

Herfstbloeiende bol- en knolgewassen worden in de catalogus aangeduid met het symbool . U vindt ze overzichtelijk bij elkaar op onze website. Sinds dit jaar bieden wij geen apart bestelformulier meer aan, natuurlijk blijft wel de service dat een bestelling met uitsluitend bloembollen uit deze groep met voorrang verstuurd wordt. Bestel ze eenvoudig via de website.

Uw bestelling, graag voor 15 november 2015

Thuisbezorgen via PostNL voor slechts € 3,50, een kleine bijdrage in de verzendkosten, die wij volledig voor onze rekening nemen bij een bestelling vanaf € 125,00 geleverd op een adres in Nederland. Een overzicht van verzendkosten voor overige E.U.-landen treft u op www.nijssenbulbs.nl aan.

U kunt uw bestelling ook op het plantencentrum in Heemstede afhalen, of wij nemen uw pakket graag mee naar een van de ondergenoemde tuinevenementen. Geef u dit ruim op tijd aan?

Laat u inspireren door het enorme aanbod bijzondere bol- en knolgewassen. Alle nieuw opgenomen soorten, meer dan honderd, kunt u herkennen aan .

Veel lees- en bestelplezier!

Gert-Pieter & Ineke Nijssen



Op de volgende evenementen zijn wij aanwezig met een representatieve collectie bijzondere bol- en knolgewassen.

12 en 13 september 2015	Hex Festival of Rare Plants, Kasteel Hex, België
19 en 20 september 2015	De Hortus Botanicus, Amsterdam
26 en 27 september 2015	Bloembollen- en Siergrassenweekend Nijssen Tuin Heemstede
9, 10 en 11 oktober 2015	De Tuindagen van Beervelde, België
13 februari 2016	Sneeuwkllokjesweekend Arboretum Kalmthout, België
10, 11 en 12 juni 2016	Hex Festival of Rare Plants, Kasteel Hex, België
17, 18 en 19 juni 2016	Internationale Kwekerijdagen Bingerden, 20 jarig jubileum

Op dit moment is een border met *Allium* niet meer weg te denken uit een tuin. Zo enthousiast als er op de bloeiende sieruien wordt gereageerd is ongekend voor een bolgewas. Eigenlijk logisch, want de grote diversiteit in bloemvorm, grootte, kleur en toepassing is overweldigend en een einde aan de toestroom van nieuwe cultivars is nog niet in zicht.

Het geslacht *Allium* omvat waarschijnlijk al meer dan 1000 species en cultivars en komt verspreid voor over het Noordelijk Halfrond, Klein- en Midden-Azië, alsook de landen rond het Middellandse Zeegebied en het westen van Noord-Amerika zijn belangrijke groeiplaatsen.

In Nederland kennen wij ook enige verwilderde soorten zoals daslook, moeslook en slangenlook.

Vele soorten, zowel de oorspronkelijke - alsook de gecultiveerde - alliums hebben ondergronds een bol, die afhankelijk van de soort een omtrek kan bereiken van zo'n 3 cm tot wel 40 cm. Andere soorten, waaronder enige kruiden en groenten, hebben ondergronds een verdikte wortel, ook wel 'schacht' genoemd. De kleinbollige alliums, maar ook de alliums die een verdikte wortel vormen, zijn zeer geschikt voor verwildering. De grofbollige alliums kunnen meerdere jaren in de grond blijven.

Hoelang is afhankelijk van de grondsoort. Op een doorlatende zandgrond blijven de sieruien het langst goed, hoewel de bloemen in de loop van de jaren kleiner worden. Als u niet meer tevreden bent over de grootte van de bloemen, kunnen de bollen na de bloei gerooid worden. De bewaartemperatuur ligt rond de 23-25 graden. In november kunnen ze weer worden geplant, liefst op een ander plekje in verband met mogelijk aanwezige ziektekiemen.




Allium altissimum

Intro: 1884. *A. altissimum* treffen we nog aan in Centraal-Azië, het noordoosten van Iran, maar ook in het noordwesten van Afghanistan. Een spectaculaire allium die zijn niet al te grote, 10-12 cm in doorsnede paarse bolvormige bloemen op stevige tot 2 meter hoge stelen draagt. Fantastisch tussen hoge siergrassen waarbij de bloemen tussen het loof van het gras een verrassende combinatie vormen.



Bestelnr. 8003

5 st.	4.95
10 st.	9.50




Allium 'Ambassador'

Inmiddels heeft deze schitterende selectie van Kwekerij A. Langedijk uit Zwaagdijk een vooraanstaande plaats in het huidige assortiment sieruien bemachtigd. De kruisingsouders zijn *Allium stipitatum* x *Allium giganteum*. Een indrukwekkende 100 cm hoge allium waarvan de grote bolvormige bloem de dichtheid heeft van *Allium giganteum* en een mooie egale paarsviolette kleur heeft. Lange bloei en een prima snijbloem. Het forse glanzende blad is lang aantrekkelijk.

Bestelnr. 096

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium amethystinum 'Red Mohican'

Een zomerbloeiende bordeauxrode allium waarbij zich ten tijde van de bloei een forse kuif ontwikkelt waaruit witte bloempjes ontluiken. Tot aan het moment van bloeien is de bloemsteel gebogen, pas voor de bloei strekt de steel zich uit. *A. amethystinum* is inheems op rotsgronden in het oosten en midden van de mediterrane gebieden.

Bestelnr. 9901

3 st. 6.00
5 st. 9.50




Allium ampeloprasum

(Synoniem: *A. halleri*)

Ampeloprasum betekent: in wijngaarden groeiende looksoort. Intro: 1753. Een variabele species voorkomend in Zuid-Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië tot in de Kaukasus. De wildvormen zijn in Zuid-Europa een ware delicatessen, waar ze rauw worden gegeten.

Bestelnr. 105

5 st. 4.50
10 st. 8.00




Allium ampeloprasum 'Hairy Friend'

De nieuw aangeboden variëteiten zijn ontstaan door selectiewerk uit zaden die verzameld zijn in het Middellandse zeegebied. Onze harige vriend valt op door de onregelmatig, op verschillende lengtes uitstekende lichtroze bloempjes. Op elk bloemblaadje is aan de buitenzijde een purperroze nerfje zichtbaar, waartussen de purperroze meeldraden uitsteken.

Bestelnr. 6090

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Allium ampeloprasum 'Rose Picture'

Een grote toekomst is voor de nieuwigheden weggelegd in de snijbloemproductie, maar niet onbelangrijk voor de tuin is het bloeitijdstip. De meeste grote sieruien beleven hun hoogtepunt in mei en juni. Bij Rose Picture is dit een maand later. Roze bloemblaadjes met een purper nerfje, gele uitstekende meeldraden.

Bestelnr. 6093

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Allium amplexans 'Graceful Beauty'


(Synoniemen: *A. attenuifolium*, *A. occidentale* en *A. monospermum*)

Intro: 1857. *A. amplexans* is een zeer makkelijk groeiende species uit Noord-Amerika. De tot 40 cm hoge bloemstelen worden door twee tot vier bladeren omhuld, hetgeen voordat de bloei in april aanvangt, afsterft. De kogelvormige bloemtrossen bestaan uit talrijke witte bloemen, die nadat ze bestoven zijn, flinterdun worden. Het aanbod betreft een mooie uniforme selectie.

Bestelnr. 098

10 st. 4.00

25 st. 9.50




Allium angulosum

(Synoniem: *A. acutangulum*)

Intro: 1753. Herkomst: grote delen van Midden- en Oost-Europa en Siberië. De stevige ca. 40 cm hoge bloemsteel is duidelijk kantig (*angulosum* betekent: kantig). Het half kogelvormige bloemscherm bestaat uit tientallen zachtlila bloemetjes. De drie tot zes glanzende bladeren blijven ook gedurende de bloei een lange tijd groen.

Bestelnr. 9312

3 st. 3.75
5 st. 6.00




Allium atropurpureum

Herkomst: de Balkan. De in 1800 geïntroduceerde allium heeft een bloemkleur die in de natuur weinig voorkomt, namelijk donker purperrood (*atropurpureus*). De dicht bijeen geplaatste ster-vormige bloempjes vormen een half cirkelvormig scherm met een doorsnede van zo'n 5-8 cm. Tijdens de uitbloei neemt het bloemscherm een pluimbal-achtige vorm aan. Lang houdbare snijbloem met een aangename geur. Mooi in combinatie met groengele bloemen zoals *Alchemilla*.

Bestelnr. 109

5 st. 3.00
10 st. 5.50




Allium backhausianum

Een hoge witte allium die samen met *A. aflatu-nuense*, *Aquilegia* en *Trollius* wordt aangetroffen in het Fergana-gebergte, op een relatief vochtige bodem. Talrijke 1,5 cm lange groenigwitte bloempjes vormen samen een compacte bolvormige bloeiwijze. De echte schoonheid komt pas na de bloei tot uiting. De glimmend groene zaaddozen vormen een stevige, compacte bol die lang zijn sierwaarde behoudt.

Bestelnr. 9428

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Allium backhousianum x aflatunense

2015

Spectaculaire, hoge sierui die mij op grote afstand opviel in een enorm veld alliums. Compacte zachtlila bollen op stelen van tweeënhalve meter hoogte! De hoge *A. altissimum* die er in het veld naast stond, viel in het niet. Opvallend zijn de blauwe meeldraden.

Bestelnr. 6915

p.st. 3.50
3 st. 9.75

200-250 5-6 30 15-20 l.



Allium 'Beau Regard'

Een hybride, ontstaan door het kruisen van *A. macleanii* en *A. christophii*, dat in 1959 verricht werd door J.R. Bijl van Duyvenbode. Dit zijn dezelfde kruisingsouders als die van *A. 'Globe-master'*. Deze nakomeling geeft bijzonder stevige 90-100 cm hoge stelen. De asterviolette bloem behoort tot een van de grotere alliums, de bloem kan een grootte bereiken van wel 25 cm in doorsnede.

Bestelnr. 111

p.st. 3.95
3 st. 11.25

90-100 6-7 30 15-20 24



Allium beesianum

Intro: 1914. George Forrest verzamelde deze schoonheid in Noordwest-Yunnan in Zuid-China en vernoemde deze naar de Firma Bees uit Noordwest-Engeland. Veel lof ontvangt deze zeldzaamheid in de literatuur. De belvormige blauwe bloempjes vormen een knikkend bloemscherm en verschijnen in de nazomer. Perfect voor de niet te droge rotstuijn.

Bestelnr. 6094

p.st. 3.50
3 st. 9.75

20-35 8-9 5 5 l.




Allium caeruleum

(Synoniem: *A. azureum*)

Intro: 1773. Hemelsblauwe stervormige bloempjes die een stevige bolvormige bloeiwijze vormen met een doorsnede van zo'n 4 cm. Een 40 cm hoge snijbloem, die vanaf half juni kleur gaat tonen. Beschrijvingen dateren van 1830. Herkomst: Oost-Europa, ten noorden van de Kaspische-Zee alwaar ze voorkomen in steppen en zoutmoerassen. Geschikt voor verwildering. Bij opkomst zien de bladeren eruit als grassprietjes, die vrijwel voor de bloei zijn verdwenen.

Bestelnr. 113

25 st. 4.50
100 st. 17.00




Allium callimischon subsp. callimischon

Intro: 1835. Herkomst: Noord-Griekenland (Peloponnesus). Een najaarsbloeiende species met witte bloemen voorzien van een duidelijk waarneembare roodbruine nerf. De bladdelen bevatten de nieuwe bloeiwijze die vanaf eind augustus ontluikt.

Bestelnr. 117

p.st. 2.95
3 st. 8.25




Allium 'Cameleon'

In 2000 ontving de heer W. de Goede materiaal van Wayne Roderick, destijds werkzaam bij de botanische tuin van de Universiteit van Californië. De zachtroze bloemen, die tijdens de bloei diverse kleurstadia doorlopen worden gedragen door 20 cm hoge bloemstelen. Het donzige blad is harig aan de zijkant. Overigens wordt getwijfeld of de plant van origine Amerikaans is. Verwildert goed.

Bestelnr. 9133

10 st. 2.50
25 st. 6.00





Allium caesium 'Aravan'

Bestelnr. 6916



p.st.	7.50
3 st.	21.00

(Synoniem: *A. urceolatum*)

Intro: 1830. Herkomst: Turkestan-gebergte bij Zaamin in Oezbekistan. De bloem lijkt een beetje op *A. caeruleum* maar is groter, terwijl de plant lager blijft en iets vroeger bloeit. De bloemkleur varieert van licht- tot donkerblauw met een donkere middennerf. Het geheel is voorzien van een groenige gloed. Een relatief makkelijk groeiend soort. Zoals te verwachten was, worden uit de variabele species *A. caesium* schitterende selecties gehaald, dit jaar is er voor het eerst aanbod van de opvallend donkerblauwe *A. caesium* 'Aravan'.



Allium caesium

Bestelnr. 115


3 st.	3.75
5 st.	6.00



Allium caesium 'Pskem's Beauty'

Bestelnr. 6095






p.st.	2.95
3 st.	8.25



Allium carinatum subsp. pulchellum

Intro: 1810. Herkomst: Zuidoost-Europa en West-Azië. De oorspronkelijke vorm *A. cirrhosum* (één van de synoniemen) heeft een bloeiwijze die behalve bloemetjes ook broedbolletjes heeft. De bloemknop blijft lange tijd 'verstopt' aan het eind van de bloemsteel. Wanneer de knop openspat ontluiken schitterende paarse klokvormige op fragiele steeltjes bungelende bloemen, die een bijna bolvormig geheel tonen. Na uitbloei richten de dan bijna verdroogde klokjes zich op en verdwijnen de schutbladeren.

Bestelnr. 121 **10 st. 4.95**
25 st. 12.00






40-50  7-8  5  6-8  1. 



Allium carinatum subsp. pulchellum 'Album'

Intro: 1969. Een zuiver witte vorm, ook in de zomer bloeiend. Heeft evenals de paarse species een Award of Garden Merit van de Royal Horticultural Society ontvangen. Leuk snijbloempje. Bijzonder geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 123 **5 st. 4.50**
10 st. 8.50

40-50  7-8  5  6-8  1. 








Allium cepa var. viviparum


(Synoniem: *A. proliferum*)

Nederlandse naam: Egyptische ui of boomui. Elk broedbolletje dat vrijwel het hele jaar kan worden geplant, ontwikkelt zich spoedig tot een bizarre plant. We treffen de peervormige bolletjes aan in de bladoksels en in de 'bloeddelen'; ze moeten regelmatig worden geplukt. Zowel de stengel als de bolletjes zijn te gebruiken als keukenkruid bij visgerechten en stoofschotels.

Bestelnr. 8469 **5 st. 4.95**
10 st. 9.50

80  7-9  10  5  1. 





Allium cernuum

Bestelnr. 129

10 st.	4.95
25 st.	12.00

(Synoniem: *A. recurvatum*)

Intro: 1800. Kunstig gedraaide bloemstelen worden omgeven door lange, smalle bladeren. Het bloemenscherm, 5 cm in doorsnede, bestaat uit bolvormige, knikkende bloemen met uitstekende meeldraden. Een echte bijenplant. Tijdens de uitbloei worden de bloemtopjes teruggevouwen. Een allium met een lange bloeitijd, van eind mei tot in augustus. Herkomst: het Alleghany gebergte in Wyoming en ook plaatselijk in Canada en Mexico. Ook geschikt voor een wat vochtigere standplaats.



Allium cernuum -White Max-

Bestelnr. 9433

5 st.	3.50
10 st.	6.50



Allium cernuum 'White Master'

Bestelnr. 6917

5 st.	4.00
10 st.	7.50




Allium chelotum

Een werkelijke beauty die we te danken hebben aan de heer Per Wendelbo die deze species uit Iran in 1966 beschreef en introduceerde. De zwarte zaaddozen dringen zich ten tijde van de bloei op tussen de zacht lilaroze bloemen in de bolvormige bloeiwijze, waardoor een werkelijk spektakel ontstaat. Smal glanzend groen ellipsvormig blad. Goed houdbaar op een zonnige standplaats op doorlatende bodem.

Bestelnr. 6096

p.st. 4.50
3 st. 12.75




Allium chloranthum

In eerste instantie lijkt het of we hier te maken hebben met *A. flavum*. Echter, het sierlijke bloemscherm van *A. chloranthum* is dichter, de talrijke bloemen zijn prettig groengeel van kleur en ook de bloeitijd is ruim een maand eerder.

Oorspronkelijk afkomstig uit de provincie Gaziantep in Turkije. Mooie selecties en kruisingen met *A. convallarioides* zijn op komst. Makkelijk groeiend op een doorlatende bodem.

Bestelnr. 076

3 st. 6.00
5 st. 9.50




Allium christophii

(eigenlijk: *A. cristophii*, Synoniem: *A. albopilosum*)

Intro: 1884. De bolvormige bloeiwijze heeft een diameter van wel 20 cm. Deze bevindt zich aan het einde van een krachtige tot 50 cm hoge bloemsteel die wordt omgeven door bandvormige behaarde bladeren. De bloem bestaat uit wel honderd glanzende violette bloemetjes, met 'n unieke metaalachtige glans, waarvan de topjes elkaar nauwelijks raken. Het geheel lijkt door een kunstenaarshand te zijn verweven. Uitermate geschikt als droogbloem. Herkomst: noordwesten van Iran en het Russische deel van Centraal-Azië.

Bestelnr. 131

10 st. 4.50
25 st. 10.50




Allium convallarioides -Pink form-

Allium convallarioides komt voor in Iran, Irak en delen van de Kaukasus tot in Centraal-Azië. Een luchtig bolvormig bloemscherm, met individuele op Lelietjes-der-dalen lijkende bloemetjes, ontluikt uit een met vliesje omsloten bloemknop. De bloemen hebben een duidelijk zichtbare nerf zowel op de buitenkant als op de binnenkant. De vier tot vijf smalle blaadjes zijn korter dan het 40 tot 60 cm hoge bloemsteelje. Meestal wordt de witbloeiende vorm aangetroffen, het aanbod bestaat uit de mooie roze vorm.

Bestelnr. 9660

p.st. 2.50

3 st. 6.75




Allium cowanii

A. cowanii is nauw verwant aan *A. neapolitanum*. De bloemsteel is duidelijk driekantig. De sneeuw-witte bloemkransen bestaan uit tientallen ster-vormige kortgesteelde bloemetjes met scherp contrasterende groene helmknopjes. Bij opkomst komt de bloemsteel bijna kurkentrekkervormig omhoog om vlak voor de bloei vrijwel recht te groeien. Eén en al verwarring rondom de naamgeving. Wat blijkt, *A. cowanii* bestaat niet! Volgens Dilys Davis verliet *A. neapolitanum* Europa als een Italiaan en is als Zuid-Amerikaan geherintroduceerd door de Peruviaanse relatie Cowan.

Bestelnr. 133

25 st. 2.50

100 st. 9.00



Allium cyaneum


(Synoniem: *A. purdomii*)

Intro: 1875. Voor het eerst aangetroffen door de Russische botanicus Przewalski in de provincie Kansu (West-China) en werd door Reginald Farrer verspreid. In 1914 werd William Purdom op een expeditie begeleid door Farrer. In hetzelfde gebied troffen ze wederom een *A. cyaneum* gelijkende vorm aan. Voor de moeite werd toen het synoniem naar Purdom vernoemd. Een fantastische miniatuur die bij opkomst op een graspolletje lijkt. In juli verschijnen de blauwe klokvormige bloempjes. Ideaal voor in de rotstuin of voor in een trog.

Bestelnr. 8477

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Allium cyathophorum var. farreri


(Synoniem: *A. farreri*)

Toefjes smalle ca. 20 cm lange blaadjes omvatten de driekantige bloemsteeltjes. Het knikkende bloemscherm bestaat uit een twintigtal violet-rode klokvormige bloemetjes met zeer smalle bloemblaadjes. Een leuke allium die zich erg makkelijk uitzaait. Herkomst: West-China (Kansu). Intro: 1914.



Bestelnr. 139

5 st. 3.75
10 st. 7.00




Allium decipiens

Dit is één van de vele species uit Centraal-Azië die ook in China wordt aangetroffen. Aan de tot 60 cm hoge stelen ontwikkelen zich bolvormige bloeiwijzen bestaande uit glanzend zacht lilaroze stervormige bloempjes. Het aantrekkelijke glanzende blad blijft laag bij de grond. Uniek is dat *A. decipiens*, een hoge sierui, geschikt is voor de schaduwborder.



Bestelnr. 9137

3 st. 6.00
5 st. 9.50



Allium dolichostylum


(Synoniem: *Al pseudoxiphopetalum*)

De eerste beschrijving dateert uit 1934. De compacte bolvormige bloeiwijze, op 50 cm hoge bloemstelen, bestaat uit vele purperbruine bloempjes waarvan de spitse bloemblaadjes met roze topjes een wit randje tonen. Inheems in Centraal-Azië.



Bestelnr. 6097


p.st. 3.50
3 st. 9.75



Allium 'Eros'

Intro: 2006. Een selectie uit *A. unifolium*, die eerst bekend was als *A. unifolium 'Chris Dwarf'*. De tot 10 cm grote bloemschermen bestaan uit wel meer dan vijftig blauwroze, stervormige bloemetjes op 35 cm hoge stevige bloemstelen. Uit iedere bol verschijnen meerdere bloemstelen, dit alles zorgt voor een rijk bloeiend geheel, waarbij het blad gedurende de bloei aantrekkelijk blijft.

Bestelnr. 9663 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00




Allium falcifolium

(Synoniemen: *A. falcifolium* var. *demissum*,
A. falcifolium var. *breweri* en *A. breweri*)

Intro: 1882. Herkomst: het westen van de Verenigde Staten, waar de mooie bijnamen 'Sickle-leaf Onion' en 'Sceptre-leaved Onion' worden gebruikt. Het bloemscherm bestaat uit tot wel 30 klokvormige purperroze bloemetjes waarvan de bloemblaadjes smal zijn. De tamelijk vlezige bladeren blijven gedurende een lange tijd groen. Ze gedijen bij voorkeur op een niet te droge bodem.


Bestelnr. 143 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00



Allium fistulosum

Reeds in 1753 wordt deze stengelui, ook wel grove bieslook, beschreven. Tientallen bloemetjes vormen een kogelronde bloeiwijze met een witgele kleur. Deze kleur ontstaat door het overheersen van de geelachtige helmknoppen. De buisvormige (fistulosus) bladeren zijn vlezig. De plant is toepasbaar in de border, kruiden- en moestuin. Oorspronkelijk kwam deze ui voor in het Verre Oosten. Volgens zeggen zouden in het wild geen exemplaren meer voorkomen.






Bestelnr. 8007 **5 st. 3.75**
10 st. 7.00



Allium 'Firmament'

Van beide ouders heeft 'Firmament' alleen de goede eigenschappen meegekregen: van *A. atropurpureum* de intens donker purperen kleur en van *A. christophii* de schitterende verweven ster-vormige bloemetjes met dat vleugje metalliek. Het half bolvormige bloemscherm bereikt een diameter van 10-12 cm. De forse bloemsteel is 80 cm hoog. Een perfecte en geurende snijbloem, en laat zich in de border goed combineren met bijvoorbeeld grijsbladige planten.

Bestelnr. 145 3 st. 4.95
5 st. 7.50

80  5-6  15  10  12 








Allium flavum

(Synoniem: *A. webbii*)

Intro: 1753. Een species die verspreid voorkomt van Zuid-Europa tot aan het zuiden van Rusland, maar niet op het Iberische schiereiland. Ze groeit op droge, stenige plaatsen van zeeniveau tot op 2500 meter hoogte. Cilindervormige, blauw-groene bladeren omvatten de ongeveer 30-40 cm hoge stengel. Het fraai knikkende bloemscherm bestaat uit vele goudgele bloemetjes, die naarmate de uitbloei vordert, omhoog komen. Heerlijk fris geurend. Bruikbaar als snij- en droogbloem. Verwildert goed.

Bestelnr. 147 5 st. 3.00
10 st. 5.50

30-40  7-8  5  6-8  1. 








Allium giganteum

(Synoniem: *A. procerum*)

Eén der grootste en opvallendste alliums met oersterke tot 175 cm hoge bloemstelen. De blauw-groene glanzende en riemvormige bladeren zijn ca. 8 cm breed en tot 30 cm lang. De gladde bloemsteel torst een zeldzaam mooie, zuiver bolvormige bloeiwijze met meer dan 100 individuele blauwachtig violette bloemetjes. Sinds 1883 komt *A. giganteum* in cultuur voor. Herkomst: o.a. Noordoost-Iran, Noordwest-Afghanistan.

Bestelnr. 149 p.st. 2.95
3 st. 8.25


150-175  6-7  30  15-20  22 



Allium 'Gladiator'

Deze hybride is ontstaan uit een kruising van *A. aflatunense* auct. x *A. macleanii* en werd in 1981 door de heer W. Hey geregistreerd. De tot 120 cm hoge bloemsteel draagt een compacte bolvormige bloeiwijze, gevuld met vele paarsroze ster-vormige bloemen. Grijsgroen liggend blad. Een prima houdbare snijbloem, welke op grote schaal zodanig geteeld wordt.

Bestelnr. 151 **3 st. 6.00**
 5 st. 9.50




Allium 'Globemaster'

In 1959 werd, door de heer J. Bijl, *A. macleanii* gekruist met *A. christophii*. Uit de zaailingen die ontstonden, werden *A. 'Beau Regard'* en *A. 'Globemaster'* geselecteerd. Laatstgenoemde viel op door de zeer grote glanzende bladeren en buitengewoon grote asterviolet gekleurde bloem (doorsnede tot 25 cm).

De bloeitijd is vanaf begin juni en houdt langdurig aan. Super snijbloem en een absolute topper voor de border.


Bestelnr. 153 **p.st. 4.50**
 3 st. 12.75



Allium x 'Globus'

Een steriele, dus langbloeiende hybride, waarvan de ouders volgens Janis Ruksans *A. karataviense* en *A. stipitatum* zijn. Het is een zeer attractieve plant. De bladeren blijven lang groen. De zacht-roze bloem met 'n blauwe gloed is bolvormig en heeft een diameter van ca. 10 cm. Vanwege zijn hoogte, een allium met een zeer bruikbare lengte voor halverwege in de border. Leuke snijbloem!

Bestelnr. 155 **10 st. 4.50**
 25 st. 10.50




Allium 'Hair'

Een selectie uit *A. vineale*, een in Nederland toch nog redelijk in het wild voorkomende allium, bekend onder de namen kraai- of hondlook. De paarse broedbolletjes worden aanvankelijk gesierd door een groenachtig punkkapsel; naarmate de bloem verouderd, vormen de dan grijsbruine hangende slierten. Een aanwinst voor in de wat wildere gemengde border. Goed houdbare snijbloem met een vaasleven van drie weken.

Bestelnr. 163

10 st. 2.50

25 st. 6.00




Allium hollandicum 'Album'

A. hollandicum is een Nederlandse hybride. De compacte bolvormige bloeiwijze bestaat uit tientallen stervormige bloemetjes en bevindt zich aan de top van een 80 cm lange en krachtige bloemsteel. Het aanbod bestaat uit een witbloeiende selectie waarvan de lilaroze meeldraden opvallend uitsteken. Iets vroeger bloeiend waardoor combinaties met tulpen goed mogelijk zijn.

Bestelnr. 175

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Allium hookeri




Een Aziatische species, inheems in o.a. het zuidwesten van China, India, Sri-Lanka, Myanmar en Bhutan. In grote delen van het zuiden en zuidwesten van Azië is het een gewaardeerd voedsel. Niet alleen de bloemen en bladeren worden in de keuken gebruikt, maar ook de wortels (gefrituurd). Stevig, een cm breed en plat blad. Kleine tot 5 cm in diameter bolvormige bloeiwijzen met groenigwitte bloempjes.

Bestelnr. 6304

3 st. 7.50

5 st. 12.00




Allium huber-morathii

Alleen voorkomend op een plekje in het Pontisch gebergte, in de buurt van Ankara, Turkije. Nauw verwant aan *A. carinatum* var. *pulchellum*, duidelijk verschillend zijn de kleinere bloempjes die in grote getale in het bloemscherm zitten en de vroegere bloeitijd. De bloemen zijn lieflijk zachtroze en verschijnen in juni-juli. Voor een zonnig plekje op doorlatende grond.

Bestelnr. 9139

3 st. 4.95

5 st. 8.00




Allium hyalinum

Een Californische wildvorm die zijn roots heeft in de uitlopers van de Sierra Nevada, voornamelijk op vochtigere berghellingen aan de schaduwzijde. De zes tot tien witte, soms zachtroze bloempjes vormen tezamen een luchtig, transparant bloemschermje. Naarmate de bloei vordert worden de bloemblaadjes transparant (hyalinus = glazig, doorschijnend). Aangenaam zacht geurend.

Bestelnr. 6099

3 st. 4.95

5 st. 8.00




Allium jesdianum 'Akbulak'

Een geselecteerde wildvorm van *A. jesdianum* uit de nabijheid van Akbulak, een plaats in Kyrgystan. De 70-90 cm hoge bloemsteel is aan de onderkant zeer donker en geribd. De kleur, van de tot 12 cm in doorsnede bloem, is lila met mooie witte meeldraden en purperen helmknopjes. Een wat fijnere, hoge sierui, die in natuurlijke beplantingen mooi tot zijn recht komt.

Bestelnr. 8011

10 st. 4.50

25 st. 10.50



ALLIUM KARATAVIENSE

In 1875 werd de 'puinlook' voor het eerst beschreven. Op de oorspronkelijke vindplaatsen in het Pamir-Alai gebergte en Turkestan (het Kara-Tau gebergte), worden ze tussen los puin van kalksteen op zonnige plaatsen aangetroffen. De glanzende, ellipsvormige blauwgrijze bladeren, gewoonlijk twee per bol, zijn aan de onderzijde paars gekleurd. De grote, bolvormige bloeiwijze bestaat uit stervormige bloempjes, die naarmate de bloei vordert naar achteren buigen. Een prima allium, ook voor op een pot. Het aangeboden mengsel is uit zaad geteeld van *A. karataviense* x 'Red Giant'.

Allium karataviense -mix-

Bestelnr. 6918

5 st.	12.95
10 st.	24.95



Allium karataviense

Bestelnr. 181

5 st.	3.00
10 st.	5.50



Allium karataviense 'Ivory Queen'

Bestelnr. 183


5 st.	3.00
10 st.	5.50



Allium karataviense x 'Red Giant'

Bestelnr. 9436


p.st.	8.95
3 st.	25.50



Allium komarowii

Een weinig aangeboden allium met een compacte halfronde intens violetpaarse bloeiwijze, voorzien van honderden stervormige bloemetjes met violette meeldraden op een 30 tot 40 cm hoge steel. Het smalle blauwgrijze blad blijft lang mooi, bijzonder is dat de bloemen geuren naar chocolade. Herkomst: Tadzjikistan, het Serawschan-gebergte. Vernoemd naar Vladimir Leontiewitch Komarow, een Russische plantkundige.


Bestelnr. 185 3 st. 6.00
 5 st. 9.50



Allium ledebourianum

Inheems op een van de hoogste punten van het Altai-gebergte in Siberië, Mt. Belukha, op 4500 meter hoogte. Het groeit daar onder erbarmelijke omstandigheden in de bergweiden. De bolvormige bloeiwijzen bestaan uit lilaroze bekervormige bloemen. Het blauwgrijze blad is hol. Zowel de bloemen, het blad en de ondergrondse delen worden gegeten.

Bestelnr. 187 5 st. 4.95
 10 st. 9.50




Allium lipskyanum



Jarenlang foutief aangeboden onder de naam *Allium cupuliferum*. Herkomst: Tadzjikistan. De smalle bekervormige naar boven wijzende bloemen, aan de bovenzijde overgaan naar klokvormig, zijn purperpaars. Aanvankelijk vormen zij een dichte compacte bloeiwijze, maar naarmate de bloei vordert, verschillen de bloemsteeltjes van lengte waardoor er een attractief pluizig geheel ontstaat.

Bestelnr. 137 p.st. 3.50
 3 st. 9.75




Allium litvinovii

Arnīs Seisums verzamelde deze in Sari-Chilek, in het zuidoosten van het Chatkal-gebergte in Oezbekistan. De ongewoon blauwe bloemen zijn violetblauw gestreept en vormen een compact bloemscherm op een steeltje van 40 cm hoogte. Vermeedert zich prima en heeft zich in de laatste jaren bewezen als een betrouwbare aanwinst.

Bestelnr. 8481

p.st. 4.50
3 st. 12.75




Allium macranthum

(Synoniemen: *A. oviflorum* en *A. simethis*)

De eerste beschrijving dateert uit 1874. (macro staat voor groot en anthos betekent: bloem). Ze werden in 1872 in Sikkim verzameld door Henry John Elwes (1846-1922). Het verspreidingsgebied strekt zich uit van de Himalaya naar het zuidwesten van China. De 25 tot 40 cm hoge driekantige bloemstelen dragen een 5 cm breed bloemscherm met vijf tot twaalf klokvormige purperrode bijeengepakte bloempjes. Ze voelen zich thuis op een wat vochtige grondsoort met een goede afwatering.

Bestelnr. 191

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Allium 'Miami'

Aanvankelijk ging de mooie introductie als *A. 'Bolero'* door het leven. Een allium met stevige stelen, waarbij één der ouders *A. atropurpureum* is. Waarschijnlijk is de andere ouder *A. schubertii*. Het halfronde, aan de onderkant afgeplatte bloemscherm bestaat uit glanzende stervormige purperrode bloemetjes. Gedurende de bloei wordt de bloeiwijze losser en lijken de eigenschappen van *A. schubertii* zichtbaar te worden.

Bestelnr. 9131


10 st. 4.50
25 st. 10.50



Allium moly 'Jeannine'

Een forsere vorm met mooie bladeren en kaarsrechte bloemstelen. Geeft vrijwel altijd twee bloemstelen per bol. De bloemschermen bestaan uit goudgele bloempjes en verschijnen zeker twee weken eerder dan die van *A. moly*. Dit soortje, in 1978 verzameld in de Spaanse Pyreneeën, werd vernoemd naar de vrouw van Michael Hoog. Brian Halliwell heeft ze naar Engeland meegebracht.

Bestelnr. 197 25 st. 2.50
100 st. 9.00




Allium moschatum

(Synoniemen: *A. capillare*, *A. setaceum*)



Een naar muskus geurende Euraziatische species, voorkomend op droge graslanden van Spanje tot Iran. De teerrose of witte klokvormige bloemen tonen op de buitenzijde van de bloemblaadjes een purperen nerf, met daarin enigszins verscholen de donkerviolette kommavormige meeldraden. Het smalle blad blijft totdat de zaadvorming plaatsvindt groen. Delikaat.


Bestelnr. 6919 3 st. 4.95
5 st. 8.00



Allium 'Mount Everest'

Intro: 1993. Een beste grootbloemige witte allium. De bolvormige bloeiwijze staat stevig op de 100 cm hoge bloemsteel. Een zeer gevraagde cultivar door kwekers die deze topper als bloem op de bloemenveiling aanvoeren. Schitterend te combineren met vaste planten in de border, bijvoorbeeld met *Nepeta faassenii* 'Six Hill's Giant' en *Salvia nemorosa* 'Caradonna'.

Bestelnr. 201 3 st. 6.00
5 st. 9.50




Allium nutans 'Caroline'

Een zilveren medaille van de KVBC winnende selectie uit handen van P. de Jong. Vroeg in het voorjaar ontwikkelen zich de gedraaide lichtgrijze, 30 cm lange bladeren die tot diep in de herfst aanblijven. De bloemstelen hebben in knop een knikkend hoofdje, maar bij de aanvang van de bloei, eind juni, richten zij zich naar boven en ontluiken de lilaroze bloemen.

Bestelnr. 9438

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Allium nutans 'Isabelle'

Eveneens een selectie uit de in Siberië voorkomende *A. nutans*. Isabelle is minder fors, het bijzondere is de roomwitte soms iets roze-achtige bloemkleur. De bolvormige bloeiwijze, die volop bezocht wordt door bijen en vlinders, wordt gedragen door een 50-60 cm lange bloemsteel. Ook hier is het blad gedurende het groeiseizoen aantrekkelijk.

Bestelnr. 9440

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Allium obliquum

Intro: 1753. Herkomst: het aangeboden betreft nazaten van de oorspronkelijk in het Sajan gebergte, in Siberië aangetroffen exemplaren. Overige vindplaatsen: Centraal-Azië en het zuidoosten van voormalig Rusland. De lange witte meeldraden met gele helmknopjes 'spatten' uit de zachtgele bloempjes. Het geheel wordt omgeven door een zachtgroene waas. De bloemstelen zijn bebladerd. Langdurige bloei en goed toepasbaar in de border vanwege de plantopbouw.

Bestelnr. 211

3 st. 6.00

5 st. 9.50




Allium oreophilum

(Synoniemen: *A. ostrowskianum* en *A. platystemon*)

Intro: 1831. Oreophilus: van bergen houdend. Een waardevolle species, bij uitstek geschikt voor de rotstuin, maar ook voor verwilderding. De bladeren vormen een rozet. De bloemsteel is veelal niet hoger dan 15 cm. De half bolvormige bloeiwijze wordt gevormd door een twintigtal sierlijke purperrode stervormige bloemetjes. Ieder bloemblaadje heeft een contrasterende donkere middennerf. Herkomst: Kaukasus, Iran, Pakistan, Afghanistan en delen van Turkije.

Bestelnr. 213

25 st. 2.50
100 st. 9.00




Allium oschaninii

(Synoniem: *A. cepa* var. *sylvestre*)

Deze goed groeiende ui afkomstig uit de bergen ten zuiden van de Fergana-vallei in Oezbekistan is nauw verwant aan de hedendaagse keukenui (*Allium cepa*). De witte bloemen verschijnen in de zomer aan holle bloemstelen die tot een meter hoog zijn. Aan de bloemsteel verschijnt op zo'n 30 cm van de grond een opgeblazen deel van de stengel. Na de bloei drogen ze mooi op en zijn eventueel bruikbaar in droogboeketten.

Bestelnr. 199

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium 'Ostara'

Ostara duidt het begin van de lente aan. Ostara valt op de dag dat de dag en de nacht even lang zijn: balans is op dat punt bereikt. De naam Ostara komt van de Angelsaksische Godin Eostra. Ostara is een tijd van vernieuwing. Een nieuwe allium, dankzij Van Woesik Veredeling. Ontstaan uit *A. karataviense* x *A. atropurpureum*, hoogte en bloemgrootte perfect in balans. Intens paarsrode kleur. Mooi blad.

Bestelnr. 6100

3 st. 6.00
5 st. 9.50




Allium paradoxum var. normale

Boslook. De aangeboden partij is oorspronkelijk verzameld door Janis Ruksans in Azerbeidzjan, Talish-gebergte, groeiend in de schaduw van een rotskloof bij een waterval onder een dichte laag mos, in mei 1987, op een hoogte van 1700 meter. Uit de zeer kleine bolletjes, nauwelijks van een huidje voorzien, ontwaren we in maart een enkel gebogen glanzend blad. De bloeiwijze bestaat uit tien tot vijftien helderwitte klokvormige bloempjes, die tijdens de bloei geen zichtbare meeldraden tonen. De bloemsteel is driekantig. De zaden scheiden een oliehoudende stof af die mieren lokt.

Bestelnr. 215

3 st. 6.75

5 st. 11.00




Allium 'Pinball Wizard'

Evenals A. 'Globemaster' en A. 'Beau Regard' komt deze voortreffelijke ui uit de kruisingsouders: *Allium macleanii* x *Allium christophii*. De naam Pinball Wizard is afkomstig uit de rockopera "Tommy" van The Who uit de jaren zestig. De ontelbare donkerviolette bloemetjes maken tezamen een grote dicht bezette bloem met een doorsnede van 15 cm. Het geheel wordt gedragen door een stevige steel van 85 cm. Het blad blijft gedurende de bloei mooi.

Bestelnr. 205

p.st. 3.95

3 st. 11.25



Allium 'Pink Marshmallow'

Zeer bruikbare zacht lilaroze, bolvormige sierui, niet alleen vanwege de kleur maar ook vanwege de prettige hoogte, 50 cm. In eerste instantie doet deze denken aan een lage vorm van A. *giganteum* of A. *elatum*. Voorheen aangeboden als *Allium loratum*, maar dat is niet juist.

Bestelnr. 8483

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Allium 'Purple Rain'

Mooie transparante bloemen in een diepe tint paars waarover een metaalachtige gloed zit. Een perfecte, luchtige, op vuurwerk gelijkende bloeiwijze, die ook doet denken aan *A. christophii*. De kwaliteit en houdbaarheid van de allium als snijbloem is perfect. Purple Rain heeft zich inmiddels bewezen en is steeds populairder wordend, verwildert goed.

Bestelnr. 8025 10 st. 4.00
 25 st. 9.00

90-100 5-6 15 12-15 12 1



Allium 'Purple Surprise'

In 1984 werd door de heer W. Hey deze selectie geregistreerd. Een nog intensere bloemkleur, een tint dieper dan *A. 'Purple Sensation'*. De bolvormige bloeiwijze bereikt een hoogte van 80 cm. Prima snijbloem en vanwege zijn bloeitijd ook prima te combineren met late tulpen.

Bestelnr. 9289 5 st. 4.95
 10 st. 9.50

80 5-6 15 12-15 16 1



Allium 'Purple Sensation'

(Synoniem: *A. hollandicum* 'Purple Sensation')

Een selectiepartij in 1963 geregistreerd door de heer Jan Bijl. De bloemkleur is dieppaars. Zeker vanwege deze kleur is het een zeer gewaardeerde snijbloem. De aangeboden partij is van kloon geteeld. Dit houdt in dat alle nakomelingen door vegetatieve vermeerdering uit een (streng geselecteerde) plant zijn ontstaan, dat duidelijk te zien is aan de uniformiteit van bloemkleur en hoogte. Het beste alternatief voor *Allium hollandicum* (*A. aflatunense*).

Bestelnr. 217 10 st. 4.50
 25 st. 10.00


60-80 5-6 15 12-15 12 1



Allium ramosum

Herkomst: Centraal-Azië tot en met Siberië. Enigszins naar seringen geurend en langdurig bloeiend tijdens de zomermaanden. De bloemsteel heeft een lengte van zo'n 40-50 cm en wordt omgeven door smalle lineaire bladeren. Het bloem scherm bestaat uit 2 cm grote stervormige witte bloemen, aan de buitenzijde van ieder bloemblaadje verfraaid met een zeer opvallende roodbruine nerf.


Bestelnr. 221 3 st. 4.50
5 st. 7.00



Allium rosenbachianum subsp. rosenbachianum

De zogenaamde True Species, verzameld door Arnis Seisums in Tadzjikistan. Een luchtige bloeiwijze, tot 15 cm in doorsnede, waarbij de witte meeldraden opvallend uitsteken uit de paarse stervormige bloemen. Het blad bevindt zich onderaan de bloemsteel en is glanzend groen.

Bestelnr. 9755 3 st. 7.50
5 st. 12.00




Allium rosenbachianum subsp. kwakense



Aangetroffen in de bergketen Rangon in Tadzjikistan en onderscheidt zich onder andere door het meer opstaande blad. De luchtige bolvormige bloeiwijze toont wijnrode, puntige, glanzende bloemen. Opvallend, vooral door de luchtige, transparante bolvorm waarbij ook hier de witte meeldraden uitsteken.

Bestelnr. 6920 p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium roseum var. roseum

(Syn: *A. amoenum*, *A. carneum* en *A. incarnatum*)

Intro: 1753. Er bestaan aanwijzingen dat al in 1697 melding gemaakt wordt van dit bolgewas. Inheems in de landen rond het Middellandse Zeegebied, maar ook in Noord-Afrika en delen van Turkije komen ze massaal voor. De half bolvormige bloeiwijze bestaat uit tientallen klokvormige satijnroze bloempjes. De smalle bladeren zijn licht behaard. Goed houdbaar snijbloempje en perfect voor verwildering.

Bestelnr. 223 **25 st. 2.50**
100 st. 9.00




Allium sativum var. ophioscorodon

(Synoniem: *A. controversum*)

Knoflook (*Allium sativum*) wordt al in 1601 beschreven in Clusius' "Rariorum Plantarum Historia". De sierwaarde zit 'm in de spiraalvormige bloemstengel. De unieke vorm verdwijnt pas dan wanneer de merkwaardig gebogen, op een reigersbek gelijkende bloem zich opent. De eigenlijk minder interessante bloem is bolvormig en bestaat uit vele buisvormige opeen gepropte witte bloemetjes. De Nederlandse naam luidt: esculaap-ui. Bolgrootte: 'n teentje.


Bestelnr. 225 **5 st. 3.50**
10 st. 6.50



Allium schubertii

Intro: 1896. Herkomst: in het oostelijke gedeelte van het Middellandse-Zeegebied tot in Centraal-Azië. Een werkelijke beauty. De krachtige ca. 40 cm hoge bloemstelen torsen een imposant bolvormig bloemenscherm met een diameter van maar liefst 30 cm bestaand uit ca. 200 lichtroze bloempjes. De tweeslachtige bloemetjes zijn ca. 4 cm lang, terwijl de mannelijke bloempjes een steellengte van 20 cm bereiken. Grillig en zeer curieus. Als snijbloem, maar nog meer als droogbloem van uitzonderlijke waarde.

Bestelnr. 227 **3 st. 4.50**
5 st. 7.00




Allium sikkimense

Een teder juweeltje met een unieke blauwe kleur, groeiend op open vlaktes in Nepal en West-China. Een losjes, knikkend bloemschermje bestaat uit vijf tot twintig belvormige bloempjes. Een belangrijk detail voor herkenning van de soort is: de blauwe meeldraden zijn korter dan bloemdekblaadjes. Het slanke blad heeft ongeveer dezelfde lengte als de bloemsteel.



Bestelnr. 6101

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon

Intro: 1753. Nederlandse benaming: kogel- of kalklook, vanwege de totale plantbouw ook wel trommelstokken (drumsticks) genoemd. De holvormige bladeren omvatten ca. eenderde van de bloemsteel. De ca. 5 cm grote bolvormige en compacte bloeiwijze bestaat uit tientallen kleine klokvormige roodpaarse bloemetjes met uitstekende meeldraden. Herkomst: Middellandse Zeegebied tot in de Kaukasus, de Belgische Ardennen en in de buurt van Bristol. Prima snij- en droogbloem.

Bestelnr. 231

25 st. 2.50
50 st. 4.50
100 st. 8.50




Allium 'Spider'

Intro: 2009. Een nakomeling uit *A. schubertii* x *A. atropurpureum*, maar nu overwegen de uiterlijke kenmerken van *A. schubertii*. Duidelijk vernieuwend, de spiky bloeiwijze in een intensere bloemkleur. Interessant is ook de goed bruikbare lengte, de Spider wordt gedragen door 60 cm hoge stelen, hierdoor komen de bloemen mooi boven lage beplanting uit.

Bestelnr. 9163

5 st. 4.50
10 st. 8.50



Allium tuberosum


(Synoniem: *A. uliginosum*)

Intro: 1825. Bekend onder de namen Chinese bieslook en knoflook-bieslook. Door de eeuwen heen werden in China, Japan en van Zuidoost-Azië tot in India de bladeren van deze ui als ingrediënt bij salades gebruikt. De bladeren zijn smal en aan één zijde afgeplat. De ca. 50 cm hoge bloemstelen zijn voorzien van een wit bloemscherm dat uit vele stervormige bloempjes bestaat. De keel van de bloemen is groen, ieder bloemblaadje heeft een groene nerf.

Bestelnr. 242

5 st. 3.75

10 st. 7.00



Allium unifolium


(Synoniem: *A. grandisceptrum*)

Vaak wordt deze in 1863 beschreven allium verward met *A. murrayanum*. Smalle bladeren, waarvan de grootste enigszins sikkelvormig aandoen, omsluiten de ca. 30 cm hoge bloemsteel. Het bloemscherm bestaat uit nogal grote klokvormige satijnroze bloemetjes. Het nieuwe bolletje groeit met een korte stengel (stoloon) aan de buitenzijde van de knol van het vorige jaar. Herkomst: Californië en Oregon (U.S.A.). Ideaal om te laten verwilderen tussen grijsbladige- en/of blauwbloeiende vaste planten.

Bestelnr. 244

25 st. 2.50

100 st. 9.00



Allium ursinum subsp. ursinum


Intro: 1753. Nederlandse naam: daslook.

Deze woekerende allium komt voor in grote delen van het Noordelijk Halfrond. In Nederland zijn ze op enkele plaatsen verwilderd, maar beschermd. (Stinzenplant). De ovale bladeren doen denken aan die van het Lelietje-der-Dalen. De bloemsteel is duidelijk driekantig. Het half bolvormige bloemscherm bestaat uit witte stervormige bloemetjes. Het blad is eetbaar en werkt cholesterol verlagend. Ook de ondergrondse delen zijn eetbaar. De plant verspreidt een intense uiengeur.

Bestelnr. 246

10 st. 4.00

25 st. 9.50




Allium victorialis

(Synoniemen: *A. microdictyum*, *A. ochotense* en *A. latissimum*)

Intro: 1753. Victorialis betekent: overwinnen, zegevieren. De botanische naam van deze species werd ontleend aan de Europese mythologie ten tijde van de middeleeuwen. Verspreid voorkomend over Zuid-Europa, en noordelijk Azië. De kogelvormige witte bloeiwijze heeft een diameter van 3 tot 5 cm. Het blad lijkt op dat van het Lelietje-der-dalen. De planten werden zowel vers als gezouten gegeten.

Bestelnr. 248

p.st. 2.95
3 st. 8.25




Allium 'Violet Beauty'

In 1979 werd deze cultivar geregistreerd door J.J.M. Twaalfhoven. De glanzende bloem doet denken aan *Allium christophii*, wellicht was het één der kruisingsouders. De bloemkleur is violet-achtig met op ieder kelkblaadje een groenig streepje. Lang houdbare snijbloem. Zeker een aanrader, door het verfijnde karakter goed toepasbaar vooraan in de border.

Bestelnr. 252

10 st. 3.00
25 st. 7.00




Allium 'White Giant'

Een extra hoge allium waarvan de sneeuwwitte bollen op stevige 150 cm forse stelen staan. Het blad is opvallend stevig, naar boven gericht en donkergroen van kleur, op het moment van bloei afstervend. Een speels effect wordt bereikt door *A. 'White Giant'* samen met *A. 'Mount Everest'* te planten.

Bestelnr. 8501

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Allium woronowii


2015

Een zeer variabele species, heerlijk geurend naar anjers. Wijd verspreid voorkomend in Turkije en Armenië. De tot 60 cm hoge bloemstelen dragen een compacte, dichte bolvormige bloeiwijze met stervormige bloemen. Het uit zaad vermeerderde aanbod bevat verschillende kleuren. *A. woronowii* zal makkelijk hybridiseren met andere soorten.

Bestelnr. 6921

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Allium zebdanense


(Synoniem: *A. chionanthum*)

Dit in 1859 beschreven sieruitje vertoont enige gelijkenis met de eerder beschreven *A. cowanii* maar dan wel als een vroegbloeiende en verfijnde uitgave. De bladeren zijn zeer smal en aan het uiteinde gekruld. Het bloemscherm bestaat uit 8-10 stervormige witte bloemetjes. Op de drie buitenste bloemblaadjes is een fijn groen nerfje zichtbaar. Prima soortje voor verwildering. Herkomst: Libanon.

Bestelnr. 255

25 st. 3.50

100 st. 13.00



STINZENBOLLEN.NL

Stinzenplanten (van het Friese woord 'Stins' voor 'stenen huis') vormen een bijzondere groep verwilderende sierplanten, vaak bolgewassen, die thuishoren op historische buitenplaatsen. Meestal werden zij als sierplant of medicinale plant uit Zuid- en Midden Europa meegebracht. Bijvoorbeeld sneeuwkllokjes, boerenkrokussen, witte en gele bosanemonen, wilde boshyacinten, daslook en nog veel meer. Ieder voorjaar zijn de kleurige tapijten van deze stinzenbloemen weer te bewonderen onder de dan nog kale bomen van onze historische parken en landgoederen.

Een compleet overzicht treft u aan op: WWW.STINZENBOLLEN.NL

Nederlandse benaming: anemoon of windbloem. **Herkomst:** van Zuidoost-Europa tot en met Centraal-Azië. Carolus Clusius introduceerde ruim 400 jaar geleden dit gewas in Nederland. Anemonen zijn vooral geliefd om hun contrasterende, felle kleuren. Er zijn wel 70 soorten bekend. Volgens een Griekse sage: De tranen die Aphrodite om de stervende Adonis weende, rolden op de aarde en veranderden in anemonen.



Anemone apennina 'Petrovac'


Geïntroduceerd door Paul J. Christian. **Herkomst:** het voormalige Joegoslavië. Ook in Nederland komt *A. apennina* nog sporadisch (stinsenplant) voor. Een weinig aangeboden vorm met helderblauwe bloempjes. Schitterend varenachtig zacht behaard blad. Ideaal voor onderbeplanting in de halfschaduw op een humusrijke grond.



Bestelnr. 270

p.st. 2.95

3 st. 8.25



Anemone apennina var. alba


Intro: 1771. De smalle bloemblaadjes (10 tot 20 in getal) zijn aan de onderzijde licht hemelsblauw, terwijl de binnenzijde geheel wit is. De oorspronkelijke *A. apennina* komt voor in beboste streken in het zuiden van Europa, o.a. de Apennijnen in Italië, maar ook op het eiland Corsica en zelfs in Bulgarije. Uit de verdikte wortelstokjes verschijnen in het vroege voorjaar gelobde en getande varenachtige zacht behaarde donkergroene blaadjes.



Bestelnr. 272

3 st. 6.00

5 st. 9.50





ANEMONE BLANDA

Van voor 1700 dateren de eerste beschrijvingen van deze in Zuidoost-Europa, Cyprus, de Kaukasus en West-Turkije voorkomende species. Door kruisingen en veel selectiewerk zijn de tegenwoordig aangeboden cultivars ontstaan. Oosterse anemoontjes zijn prima te gebruiken voor verwildering. Maar ook leuk in potten te combineren met bijvoorbeeld vergeet-mij-niet en viooltjes. Het aangeboden mengsel is een unieke mix die ontstaan is uit kruising van de grootbloemige 'White Splendour' x 'Radar' met het mooie witte hart.

← Anemone blanda 'White Splendour'

Bestelnr. 280	25 st.	5.00
	100 st.	19.00



Anemone blanda 'Blue Shades'

Bestelnr. 274	25 st.	2.50
	100 st.	9.00




Anemone blanda 'Twinkeling Eyes'

Bestelnr. 6010	10 st.	4.95
	25 st.	12.00



Anemone blanda 'Charmer'

Bestelnr. 276	10 st.	3.00
	25 st.	7.00





Anemone coronaria 'Mr. Fokker'

Bestelnr. 8053	25 st.	3.00
	100 st.	11.50

ANEMONE CORONARIA

In Griekse weilanden worden de grootbloemige, kleurige anemonen nog volop aangetroffen. Het zijn prima snijbloemen en laten zich ook goed combineren met andere bolgewassen, zoals de laatste jaren veelal op de Keukenhof wordt toegepast.

De anemonen bloeien langer als de uitgebloeide bloemen er met steel en al worden uitgedraaid. De aangeboden knollen zijn Nederlands geteeld.

**Anemone coronaria
-bicolor type-**

Bestelnr. 8047

25 st.	4.00
100 st.	15.00



**Anemone coronaria
'Hollandia'**

Bestelnr. 8051

25 st.	3.00
100 st.	11.50



**Anemone coronaria
'Bride'**

Bestelnr. 8049


25 st.	3.00
100 st.	11.50



**Anemone coronaria
'De Caen'**

Bestelnr. 8503

25 st.	3.00
100 st.	11.50



Anemone x lipsiensis


(Synoniem: *A. x seehmanii*)

Een lieflijk en rijk bloeiend anemoontje, ontstaan uit een natuurlijke kruising van *Anemone nemorosa* x *Anemone ranunculoides*. Enigszins variabel, komt nog voor op plaatsen waar beider ouders in de natuur naast elkaar groeien. Zacht primulagele bloempjes in maart-april. Niet te droge grond, prima voor verwildering in de halfschaduw tot schaduw.

Bestelnr. 266

3 st. 4.50

5 st. 7.00




Anemone nemorosa

Bosanemoon (nemorosus staat voor: in het bos groeiend). Een snelgroeïende bodembedekkende wortelstokvormende plant die een zeer groot verspreidingsgebied kent (van Lapland tot en met de laars van Italië, maar ook in Azië en Noord-Amerika). De bosanemoon was al in de 16e eeuw bekend. De bloemkleur is wit met aan de buitenkant van de bloembladeren een blos van lila-achtig roze. Een bladrozet ontwikkelt zich na de bloei.

Bestelnr. 292

25 st. 4.00

100 st. 15.00



Anemone nemorosa 'Alba Plena'


(Synoniemen: *A. n. 'Pleniflora'* en *A. n. alboplena*)

Intro: 1771. Een gevuldbloemige witte vorm van *A. nemorosa*. De bloempjes zijn iets kleiner dan die van *A. nemorosa* 'Vestal' en wat onregelmatiger van vorm. We bieden een mooie selectie aan.

Bestelnr. 294

5 st. 4.50

10 st. 8.50



Anemone nemorosa 'Allenii'


Er zijn inmiddels vele selecties van *A. nemorosa* geïntroduceerd, maar deze uit 1907 gevonden door Mr. J. Allen van Shepton Mallet, bekend van vele sneeuwklorkjesintroducties, behoort nog steeds bij de mooiste. De wat grotere bloemen zijn zacht lavendelblauw met een rozelila gloed over de buitenste bloemblaadjes.



Bestelnr. 314

p.st. 3.75

3 st. 10.50



Anemone nemorosa 'Blue Eyes'


Een halfgevulde witbloeiende bosanemoon. Naarmate de bloei vordert, zo halverwege de bloei, verschijnt een prachtig blauw hartje in de bloem. Pas echt mooi wordt het, als de knolletjes een paar jaar vast staan.



Bestelnr. 9169

p.st. 3.50

3 st. 9.75



Anemone nemorosa 'Frühlingsfest' 2015


Opvallende en herkenbare bosanemoon met grote witte bloemen. Op de binnenzijde van de bloemblaadjes is een spoortje roze te herkennen. De buitenzijde is vanuit de basis roze, verbloeiend naar het wijnrood richting de uitbloei. Het blad is donker gekleurd.



Bestelnr. 6922

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Gerry'


Helderblauwe, relatief grote bloemen waarover zich een zilvergrijze gloed bevindt. De bloemen worden gedragen door korte bloemsteeltes.



Bestelnr. 9907

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Anemone nemorosa 'Green Fingers'


Uit het hart van de witte bloem ontstaan groene vergroeiingen, de 'groene vingertjes'. De bloemblaadjes zijn breder dan bij andere species. Oorspronkelijk uit Ierland afkomstig.



Bestelnr. 9171

p.st. 4.50

3 st. 12.75



Anemone nemorosa 'Hilda'


Een ongelooflijk rijkbloeiende witte vorm met meer bloemblaadjes, soms het dubbele aantal, dan normaal. 'Hilda' is ooit in het wild aangetroffen in Denemarken, in de buurt van Slagelse, Seeland door Dean Ulrich Toubol.



Bestelnr. 8505

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Anemone nemorosa 'Monstrosa'


Een protserig anemoontje. De witte bloemen zijn omsloten door een kraag van vergroeide lichter groene bloemblaadjes. Vaak ontstaat er een blauwige gloed in de bloem die vanuit het hart van donker naar licht kleurt. Leuk.



Bestelnr. 9909

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Robinsoniana'

(Synoniem: *A. nemorosa* 'Caerulea')

Werd in ca. 1870 geïntroduceerd door de heer William Robinson, een invloedrijk Victoriaanse hovenier en journalist die deze anemoon aantroef in de Botanische Tuin van Oxford, vanwaar deze uit lerland was terechtgekomen.


Bloemkleur: lichtblauw, aan de buitenzijde grijsig.



Bestelnr. 300

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Anemone nemorosa 'Royal Blue'


Koninklijk blauwe bloemen, het diepste blauw van alle cultivars, mooi afstekend bij het donkere diep ingesneden loof. Verdienste in 1915 een Award of Merit. De gehele plantopbouw is verfijnd en gracieus.



Bestelnr. 302

5 st. 4.95

10 st. 9.50




Anemone nemorosa 'Vestal'

Geïntroduceerd door de Duitse botanicus Maximilian Leichtlin (1831-1910). Verreweg de mooiste witte gevuldbloemige *A. nemorosa*. De bloemen zijn groter dan die van *A. nemorosa* 'Alba Plena' en de stand van de bloemblaadjes is fraaiër. Bijna 'Camelia-achtig'.

Bestelnr. 304

5 st. 6.00

10 st. 11.00




Anemone ranunculoides subsp. ranunculoides

Intro: 1596. Een bijzonder attractieve anemoon die, met uitzondering van het Middellandse Zeegebied, in vrijwel geheel Europa voorkomt. Deze anemoon vertoont in habitus enige gelijkenis met *A. nemorosa*. De mooie donkergele bloemen bestaan uit 5-8 breed eivormige bloemblaadjes, aan de achterzijde voorzien van haartjes. Voor een beschaduwde plek.

Bestelnr. 310

10 st. 3.50

25 st. 8.00




Anemone ranunculoides 'Pleniflora' 2015

Een gevuldbloemige vorm waarbij de goudgele bloemblaadjes regelmatig geordend zitten. De buitenste bloemblaadjes zijn groen, aan de uiteinden donkerrood. Her en der zijn de bloemblaadjes groen aangetipt. Een mooie vorm van de zeer variabele *A. ranunculoides*.

Bestelnr. 308

3 st. 7.50

5 st. 12.00



De naam werd ontleend aan de Griekse woorden 'aron' (arum of aronskelk) en 'haima' hetgeen bloedrood betekent en zinspeelt op de meestal rode bessen die de van wortelstok voorziene plant in het najaar sieren. Er zijn vele tientallen species bekend. De meeste vinden we in Azië, een enkeling in tropisch Afrika, terwijl *A. triphyllum* voorkomt in het oosten van de Verenigde Staten en het zuiden van Canada. Het geslacht *Arisaema* bestaat uit vele fascinerende planten die, ofschoon ze op exoten lijken, op lichtbeschaduwde plekjes in een humusrijke omgeving eenvoudig zijn te kweken. In het voorjaar is er meer aanbod van *Arisaema*. Komt u daarvoor gerust eens langs op het plantencentrum in Heemstede, of kijk op de website www.nijssenbulbs.nl



Arisaema ciliatum var. *liubaense*


In september 1991 verzameld nabij Liuba in Sichuan, China. Aanvankelijk werd gedacht aan *A. consanguineum*, later bleek dit een vorm van *A. ciliatum* te zijn. De auteurs Guy & Liliane Gusman van het boek 'The Genus Arisaema' plaatsten een foto van deze *Arisaema* op de kaft, zo mooi. De bloeischede is purper met groene en witte lengtestrepen. De bladeren vormen een paraplu die zich boven de bloemen bevindt. De rode bessen verschijnen na de bloei.



Bestelnr. 9667

p.st. 7.50

3 st. 21.00



Arisaema robustum


(Synoniem o.a.: *A. amurense* subsp. *robustum*)

Intro: 1859. Herkomst: het oosten van Siberië, op het eiland Primorskij Kraj in de rivier Amur, China, Japan en Korea. Houdt van een beboste omgeving met wat lichte schaduw. De gerekte en gepunte bloeischede is groen met in de lengte witte strepen. De bloeikolf is groen, soms met een vleugje paars. In een volwassen stadium is het blad driezijdig met twee zijdelingse gedeelten, hetgeen de indruk wekt dat ieder blad uit vijf blaadjes zou bestaan. In de herfst ontstaan opvallende oranje bessen. Volledig winterhard.

Bestelnr. 8061

p.st. 9.50

3 st. 27.00



Nederlandse naam: Aronskelk. Deze oorspronkelijke bosplanten zijn vooral bekend om de fraaie bessen in het najaar. Er zijn een vijftiwintigtal species bekend van Europa tot Centraal-Azië. Aronskelken zijn eenhuizig: de mannelijke bloemen bevinden zich in het bovenste gedeelte van de kolf, de vrouwelijke bloempjes, voorzien van een 'eenvoudig' vruchtbeginsel, in het onderste deel.



Arum euxinum


Inheems in de bergen langs de Zwarte Zeekust van Noord-Turkije, een koud en vochtig gebied. Het donkergroene, compacte blad ontwikkelt zich in mei, tegelijkertijd met de bijzondere, geurloze bloem. De schede is aan de buitenzijde groen, purper omrand. De binnenzijde is crèmewit, onregelmatig purper gekleurd naar de rand en de top.



Bestelnr. 6104

p.st. 13.50

3 st. 39.00



Arum italicum


Intro: 1693. Italiaanse Aronskelk. Herkomst: Canarische eilanden, Cyprus, Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje en Engeland. Komt verwilderd voor in Zuid-Limburg. De spits toelopende bladeren hebben een duidelijke witte nervatuur. De 'bloemen' treffen we aan op de heldergele kolf die door een lichtgele schede, gedeeltelijk, wordt omsloten. In de nazomer verschijnen orangerode bessen. Op het Kanaaleiland Guernsey werden ze ooit massaal gekweekt vanwege het voedzame zetmeel.



Bestelnr. 321

5 st. 3.25

10 st. 6.00




Arum italicum subsp. albispathum

Herkomst: het schiereiland Krim en de Kaukasus. Het aanbod is afkomstig van materiaal dat oorspronkelijk is verzameld in het noorden van de Kaukasus. De bloemschede is sneeuwwit, afgezet met een prachtig contrasterend purperen randje. Het spits toelopende blad is groen. In het najaar verschijnen de orangerode bessen. Deze aronskelk heeft permanent een licht vochtige bodem nodig.

Bestelnr. 8517

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Arum maculatum

Gevlekte aronskelk. Herkomst: Grote delen van Europa tot in de Oekraïne. De bladeren zijn soms voorzien van paarse streepjes en spikkels. Het schutblad is licht groengeel met paarse spikkeltjes. De bessen worden in het najaar gevormd. Het is een snelle groeier op een niet te droge bodem.

Bestelnr. 323

3 st. 4.95
5 st. 7.50




Arum pictum

(Synoniem: *A. corsicum*)

De enige herfstbloeiende species. Inheems op Corsica, Sardinië en Spanje. De bloemschede is paars aan de binnenkant, lichter aan de buitenzijde en bereikt een hoogte van 40 cm. De bloemkolf is bijna zwart. Tijdens de bloei verspreidt de plant een onaangename geur. De bladeren verschijnen na de bloei en zijn voorzien van een schitterende zilverkleurige adering.

Bestelnr. 325

p.st. 8.50
3 st. 24.00



Het geslacht *Bellevalia*, waarvan een veertigtal species is bekend, verschilt van het geslacht *Muscari* met de volgende kenmerken: de bloempjes zijn aan het einde duidelijk geopend en zijn buis- of trechtervormig. De helmknoppen reiken TOT de opening van de bloempjes, dus: NIET uitstekend. De soorten komen voor van Frankrijk, Turkije en Israël tot in Iran, Afghanistan en Pakistan.




Bellevalia pycnantha

(Synoniemen: *Muscari paradoxum* en *Muscari pycnantha*)

Intro: 1835. Herkomst: Oost-Turkije, Noordwest-Iran en Noord-Irak waar zij in vochtige weides groeien. Zeer opvallende donkerblauwe bijna zwarte bloemkleur. Leent zich uitstekend voor verwildering en komt ook goed tot zijn recht in potten, bijvoorbeeld in combinatie met andere voorjaarsbloeiers.

Bestelnr. 337

10 st. 2.50
25 st. 6.00




Bellevalia pycnantha 'Green Pearl'

Intro: 2001. Een selectie met zachtgroene bloemtrossen die bij het ontluiken van de knoppen naar crèmewit kleuren. Goed bruikbare, subtiele tint. Geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 9669

10 st. 4.00
25 st. 9.50



Bellevalia romana

(Synoniem: *Hyacinthus romanus*)

Herkomst: het zuidwesten van Frankrijk en het mediterrane gebied van Frankrijk tot Turkije. De klokvormige bloemetjes staan verspreid langs een 15 cm hoog bloemsteeltje. De bloemkleur is 'gebroken' wit met een vleugje groen aan de buitenzijde, de topjes van de bloempjes zijn blauw getipt. Opvallend zijn de blauwzwarte helmknoppen. Ze houden van een goed doorlatende grond.

Bestelnr. 339

10 st. 2.50
25 st. 6.00



BIARUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ARACEAE

Biarum marmarisense


(Synoniem: *B. davisii* subsp. *marmarisense*)



Herkomst: Zuidwest Turkije. De zeven tot negen cm grote bloemschede verschijnt zonder blad in september-oktober. Het blad ontwikkelt zich na de bloei. De stengelloze rariteit kan het best in een pot in een kasje gekweekt worden. Zanderige bodem, volle zon. De bloem geurt zoet.

Bestelnr. 2108

p.st. 7.50
3 st. 21.00




Biarum tenuifolium



Wijd verspreid voorkomend in het Mediterrane gebied, het aanbod is afkomstig uit het hart van Athene, op de heuvel van de Acropolis. Een makkelijk te houden species voor een zonnige warme standplaats op doorlatende bodem. De bloemschede is tot 15 cm lang, van onderen bleek, naar boven donkerder purperbruin kleurend. De drie of vier bladeren verschijnen na de bloei en zijn vaak onregelmatig van vorm en grootte.

Bestelnr. 2192

p.st. 7.95
3 st. 22.50



BULBOCODIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER COLCHICACEAE


Bulbocodium vernum

Nederlandse naam: 'de rode krokus'. Is bekend sinds 1629. Komt voor in de Pyreneeën, de Alpen, de Balkan en de Kaukasus. *Bulbocodium* is nauw verwant aan *Colchicum*. De bladeren die zich vlak voor of tijdens de bloei ontwikkelen, bereiken na de uitbloei een lengte van 15-20 cm en sterven in de vroege zomer af. De bloemen die in januari tevoorschijn komen, zijn zachtlila. Ze verlangen een goed gedraineerde grondsoort.

Bestelnr. 2101

10 st. 3.50

25 st. 8.00



CALOCHORTUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER LILIACEAE

Calochortus 'Cupido'




Vlindertulp. De naam *Calochortus* komt uit het Grieks. Kalos (mooi of sierlijk) en chortos (gras). Dit staat voor de grasachtige bladeren. Er zijn een zestigtal species bekend, deze worden aangetroffen in grote delen van Californië. De bolletjes zijn eetbaar. Plant de *Calochortus* niet te vroeg in de herfst op een doorlatende grond. Cupido blijft vrij laag en heeft zachtroze bloemen.

Bestelnr. 360

10 st. 2.50

25 st. 6.00



CAMASSIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Camassia is een van de bijzondere bolgewassen die uitstekend tot zijn recht komt in een border, maar ook is aan te bevelen voor begroeiing onder heesters. De herkomst van de meeste *camassia*'s ligt in Noord-Amerika waar de bollen tot deze eeuw als voedsel dienden voor de Indianen, waaraan de naam *Camassia* (naar Quamash of Camass) werd ontleend. Naast een voedselrijke zandgrond gedijt *Camassia* ook op een zwaardere kleigrond, zolang de grond in de winter maar niet te nat blijft.



Camassia leichtlinii 'Caerulea'


Statige, blauwe bloemtrossen, bezet met grote stervormige donkerblauwe bloemen, worden gedragen door stevige rechte bloemstelen. *Camassia* laat zich perfect combineren in de border met vaste planten. De donkergroene, decoratieve, lineaire bladeren omvatten de bloemsteel rondom en wijzen schuin omhoog.



Bestelnr. 376

5 st. 3.50

10 st. 6.50



Camassia leichtlinii 'Sacajawea'


De roomkleurige bloemen worden bij deze *Camassia* begeleid door delicaat bont blad. Het smalle blad heeft een roomkleurig randje. Vernoemd naar het Indiaanse meisje Sacajawea die als vrouw van de tolk en gids van de Frans-Canadese handelaar Charbonneau betrokken was bij de Expeditie van Lewis en Clark (1804-1806). Door hen te voeden met Camassiabollen werden zij van de hongersnood gered.



Bestelnr. 9913

5 st. 4.00

10 st. 7.50



Camassia leichtlinii 'Semiplena'


Een steriele halfgevulde vorm. De roomkleurige bloemen met ietsje groen bevinden zich aan 60-80 cm hoge bloemstelen. Doordat de bloemen steriel zijn, bloeien zij nog langer. Prima en opvallende snijbloem.



Bestelnr. 378

5 st. 5.50

10 st. 10.50



Camassia quamash

(Synoniem: o.a. *C. esculenta*)

Afkomstig uit Californië, en oostwaarts tot Montana en Utah. De 6 tot 8 lijnvormige bladeren zijn blauwgroen en de tot 35 cm lange bloemstelen dragen 10 tot 30 stervormige zacht violette bloempjes met een zweem van blauw. Zeer geschikt voor verwildering in een bloemenweide.



Bestelnr. 380

25 st. 3.50

100 st. 12.50



CHIONODOXA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Uit het Grieks: chion (sneeuw) en doxa (glorie, roem). Vandaar de Nederlandse naam: sneeuwroem. Een vroegbloeiend bolgewasje, het merendeel afkomstig van Kreta en uit Turkije. De sneeuwroem is bijzonder geschikt voor verwildering, bijvoorbeeld als onderbegroeiing van heesters. Ze zijn nauw verwant aan het geslacht *Scilla*.



Chionodoxa 'Blue Giant'


Een selectie uit 1997. Wellicht de mooiste *Chionodoxa*, schitterende grote, aan de buitenzijde korenbloem-blauwe bloemen met een sprekend ivoorwit hart. De binnenzijde van de bloemblaadjes is moors- tot paarsblauw. Bloeit lang, zes tot acht weken. In 2010 ontving 'Blue Giant' een jubileumgetuigschrift van de K.A.V.B.



Bestelnr. 387

10 st. 3.00

25 st. 7.00



Chionodoxa luciliae


(Synoniem: *Chionodoxa gigantea*)

Intro: 1878. In de Taurus verzameld door de Zwitserse botanicus Pierre-Edmond Boissier (1810-1885), die deze sneeuwroem vernoemde naar zijn jong gestorven echtgenote Lucile. Bloemsteeltjes met één of twee lavendelblauwe bloempjes met een wit hartje.



Bestelnr. 391

25 st. 2.50
100 st. 9.00



Chionodoxa luciliae 'Alba'


(Synoniem: *C. gigantea* 'Alba')

Geselecteerd door Barr & Sons in 1885. Bloemkleur: helderwit. Goed te gebruiken om bijvoorbeeld te mengen met de blauwe *C. luciliae* en dan uit te strooien om te laten verwilderen.



Bestelnr. 393

25 st. 3.00
100 st. 11.00




Chionodoxa luciliae 'Rose Queen'

Al in 2008 geregistreerd, uit handen van R. Huijg, Breezand. Een goed onderscheidende roze selectie die zich prima laat combineren met andere voorjaarbloeiende bolgewassen. Verwildert goed onder bladverliezende heesters.



Bestelnr. 9914

25 st. 3.50
100 st. 12.50




Chionodoxa luciliae 'Violet Beauty'

Als aanvulling op het sortiment sneeuwroem, een mooie grootbloemige vorm met licht blauwviolet-lette bloemen. Rijkelijk bloeiend in maart-april. Leuk voor in potten gecombineerd met *Viola cornuta*.



Bestelnr. 8071

25 st. 3.50
100 st. 12.50




Chionodoxa 'Pink Giant'

Een grootbloemige zachtroze selectie uit de jaren veertig in de vorige eeuw. De stervormige bloemen met de witte ogen kijken bij zonnig weer wijd geopend naar boven. Ook in deze tint een heerlijke voorjaarsbode die evenals *C. 'Blue Giant'* in 2010 een jubileumgetuigschift van de K.A.V.B. mocht ontvangen.



Bestelnr. 389

25 st. 3.50
100 st. 12.50




Chionodoxa sardensis

(Naar von Sardus). Herkomst: West-Turkije. Werd in 1883 geïntroduceerd door Barr & Sons. Elk bloemsteeltje heeft wel tien gentiaanblauwe bloempjes, waarbij het witte oogje nauwelijks waarneembaar is.



Bestelnr. 395

25 st. 3.50
100 st. 12.50



Chionodoxa siehei

(Synoniemen: *Scilla siehei*, foutief *C. forbesii* en *C. luciliae*)


Intro: 1880. Herkomst: West-Turkije. De 15-20 cm hoge bloemsteeltjes zijn aan het uiteinde voorzien van vier tot tien blauwe bloempjes met een groot wit hart. Werd in voorgaande jaren aangeboden onder de naam *C. forbesii*, maar die naam is volgens Brian Mathew foutief.



Bestelnr. 385

25 st. 2.50



100 st. 9.00



COLCHICUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER COLCHICACEAE

De Nederlandse benaming 'herfsttijloos' dankt de *Colchicum* aan het veelal verschijnen van de bloemen in de herfst, gevolgd door de bladeren en de vruchten in het voorjaar en voorzomer. Het voor- en najaarsbloeiende knolgewas houdt van een licht beschaduwde plaats, bijvoorbeeld als onderbeplanting van bladverliezende heesters op een wat vochtige maar goed doorlatende grond. De naam *Colchicum* is afgeleid van één der oorspronkelijke vindplaatsen, namelijk de streek Colchis in Klein-Azië, de streek waar de mythologische gifmengster Medea woonde. Ook worden ze aangetroffen in Iran, Turkestan en in grote delen van Europa. Het is al eeuwen bekend dat de herfsttijloos o.a. het alkaloïde colchicine bevat dat in de medische wetenschap gebruikt wordt. *Colchicum* (en dan vooral de grotere maten) is geschikt voor het binnenshuis in bloei brengen. Wat voorheen onder *Merendera* werd aangeboden, treft u nu bij *Colchicum* aan.



Colchicum autumnale


(Synoniemen: *C. autumnale* var. *minus* en *C. autumnale* var. *minor*)

Intro: 1561. (Cultuurvormen ontstaan na 1753). Een species die in grote delen van Europa wordt aangetroffen, met uitzondering van het zuiden en zuidwesten. In Nederland worden ze nog aangetroffen in Zuid-Limburg en in het riviereengebied langs de Maas en de Gelderse IJssel. De stinzenplant is op de oorspronkelijke vindplaatsen meestal vermengd met de witte vorm en heeft meerdere lilaroze tinten. In Engeland noemt men ze: Naked-Ladies.

Bestelnr. 2104

3 st. 7.95

5 st. 12.50




Colchicum autumnale 'Alboplenum'

Een gevuldbloemige witte vorm van *C. autumnale* met een vleugje roze op de hartblaadjes. In 1872 ontving deze *Colchicum* al een getuigschrift Eerste Klasse van de Royal Horticultural Society. Uit één bol ontluiken meerdere bloemstelen, hetgeen een lange bloei genereert.



Bestelnr. 2106

p.st. 3.95
3 st. 11.25



Colchicum 'Beaconsfield'


2015

Een oudje, waarschijnlijk *C. speciosum* x *C. bivonae*. Een vroege hybride met lange, helder lila bloemen waarop een intens ruitvormig patroon zichtbaar is.



Bestelnr. 6923

p.st. 9.95
3 st. 28.50




Colchicum bivonae 'Apollo'

Een robuuste cultivar die bij vele kruisingen, waaruit meerdere grootbloemige hybriden zijn ontstaan, gebruikt is als ouder. Grote bekervormige, geurende magenta-purperen bloemen met een wit hart, verschijnen met z'n zessen aan een steel, gebruikelijk twee stelen per bol! *Colchicum bivonae* is inheems in het Mediterrane gebied, Corsica tot West-Turkije.



Bestelnr. 2186

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Colchicum byzantinum


(Synoniemen: *C. autumnale* var. *majus*
en *C. autumnale* var. *major*)

Deze, waarschijnlijke hybride van *C. cilicicum*, werd in 1597 voor het eerst waargenomen in Klein-Azië. Het brede, sterk geribde blad verschijnt nooit eerder dan in het voorjaar. Uit de opvallend grote knol ontluiken een twintigtal purperroze bloemen. Eén der beste voor kamercultuur om droog te laten bloeien, maar dan wel direct na de bloei de tuin in.

Bestelnr. 2111

3 st. 6.75

5 st. 11.00



Colchicum cilicicum 'Purpureum'

(Synoniem: *C. cilicicum* var. *purpureum*)




Een keizerlijk paarse vorm van de in Turkije, Syrië en Libanon voorkomende species *C. cilicicum*. De geurende bloemen zijn verfraaid met ragfijne grijswitte nerfjes op de buitenzijde van de bloemblaadjes. Stelt weinig bodemeisen en verdraagt prima volle zon.

Bestelnr. 6924

3 st. 6.75

5 st. 11.00



Colchicum 'Faberge's Silver'




Een waardevolle selectie van Leonid Bondarenko. De buitenkant van de zachtlila, eivormige bloemen lijkt verzilverd, de topjes van de bloemblaadjes zijn zilverwit.

Bestelnr. 9652

p.st. 13.50

3 st. 39.00




Colchicum giganteum

In 1890 geïntroduceerd door M. Leichtlin. Herkomst: het gebergte rond de Zigana Pass, ongeveer vijftig kilometer ten zuidwesten van de stad Trabzon, Turkije. Een *Colchicum* nauw verwant aan *C. speciosum*, maar de zacht lila bloemen van *C. giganteum* zijn breed trechtervormig, terwijl de bloemen van *C. speciosum* bol- of klokvormig zijn.



Bestelnr. 6105

3 st. 6.75
5 st. 11.00




Colchicum 'Harlekijn'

Intro: 1988. Het is één der vele nazaten die voortvloeiden uit de door de heren Visser, Sint Pancras, verrichte selectiewerkzaamheden. Een ongewone kleur voor de middelgrote bloemen. De buitenzijde van de bloemblaadjes is amethyst-violet met roomwitte bloemtopjes. De binnenkant is ivoorwit met een amethyst-violette rand.



Bestelnr. 2117

p.st. 5.50
3 st. 15.00




Colchicum hungaricum 'Valentine'

C. hungaricum komt o.a. voor in Hongarije, het voormalige Joegoslavië, Albanië, Griekenland en Bulgarije en is in 1921 geïntroduceerd. Het aanbod is een grootbloemige, roze bloeiende, Nederlandse selectie, door Antoine Hoog vernoemd, omdat deze meestal op Valentijnsdag in volle bloei staat.



Bestelnr. 2216

3 st. 6.75
5 st. 11.00



Colchicum hungaricum 'Veleit Star'


Dit is een robuuste vorm van *Colchicum hungaricum*, afkomstig uit het Dalmatisch kustgebergte. Bloeit rijker dan de meeste gekweekte vormen en verdraagt slechte weersomstandigheden goed. Schitterend zijn de blauwe helmknoppen.



Bestelnr. 2115

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Colchicum 'Innocence'



(Synoniem: *C. byzantinum* var. *album*)


Een zeldzaam geworden rijkbloeiende, witte, steriele vorm van *C. byzantinum*, destijds in 2000 door C.P.J. Breed geregistreerd. In eerste instantie zijn de bloemen zacht purper van tint, maar in volle bloei zijn de bloemen sneeuwwit met meestal roze of violetpurper gekleurde topjes aan de bloemblaadjes.



Bestelnr. 2113

p.st. 11.50

3 st. 33.00



Colchicum kesselringii

(Synoniemen: *C. crociflorum*, *C. albertii* en *C. regelii*)


Intro: 1880. Herkomst: Turkestan en het noordoosten van Afghanistan, vaak samen groeiend met *C. luteum*. Een variabele species waardoor er inmiddels meerdere kloonpartijen aangeboden worden door specialisten uit Litouwen en Letland. De bloemblaadjes zijn aan de binnenzijde wit. Aan de buitenzijde zijn ze in het midden voorzien van paarse strepen.



Bestelnr. 2121

p.st. 19.50

3 st. 57.00




Colchicum luteum 'Vahsh'

C. luteum is de enige bekende gele *Colchicum* die vanaf februari bloeit. De aangeboden kloon is verzameld in Tadzjikistan door L. Bondarenko. Mogelijk is dit de grootste en de rijkst bloeiende species. De drie tot vier goudgele bloemen worden veelal door een bruinpurperen bloembuis omvat. Het blad verschijnt vrijwel gelijktijdig met de bloemen.

Bestelnr. 2198

p.st. 17.50
3 st. 51.00




Colchicum speciosum 'Album'

Geïntroduceerd door de Backhouse Nursery of York. Vanaf 1900 meerdere malen onderscheiden. Misschien wel de mooiste witte *Colchicum* die er is. Stevige drinkbekervormige witte bloemen met een zachtgroene 'keel'. De bladeren zijn onbehaard. Uit één bol ontluiken meerdere 'bosjes' bloemen.

Bestelnr. 2129

p.st. 3.75
3 st. 10.50




Colchicum speciosum 'Atrorubens'

Volgens E.A. Bowles de beste donkerpurperen *Colchicum* en had zijn eerste award al in 1933 verdiend. Een opvallende, intens gekleurde herfsttijloos met grote bloemen, wit vanuit het hart. *C. speciosum* is inheems in Turkije en de Kaukasus, voorkomend in lichte bosrijke gebieden. Rijkbloeiend.

Bestelnr. 6088

p.st. 3.95
3 st. 11.25




Colchicum szovitsii 'Snowwhite'

Uit de verschillende vormen van *C. szovitsii*, destijds ontdekt in Nakhichevan, Azerbeidzjan, onderscheidde deze selectie zich met de meest zuiver witte bloemen. De talrijke slanke bloemen verschijnen twee weken later dan de andere klonen. Heel erg mooi en indien de winter mild is, lang bloeiend.

Bestelnr. 2224

p.st. 9.50

3 st. 27.00




Colchicum trigynum

Herkomst: Oost-Turkije, Iran en de Kaukasus. Het aanbod is afkomstig van materiaal dat ook verzameld is op de Bitschenag Pass in Nakhichevan, Azerbeidzjan. De witte, of soms roze bloemetjes zijn zeer klein. Uit een knolletje kunnen wel tot twaalf opeenvolgende bloemen verschijnen, waardoor er een lange bloeiperiode ontstaat.

Bestelnr. 9112

p.st. 9.50

3 st. 27.00




Colchicum 'Violet Queen'

Een hybride van Zocher & Co. met als ouders *C. giganteum* x *C. bornmuelleri*. Aan de buitenzijde zijn de bloemblaadjes purperviolet en sterk gevlekt. De binnenzijde is geelgroen, naar boven verkleurend naar purperviolet, vergezeld van witte en paarse lijnen.

Bestelnr. 9918

3 st. 6.75

5 st. 11.00




Colchicum 'Waterlily'

Deze gevuldbloemige herfsttijloos (uit handen van mijnheer J.J. Kerbert) is ontstaan door het kruisen van *C. autumnale* 'Album' en *C. speciosum* 'Album'. Elke lilaroze bloem bestaat vaak uit meer dan 20 bloemblaadjes. Al in 1927 en 1928 werd een Award of Merit gewonnen.



Bestelnr. 2134

3 st. 6.75
5 st. 11.00



CONVALLARIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER CONVALLARIACEAE

Herkomst: in de gematigde streken van Europa. Azië en Noord-Amerika. Lelietje-der-dalen, Meiklokjes. Ook bekend onder de naam Mariatranen, deze zoete bloemen ontstonden uit de tranen van Maria bij de kruisiging van Jezus. Het Lelietje-der-Dalen wordt gebruikt als symbool voor nederigheid op christelijke schilderijen, waarschijnlijk omdat de bloemen zedig naar beneden buigen.

Convallaria vertaald uit het Latijn is: in de vallei, majalis verwijst naar de maand mei. Een kleine wortelstokvormende vaste plant die, bij voorkeur groeit in de halfschaduw of schaduw op humusrijke bodem. Ideaal als onderbegroeiing onder houtige gewassen. *Convallaria* is in alle delen giftig.




Convallaria majalis 'Hardwick Hall' 2015

Een wat forsere vorm met diepgroen blad voorzien van een decoratieve, onregelmatig gevormde, crèmekleurige rand. Temidden van dit blad verschijnen de bloemsteltjes met de vele heerlijk geurende belvormige bloemetjes.



Bestelnr. 6925

3 st. 6.75
5 st. 11.00




Convallaria majalis 'Prolificans'

Een Lelietje-der-Dalen waarvan het door de vergroeiing van de heerlijk geurende bloemen lijkt alsof ze dubbel zijn, maar dat zijn ze niet. Een extra lang bloeiende selectie, bovendien rijkbloeiend.



Bestelnr. 9626 **3 st. 4.95**
 5 st. 8.00




Convallaria majalis 'Rosea'

Het enige Lelietje-der-Dalen waarvan de bloemetjes roze zijn. Deze kleur komt in de schaduw het best tot zijn recht, in de volle zon verbleken zij. Heerlijk geurend in de meimaand. Destijds door de laatste keizer van Duitsland Kaiser Wilhelm, geselecteerd tijdens zijn ballingschap op het landgoed Huis Doorn in Doorn.



Bestelnr. 8955 **3 st. 4.95**
 5 st. 8.00




Convallaria majalis 'Vierländer Glockenspiel'

Een geografische vorm, destijds gevonden in de omgeving van Hamburg. Onderscheidend vanwege de langere bloemsteeltjes en goed ontwikkelde bloemtrossen waardoor deze uitermate geschikt is voor boeketjes. In Duitsland wordt deze selectie nog gekweekt voor bruidswerk.



Bestelnr. 6926 **3 st. 4.95**
 5 st. 8.00



Volgens een Oudgrieks woordenboek betekent korys of korythos: hoofdbedekking, helm of stormkap. Hiervan is wellicht het Latijnse korydalis (gekroonde leeuwerik) afgeleid. De sporen van de bloemen tonen gelijkenis met de kuif van 'n leeuwerik. Het geslacht *Corydalis* omvat honderden fraaie species en de hieruit ontstane cultivars. Alle species, die zich bijzonder lenen voor beplanting onder heesters en bomen, houden van een (half)beschaduwde plek.

Grofweg kunnen we *Corydalis* in twee groepen verdelen:

- 1: species welke in beboste (B) terreinen voorkomen (vaak afkomstig uit Siberië en het Verre-Oosten). Deze houden van een humusrijke grond die niet mag uitdrogen.
- 2: species (S) welke op open vlaktes groeien (dus zonder enige bescherming). Deze species vragen in de zomermaanden een droge standplaats.



Corydalis bracteata


(Synoniem: *Fumaria bracteata*)

Intro: 1820. Eén van de mooiste species uit Siberië, verzameld in district Kemerov. De grote heldergele bloemen geuren naar citroen. Toen wij in 2011 de kwekerij van Janis Ruksans bezochten, moesten wij uitkijken om niet op deze planten te staan, overal kwam deze verwilderd voor. Een schitterende ervaring om in een bloemenweide te lopen waarbij je van de ene *Corydalis* naar de andere kunt stappen met daar tussen door de paarse *Erythronium sibiricum* en de witte *E. krylovii*. (B)

Bestelnr. 9750

p.st. 16.50

3 st. 48.00



Corydalis bulbosa


(Synoniem: *Corydalis cava*)

De Nederlandse naam luidt: holwortel. Dit heeft betrekking op het onderaardse gedeelte, dat voor een groot gedeelte hol is. Herkomst: Eurazië. De tot twintig roze of witte gespoorde bloemen vormen een tros en bloeien in het vroege voorjaar. De plant houdt van een wat bosachtige grond. Vroeger was het een veel voorkomende stinzenplant. (B)

Bestelnr. 400

5 st. 4.75


10 st. 9.00



Corydalis buschii

De nu aangeboden 'wortelstokjes' werden ooit aangetroffen in de omgeving van Vladivostok (Siberië). Het is een species met purperrode bloemen. Een leuk verschijnsel van de species is, dat wanneer de wortelstokjes te diep of te ondiep geplant zouden worden, binnen een seizoen een nieuw wortelstelsel op de juiste diepte wordt aangemaakt. Het schijnt ook onmogelijk te zijn, wanneer de plant zich goed gesetteld heeft, deze weer volledig te verwijderen. (B)


Bestelnr. 402 5 st. 4.50
10 st. 8.50



Corydalis decipiens

Waarschijnlijk een geografische variatie van de *C. solida* met opmerkelijk hogere bloemstelen. De bloemkleur is purperroze. Herkomst: van Turkije tot in Scandinavië. *C. decipiens* wordt ook vaak tot de stinzenplanten gerekend. Prachtig als onderbeplanting onder bladverliezende heesters. (B)


Bestelnr. 404 10 st. 3.50
25 st. 8.25



Corydalis fumariifolia

Een zeer vroeg bloeiende *Corydalis* met helder hemelsblauwe bloemen. Omdat de plant zich zo vroeg ontwikkelt, is het verstandig om de opvallend grijzig witte knolletjes onder heesters te planten. Komt wijd verspreid voor, o.a. in het oosten van Rusland en in het oosten van Noord-Korea, het aangeboden is van Sachalin. (B)

Bestelnr. 9920 p.st. 16.50
3 st. 48.00




Corydalis integra

Voorkomend op noordhellingen, in o.a. het oosten van de Balkan, Egeïsch-gebied en Noordwest-Anatolië. Een mooie species met decoratief blauwgroen blad waarboven de zachtroze met witte bloempjes pronken. Elk met een klein zwart-paars puntje. Op een koele standplaats krijgen de bloempjes een zachtblauwe tint. (B)

Bestelnr. 9453

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Corydalis nudicaulis

Herkomst: Tadzjikistan, Pamir-Alai-bergketen, op rotshellingen tussen de sneeuw. Vanwege de bijzondere bloemkleur: wit met contrasterend bruin, ook wel de 'Koffie-met-melk-corydalis' genoemd. De losjes ogende bloemen kunnen iets variabel zijn, het aanbod komt van een partijtje dat opgekweekt is uit zaad. Het ingesneden blad is groengrijs. (B)

Bestelnr. 9191

p.st. 13.50
3 st. 39.00




Corydalis paschei



Erich Pasche en Manfred Koenen verzamelde deze krachtig groeiende en mooie species op de Sinkecibeli Pass in Zuidwest-Turkije temidden van dennen en sparren op de meest rotsige locaties. De inmiddels in de natuur zeldzaam geworden *Corydalis* is goed houdbaar in de tuin. Helder violetroze bloemen in luchtige trosjes. (B)

Bestelnr. 6962

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Corydalis schanginii subsp. *ainae* 'Berkara'

Henrik Zetterlund schreef over deze plant: 'You can never forget it if you get a chance to see it'. Doordat Janis enig corydalisloof herkende onder een stekelig rozenstruikje trotseerde hij zelfs de schorpioenen om de knolletjes te pakken te krijgen. Dit speelde zich af in de Berkara-kloof op 26 april 1977. De bloemkleur is fraai, namelijk: geel met een roze spoor en een paarse met chocoladebruine 'neus'. (S)

Bestelnr. 420

p.st. 11.50

3 st. 33.00



Corydalis schanginii subsp. *schanginii*


(Synoniem: *C. longifolia*)

Waarschijnlijk heeft deze *Corydalis* het grootste verspreidingsgebied van alle Centraal-Aziatische species. Dit aanbod zijn nazaten van planten die in 1975 in Kirgizië nabij Bishek op 1800-2000 m. hoogte werden verzameld. Toen dit wondertje in 1833 werd gevonden, gebruikte men de naam *C. longiflora*. De lange bloemtros bestaat uit witte bloemen, is roze gespoord met paarse 'lippen'. Zeer winterhard. (S)

Bestelnr. 418

p.st. 8.50

3 st. 24.00



Corydalis solida subsp. *solida*


(Synoniemen: *C. densiflora* (?), *C. halleri*, *C. tenella* en *Fumaria bulbosa* var. *solida*)

Nederlandse namen: voorjaarshelmbloem en vogeltje-op-de-kruk. Herkomst: Libanon, West-Azië en grote delen van Europa. In Nederland langs de grote rivieren, rond oude buitenplaatsen en nog hier en daar in Zuid-Limburg. Een bijzonder kenmerk van dit bolgewas is de gootvormende schub aan het begin van de bloemsteel. De bloemen vormen een tros en zijn veelal lila van kleur. Het tere ingesneden blad heeft een frisgroene kleur. (B)

Bestelnr. 422

10 st. 3.50

25 st. 8.25




Corydalis solida subsp. solida 'Beth Evans'

Zacht helderroze bloemen met een wit vlekje op de sporen dat duidelijker zichtbaar wordt naarmate de bloeitijd verstrijkt. Het blad is grover dan bij de andere variëteiten. Betrouwbaar. (B)



Bestelnr. 426

10 st. 3.50
25 st. 8.25




Corydalis solida subsp. solida 'Evening Dream'

Een zeer mooie vondst uit De Penza. Compact groeiend met donkergroen loof waarbij de zacht ijsblauwe bloemen mooi harmoniëren. (B)



Bestelnr. 6108

p.st. 6.50
3 st. 18.00




Corydalis solida subsp. solida 'G.P. Baker'

Vernoemd naar de plantenliefhebber George Baker die deze intens rode *Corydalis* rond 1935 introduceerde. Nog steeds de meest gevraagde en populaire 'rode' *Corydalis*, schitterend tussen het loof van uitlopende varens. (B)



Bestelnr. 428

5 st. 3.00
10 st. 5.50




Corydalis solida **subsp. solida 'Merlin'**

2015

Echt een beauty: de zuiverste witte bloemen, met op de lipjes van de bloemblaadjes een subtiel donkerpurper lijntje. Compacte bloemtrosjes. (B)

Bestelnr. 6963

p.st. 13.50
3 st. 39.00




Corydalis solida subsp. solida **'Purple Beauty'**

Ontstaan uit *C. solida* x *C. decipiens*. Opvallend grote bloemtrossen diepepaarse bloemen. Krachtige planten, prima voor verwildering in de border. (B)

Bestelnr. 9456

3 st. 3.75
5 st. 6.00




Corydalis solida subsp. solida 'Purple Bird'

Na jarenlang selecteren uit schitterende zaailingen van *C. solida* had de heer Huisman een serie Vogeltje-op-de-kruk met vogelnamen ontwikkeld. Deze vondst is diepepaars. Er is ook een andere selectie onder deze naam geregistreerd. (B)

Bestelnr. 9197

3 st. 4.95
5 st. 7.50




Corydalis solida subsp. solida -wit-

Dat we voorlopig nog niet het einde bereikt hebben met de constante stroom nieuwe selecties *C. solida*, is duidelijk. Fantastisch is deze witte aanwinst, nu uit handen van de heren de Groot. Rijkbloeiend, zuiver wit mooi in combinatie met het met iets grijs bewaasde loof. (B)

Bestelnr. 6111

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Corydalis solida subsp. solida 'Vuurvogel'

De kruisingen zijn ontstaan met hulp van de natuur. Het gewenste ouderpaar wordt bij elkaar in de buurt geplant en de bijtjes mogen voor de bestuiving zorgen. Uit de ontstane zaailingen is deze vuurrode *Corydalis* geselecteerd. (B)

Bestelnr. 9195

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Corydalis solida subsp. solida 'White Swallow'

Uit handen van de heer M. Hoog. Een vroeg- en langbloeiende witte vorm. De compacte bloemtrossen worden gedragen door donker getinte bloemsteeltjes. Aanvankelijk zit er een zachtlila zweem over de bloemen. (B)

Bestelnr. 9201

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Corydalis solida subsp. *solida* 'Zwanenburg'

Ook dit jaar is er weer een handje vol aanbod voor de liefhebber. Door M.H. Hoog geselecteerd uit Kp.27/72 (J. Kupec en M. Prasil), hun verzameling van felrode *C. solida* uit het Munti Paringului-gebergte in Roemenië. (B)

Bestelnr. 447

p.st. 3.95
3 st. 11.25




Corydalis solida subsp. *solida* -mix-

Nieuwe kleuren ontstaan door jarenlang selecteren. Door alsmaar zaad te winnen van de mooiste planten en dit weer uit te zaaien, ontstaat er een collectie met werkelijk de mooiste *Corydalis*. Het loont niet om dit allemaal op naam te zetten en te registreren. Vandaar dat dit grootbloemige mengsel zo wordt aangeboden. (B)

Bestelnr. 9925

5 st. 4.50
10 st. 8.50



Corydalis turtschaninovi

Herkomst: in verschillende bosrijke gebieden op humusrijke gronden in Zuidoost-Rusland. Een laatbloeiende species met mooie blauwe bloemen, soms met een violette zweem. Het blad is diep ingesnedden. (B)

Bestelnr. 9457

p.st. 9.50
3 st. 27.00



Herfstbloeiende krokussen groeien vaak in gebieden waar het 's zomers heel droog is. De milde najaarsregen zet de krokus aan tot bloei. De meest bekende is wel *Crocus sativus* die het kostbare saffraan produceert. In het in 2010 verschenen boek 'Crocuses, A complete Guide to the Genus' van Janis Ruksans zijn bijna vijftig pagina's aan deze groep gewijd.



Crocus banaticus


C. banaticus komt voor op vochtige koele plaatsen in Roemenië, het noordoosten van voormalig Joegoslavië en in het zuidwesten van de Oekraïne. Een unieke diep lilablauwe herfstkrokus waarbij de buitenste bloemblaadjes veel langer zijn dan de binnenste. Voor een koel plekje.



Bestelnr. 040

p.st. 4.50

3 st. 12.75



Crocus boryi

Vernoemd naar de Franse botanicus Jean Baptiste Bory de Cent-Vincent. De species wordt o.a. aangetroffen in oude olijfgaarden, en rotsachtige graslanden en zandduinen in het zuiden en westen van Griekenland alsmede op Ionische Eilanden en Zuidoost-Kreta. Het aanbod is afkomstig uit het ruige Taygetos-gebergte en heeft een heldere witte bloem met opvallende oranje keel.



Bestelnr. 9422

p.st. 6.00

3 st. 16.50



Crocus cancellatus subsp. cancellatus


(Synoniemen: *C. cancellatus* var. *cilicicus*,
C. cancellatus var. *kotschianus* en *C. cilicicus*)

Intro: voor 1841. Herkomst: Zuid-Turkije, West-Syrië, Libanon en Noord-Israël. De bloemkleur van deze 7 tot 10 cm hoge species is licht blauwachtig lila met aan de buitenzijde een violette blos. De buitenste kelkblaadjes zijn violet gestreept. Heel mooi zijn de oranje stempels. Na de bloei verschijnen de bladeren. De knolletjes zijn eetbaar.

Bestelnr. 2142

10 st. 4.00

25 st. 9.00




Crocus goulimyi

In Zuid-Griekenland (de Peloponnesus), komt deze species plaatselijk massaal voor in oude olijfbosgaarden en onder vijgenbomen. In november 1954 vond Dr. C. N. Goulimy deze krokus; pas in 1975 werd deze weerbestendige herfstbloeiër naar zijn ontdekker vernoemd. De buisvormige bloempjes zijn roze met een zweem van lila, aan de binnenzijde voorzien van een wit hartje. Het knolletje heeft iets weg van een hazelnoot.

Bestelnr. 2148

p.st. 3.95

3 st. 11.25




Crocus goulimyi var. leucanthus


De witte, of soms zeer licht lila vorm van *C. goulimyi*. Is endemisch op Kaap Malea het op één na zuidelijkste punt van het Griekse schiereiland Peloponnesos. Kenmerkend is dat de bloemen slanker zijn dan *C. goulimyi*.

Bestelnr. 2204

p.st. 5.25

3 st. 15.00





Crocus cartwrightianus 'Albus'

Bestelnr. 2146

5 st.	3.50
10 st.	6.50

Intro: 1843. Herkomst: Griekenland en op het eiland Kreta. Aanvankelijk werd *C. cartwrightianus* beschouwd als *C. sativus*; zij zijn nauw aan elkaar verwant. Bloem en blad verschijnen gelijktijdig. Bij de zuiverwitte vorm worden de bloemen geaccentueerd door drie helderrode stempels. De overige twee *C. cartwrightianus* zijn geselecteerd uit een zaadpartij CEH en door Janis Ruksans vernoemd naar de zonen van Antoine Hoog.



Crocus cartwrightianus 'Marcel'



Bestelnr. 6927

p.st.	6.50
3 st.	18.00



Crocus cartwrightianus 'Michel'



Bestelnr. 6928

p.st.	6.50
3 st.	18.00


Crocus hadriaticus 'Purple Eye'

Deze schoonheid vond Antoine Hoog als een mutant in de partij *Crocus niveus* 995-038. De bol en de bloem lijken het meest op een vorm van *C. hadriaticus*. Mogelijk is het een hybride. Bijna witte bloemen met een prachtig donker hart, oranjegele meeldraden.



Bestelnr. 6929

p.st. 7.50
3 st. 21.00



Crocus laevigatus 'Fontenayi'


(Synoniem: *C. fontenayi*)

Herkomst: Griekenland (de Cycladen). Een bijna winterbloeiende krokus die in de volksmond 'kerstkrokus' wordt genoemd. De binnenkant van de bloem is zachtlila naar de keel witachtig overgaand naar geel. De buitenzijde van de bijna ronde bloemblaadjes bestaat uit een zachtlila ondergrond met een mengeling van bruingele en witte veren. De gespleten stempels zijn warm oranje.



Bestelnr. 2152

5 st. 3.50
10 st. 6.50



Crocus ligusticus

(Synoniem: *C. medius*)

C. ligusticus komt voor in het noordwesten van Italië, voornamelijk in de provincie Ligurië, ten noorden van La Spezia, tot aan de Alpen in het zuidoosten van Frankrijk, in de directe omgeving van Menton. Zowel de binnen- als de buitenkant van de trechtervormige bloem zijn lilapaars met naar de basis donkerpaarse streepjes. De vertakte oranje stijlen perfectioneren deze fraaie herfstbloei.



Bestelnr. 2156

10 st. 4.00
25 st. 9.50



Crocus mathewii

2015

Wellicht de meest begeerde in het krokusassortiment. Verzameld door Helmut Kerndorff en Erich Pasche in 1992 in het Taurus gebergte in de provincie Antalya, Zuid-Turkije. Vernoemd naar Brian Mathew. Het aangeboden is zorgvuldig opgekweekt uit zaad, de glinsterende witte bloemen hebben een iets variabele methyleen-violette keel, een geheel rode stempel en gele meeldraden. 's Zomers is een koele standplaats aan te bevelen.



Bestelnr. 9656

p.st. 17.50
3 st. 51.00



Crocus mathewii 'Dream Dancer'

De 'Droomkrokus'. Wat een verrijking van het assortiment herfstbloeiende krokussen. Parelmoerblauwe bloemen met een fluweelpaars hart en stempels die naar saffraan geuren. Herkomst: Zuid-Turkije. 's Zomers is een koele standplaats aan te bevelen.



Bestelnr. 9927

p.st. 13.50
3 st. 39.00



Crocus niveus -White Form-

Intro: 1874. Herkomst: het zuiden van Griekenland voornamelijk in de Peloponnesus. Wellicht de mooiste witte najaarsbloei. De keel is geelachtig oranje met een scharlaken stamper die aan de top in drie delen gesplitst is. De helmknopjes zijn geel. Bij voorkeur gedijt deze krokus op een niet te droge standplaats. Een warme zomer resulteert in een goede bloei.



Bestelnr. 2160

3 st. 4.95
5 st. 7.50



Crocus nudiflorus


(Synoniemen: *C. aphyllus*, *C. fimbriatus*, *C. multifidus*, *C. medius* en *C. pyrenaicus*)

Zoals de naam nudiflorus (naaktbloemig) aangeeft, verschijnt eerst de bloem. Tijdens de bloeiperiode ontwikkelen zich de bladeren. In de Pyreneeën worden ze massaal aangetroffen. De onderaardse delen lijken echt niet op die van de ons bekende krokus; het zijn curieus gevormde stolonen. De smalle, ietwat spits toelopende bloemblaadjes zijn zacht violet met een onopvallende glans. In tegenstelling tot de meeste andere herfstkrokussen gedijt *C. nudiflorus* beter op een niet uitdrogende bodem.

Bestelnr. 2162

p.st. 4.50

3 st. 12.75




Crocus ochroleucus

De introductie van *C. ochroleucus* dateert van oktober 1859. Ze worden nog steeds aangetroffen in Libanon, het zuidwesten van Syrië en in het noorden van Israël, veelal in rotsachtige gebieden. De bloemkleur is crèmewit met een brede gele basis, de naam is hiervan afgeleid. Het lange blad verschijnt voor de uitbundige bloei.

Bestelnr. 2164

10 st. 4.50

25 st. 10.50



Crocus pulchellus 'Inspiration'


2015

Stevige intens blauwe bloemen met een oranje hart, een oranje stempel en crèmekleurige helmknoppen. Inheems in de Balkan en in Turkije. Deze krokus is een grootbloemige selectie uit materiaal dat in 1978 door Maria en Rolf Mertens in Bursa in West-Turkije op een hoogte van 1600 meter verzameld is.

Bestelnr. 9119

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Crocus pulchellus 'Zephyr'

Pulchellus betekent schitterend of prachtig, vandaar de door velen gebruikte naam: pracht-krokus. Een blikvanger geïntroduceerd door de heer Tom Hoog. Elegante grote witte bloemen met een ongewone parelgrijze zweem. De keel is geel met 'n vleugje lichtoranje. Verwildert makkelijk.



Bestelnr. 2172 10 st. 3.00
 25 st. 7.00




Crocus sativus

De saffraankrokus. Algemeen wordt aangenomen dat *C. sativus* een vorm van *C. cashmirianus* zou zijn. De bloemkleur is lila-achtig paars voorzien van een fraaie nervatuur. De in verhouding grote oranje rode stempels steken meestal boven de bloem uit en het is net of ze naar één kant hangen. Het blad verschijnt gelijk met de bloem, soms eerder. Elke bloem bevat een stamper met drie stempels en voor vijf gram kostbaar saffraan zijn circa 600 tot 700 bloemen nodig.



Bestelnr. 2174 10 st. 3.50
 25 st. 8.00




Crocus speciosus subsp. speciosus 'Aino'

Een *C. speciosus* met alleen maar goede eigenschappen. Weer en wind deert deze "improved Oxionan" niet. *Crocus speciosus* is inheems op de Krim, Kaukasus, Turkije en Iran. Deze schitterende selectie is vernoemd naar mevrouw Aino Paivel, die deze krokus verzamelde in de jaren tachtig in de Krim, in de buurt van Yalta op een hoogte van 1000 tot 1200 meter. Lilablauwe bloemen, met donkere tekening.



Bestelnr. 2184 p.st. 3.95
 3 st. 11.25



Crocus speciosus subsp. speciosus 'Albus'


Eén van de twee in Nederland gecultiveerde vormen van *C. speciosus*, destijds, in 1913 uit handen van Van Tubergen. Witte bloemen met een oranje keel, probleemloos groeiend.



Bestelnr. 9423

10 st. 3.00

25 st. 7.00



CROCUS, VOORJAARSBLOEIEND

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Eén van de bekendste knolgewassen is wel de krokus. Het geslacht kent een zeer groot aantal species en de daaruit voortgekomen honderden cultivars. Het aanbod bestaat uit een tamelijk breed assortiment waaronder zeer zeldzame, soms niet eerder in Nederland verkrijgbare species en cultivars. Vrijwel alle krokussen zijn geschikt voor verwilderding.



Crocus ancyrensis


Algemeen voorkomend in Centraal-Turkije en vernoemd naar de stad Ankara. Zij groeien in beboste gebieden met eiken, sparren en dennen, maar zijn op rotsachtige bodem op open plaatsen in de bergen het meest uitbundig. Makkelijk verwilderend, rijkbloeiende en een lekker vroegbloeiende voorjaarskrokus.



Bestelnr. 9675

25 st. 2.75

100 st. 10.00




Crocus angustifolius

(Synoniem: *C. susianus*)

De zogenaamde 'Goudlakense Krokus'. Herkomst: Krim en Zuid-Oekraïne. Kleur: binnenzijde geel, buitenzijde floxpaars, overdekt (soms gestreept) met een zweem van bruinpurper. De naam (van het synoniem) komt van Susa, de oude hoofdstad van het Perzische Rijk.


Bestelnr. 8531 10 st. 2.50
25 st. 6.00



Crocus angustifolius 'Bronze Form'

Een hybride, ontstaan uit het samenzijn van *C. angustifolius* met een niet meer te achterhalen partner. Bronsgeel met diffuus lila veren, zo laat de kleur van de buitenste bloemblaadjes zich het beste omschrijven. Een opvallende krokus die steriel is.

Bestelnr. 6113 10 st. 3.00
25 st. 7.00




Crocus biflorus subsp. biflorus

(Syn.: *C. biflorus* var. *parkinsonii*, *C. annulatus* var. *biflorus*, *C. argenteus* en *C. circumcissus*)

Intro: 1629. Schotse krokus. Herkomst: Italië, de eilanden Sicilië en Rhodos alsook Noordwest-Turkije. Een sublieme krokus met witte kelkblaadjes die aan de buitenzijde voorzien zijn van violette streepjes.

Bestelnr. 454 5 st. 4.00
10 st. 7.50



Crocus biflorus 'Miss Vain'

2015


Intro: 1962. Willem van Eeden noemde dit krokusje een ijdeltuit. De buitenzijde van de bloempjes is ivoorwit met aan de onderzijde van de bloemblaadjes lichtblauwe vlekjes, de binnenzijde is wit, naar het hart grijswit. Schitterende oranje meeldraden met zachtoranje helmknopjes. Prima voor verwildering.



Bestelnr. 6930

25 st. 2.75

100 st. 10.00



Crocus corsicus

(Synoniem: *C. insularis*)


Intro: 1838. Ze worden nog aangetroffen op Midden- en Noord-Corsica. Er bestaan slechts twee species op het eiland Corsica, de andere is *C. minimus*. De bloemen van het zeer aparte krokusje zijn aan de binnenzijde licht- tot donkerpaars, de buitenzijde is geelachtig met één, soms drie violette streepjes met een verfijnde nervatuur. De keel is wit tot zachtlila.



Bestelnr. 8537

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Crocus etruscus 'Zwanenburg'


Een selectie die dateert van 1939 en zich onderscheidt van de oorspronkelijke species door de fellere roze kleur met een violette glans, tegen het blauw aan. De buitenste bloemblaadjes zijn purper geveerd op een wat grijze ondergrond. Prima voor verwildering.



Bestelnr. 464

25 st. 3.00

100 st. 11.00



Crocus flavus subsp. flavus

(Synoniemen: *C. aureus*, *C. lacteus*, *C. lagenaeiflorus*,
C. luteus en *C. maesiacus*)

Intro: maart 1579. Herkomst: Balkan en het noordwesten van Turkije. Stervormige boterbloemgele bloempjes, naar de keel ietsje donkerder. Een enkele keer treffen we een 'verdwaald' bruin spatje of streepje aan. De meeldraden en de pijlvormige helmknoppen zijn geel.


Bestelnr. 466 10 st. 2.50
25 st. 6.00



Crocus fleischeri

Herkomst: Zuid- en West-Turkije. Vernoemd naar Franz von Fleischer (1801-1871) die in 1827 de eerste exemplaren aantrof in de buurt van Izmir. Een heerlijk geurend krokusje. De bladeren zijn lang en smal. De witte stervormige bloempjes zijn op de drie buitenste bloemblaadjes voorzien van blauwgrijze streepjes die zich in het midden van elk bloemblaadje bevinden. De keel is geel. De in drieën gesplitste stijl is fel oranje. Eigenaardig gevormde knolletjes.


Bestelnr. 468 5 st. 3.50
10 st. 6.50



Crocus imperati subsp. imperati 'De Jager'

P. de Jager & Sons. Eén der vroegst bloeiende krokusjes. De bloempjes zijn aan de binnenzijde lavendelblauw, de drie buitenste bloemblaadjes zijn ambergeel met kleine donkerpaarse veertjes. De drie binnenste bloemblaadjes zijn heliotroopblauw met drie kleine paarse veertjes. De basis is geel.

Bestelnr. 476 3 st. 4.50
5 st. 7.00





**Botanische krokussen gemengd
Biologisch geteeld**

Bestelnr. 6932	25 st.	4.50
	100 st.	17.00

CROCUS CHRYSANTHUS

De opvallende groep *Crocus chrysanthus* kenmerkt zich door de vele spectaculaire kleurtjes. De oorspronkelijke vorm (intro: 1843) vindt zijn herkomst op de Balkan. Uitermate geschikt voor verwildering, prettig vroeg bloeiend.



**Crocus chrysanthus
'Ard Schenk'**

Bestelnr. 452	25 st.	2.75
	100 st.	10.00



**Crocus chrysanthus
'Blue Pearl'**

Bestelnr. 456	25 st.	2.75
	100 st.	10.00



**Crocus chrysanthus
'Cream Beauty'**

Bestelnr. 460	25 st.	2.75
	100 st.	10.00



Crocus chrysanthus 'Prins Claus'

Bestelnr. 8541

25 st.

3.50

100 st.

13.00



Crocus chrysanthus 'Advance'

Bestelnr. 450

25 st.

4.50

Bolomvang: 4/5

100 st.

17.00



Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl' 2015

Bestelnr. 9535

25 st.

3.50

100 st.

13.00



Crocus chrysanthus 'Romance' 2015

Bestelnr. 6931

25 st.

2.75

100 st.

10.00



Crocus korolkowii


Intro: 1880. Herkomst: Tadjkent en Turkestan. Vernoemd naar zijn 'ontdekker' generaal Korolkov. *C. korolkowii* is erelid van het zogenaamde 'Central Asian Trio': *C. michelsonii*, *C. alatavicus* en *C. korolkowii*. De aangeboden mooie kloon heeft goudgele bloemen met aan de buitenzijde vanaf de basis een brede donkerrode tot donkerpaarse streep, die naar boven versmalt. De knol is vaak hoekig van vorm.



Bestelnr. 480

25 st. 3.95

100 st. 15.00



Crocus korolkowii 'Albus'


In april 2007 trof Sjaak de Groot tussen duizenden gele *C. korolkowii* in de Varzob-vallei, Tadzjikistan, een witte vorm aan. Dit aanbod stamt niet af van de aldaar aangetroffen krokus, maar het verhaal bevestigt dat in zulke populaties af en toe een witte vorm aangetroffen kan worden. Aan de buitenzijde tonen de bloemblaadjes vanuit de steel een grijsblauwe zweem, naar de topjes lichter wordend. De binnenkant van de bloemblaadjes is ivoorwit.



Bestelnr. 9676

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Crocus korolkowii 'Apricot'


Eveneens door Sjaak de Groot aangetroffen in het enorme veld gele *C. korolkowii* in Tadzjikistan. Een unieke kleur in krokus, de grote goudgele bloemen tonen en abrikooskleurige gloed over de buitenste bloemblaadjes. Helaas vermeerdert de knol zich langzaam waardoor het voorlopig nog een zeldzaamheid is.



Bestelnr. 6116

p.st. 3.50


3 st. 9.75



Crocus minimus 'Spring Beauty'

Zoals het woord minimus aangeeft, is dit een zeer kleine species die afhankelijk van de standplaats, bloeit van februari tot april. Werd in 1905 geïntroduceerd en komt oorspronkelijk voor op Sardinië en in het zuiden van Corsica. De binnenzijde van de bloemblaadjes varieert van paars tot donkerpaars, de buitenste bloemblaadjes zijn geelachtig met een duidelijk waarneembare violette nerf, soms spontaan gevlekt. Het aanbod betreft een selectiepartij.


Bestelnr. 8547 25 st. 3.50
100 st. 13.00



Crocus olivieri subsp. balansae 'Orange Monarch' 2015

Intro: 1879. Herkomst: West-Turkije Vernoemd naar de Franse botanicus Benjamin Balansa (1825-1891), die vele malen Turkije bezocht. Een sublieme krokus met donkeroranje bloemen aan de buitenzijde chocoladebruin tot brons gekleurd. Orange Monarch is een rijkbloeiende en krachtig groeiende kloon.


Bestelnr. 6933 10 st. 4.00
25 st. 9.50




Crocus x reticulatus 'Early Gold' 2015

Een door Leonid Bondarenko gewonnen hybride uit *Crocus reticulatus* x *Crocus angustifolius*. Rijkbloeiend met grote, aan de binnenkant goudgele bloemen, de buitenkant is crèmekleurig met purperen streepjes. Een steriele kloon met een goede groei.

Bestelnr. 8087 10 st. 2.50
25 st. 6.00





Crocus sieberi 'Firefly'

Bestelnr. 9678

25 st.	3.50
100 st.	13.00

CROCUS SIEBERI

Deze elegante zeer vroegbloeiende krokus heeft iets bolvormige bloemen. Mooie bloemen, unieke kleuren en krachtig groeiend. In Engeland worden ze 'Snow Crocus' genoemd: krokussen die al bloeien alvorens de laatste sneeuwresten verdwenen zijn terwijl de vorst nog in de grond zit.



Crocus sieberi subsp. sublimis 'Tricolor'

Bestelnr. 506

25 st.	3.50
100 st.	13.00



Crocus sieberi 'Hubert Edelsten'

Bestelnr. 6011

5 st.	4.95
10 st.	9.50


Crocus vernus 'Fantasy'

Een opvallende verschijning waarbij de buitenste bloemblaadjes zilverlila zijn terwijl de binnenste bloemblaadjes intens paarsviolet zijn. Juist dit contrast maakt deze grootbloemige krokus zo bijzonder, hetgeen in 2000 gewaardeerd werd met een getuigschrift op de proeftuin van de K.A.V.B. Ontstaan in 1986 uit *C. tommasinianus* x *C. vernus* 'Remembrance', uit handen van Heinz Witosseck.

Bestelnr. 6119

10 st. 4.95

25 st. 12.00




Crocus 'Yalta'

Vernoemd naar de plaats Yalta op de Krim, omdat het zaad waaruit deze schoonheid is geselecteerd, door Janis Ruksans was ontvangen van de botanische tuin Nikitsky in Yalta. Het zaad was afkomstig van een *C. tommasinianus* die vrijwel zeker op een natuurlijke manier gekruist is geweest met een Nederlandse *C. vernus*. De zilver gekleurde buitenste bloemblaadjes vormen een prachtig contrast met de donkere paarse binnenste bloemblaadjes. De bloemgrootte houdt het midden tussen die van beider ouders.

Bestelnr. 8091

25 st. 3.95

100 st. 15.00



Handgereedschap

De Wit Bollenpoter

Handig te gebruiken bij de aanplant van kleine bolgewasjes.

Bestelnr. 4612



p.st. 16.95

Bahco Bollenplanter

Stevige stalen uitvoering met beukenhouten handvat. Gemakkelijk snijdend.

Bestelnr. 4713



p.st. 10.95

Verplantschepje



Bestelnr. 4702 p.st. 24.00

Plantschepje met puntsnede



Bestelnr. 4703 p.st. 24.00

Hovenierschepje



Bestelnr. 4712 p.st. 24.00

Zeer hoogwaardige kwaliteit. Smeedijzer, volledig gehard. Handvat: essenhout.



**Crocus vernus -gemengd-
Biologisch geteeld**

Bestelnr. 9934 25 st. 6.00
 Bolomvang: 7 cm. 100 st. 22.50

CROCUS VERNUS

Grootbloemige krokussen, bekend als "large Dutch crocuses", veelal toegepast in openbaar groen. Betrouwbaar terugkomend en sterk. Waarschijnlijk allemaal nakomelingen van de Italiaanse wildvormen, wellicht in de toekomst ingedeeld onder *Crocus xcultorum*.

**Crocus vernus
'Flower Record'**

Bestelnr. 6120
 25 st. 4.50
 100 st. 17.00



**Crocus vernus
'Grote Gele'**

Bestelnr. 9934
 25 st. 4.50
 100 st. 17.00



**Crocus vernus
'Grand Maitre'**

Bestelnr. 9935
 25 st. 4.50
 100 st. 17.00




**Crocus vernus
'Jeanne d'Arc'**

Bestelnr. 9936
 25 st. 4.50
 100 st. 17.00



**Crocus vernus
'King of the Striped'**

Bestelnr. 9937
 25 st. 4.50
 100 st. 17.00



De naam Cyclamen is afkomstig van de oude Griekse plantennaam 'Kyklaminas' ('Kyklos'), dat wil zeggen: kring of schijf verwijzend naar de schijfvormige knollen.

Een cycloam moet 'n paar jaar 'vaststaan' alvorens tot rijke en optimale bloei te komen.

Het vermeerderen geschiedt door uitzaai, direct zodra het zaad rijp is.

Een cycloam groeit en bloeit het beste in een humusrijke grondsoort met een goede drainage.

Beschermd tegen teveel koude in de winter door een lage onderbeplanting; 'n rustperiode in de zomer (zon en warmte) en enige schaduw tegen fel zonlicht in de winter en lente.

Al het aangeboden is uitsluitend op Nederlandse en Engelse kwekerijen vermeerderd materiaal. De *Cyclamen* worden in pot geleverd. Dit zorgt voor een makkelijkere hergroei van de knol.

Cyclamen africanum


(Synoniemen: *C. ambiguum*, *C. commutatum*, en *C. numidicum*)

Intro: 1867. Herkomst: Noord-Afrika, voornamelijk in Tunesië en Algerije. Ze tonen enige gelijkenis met *C. hederifolium*. De ronde, soms hartvormige en vlezige bladeren zijn donkergroen met een onopvallende markering. De geurende bloempjes zijn roze gekleurd met een donkerrood oog. Redelijk winterhard.

Bestelnr. 525

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen alpinum

(Synoniemen: *C. trochopteranthum* en *C. coum* subsp. *alpinum*)


2015

Intro: rond 1872. Herkomst: het zuidwesten van Turkije. De bloemkleur varieert van donkerroze tot diep karmijnroze met een paarsrode vlek in de keel. De kroonblaadjes zijn gedraaid en lijken in bovenaanzicht op een propellertje. De ronde tot eivormige bladeren zijn donkergroen en vaak crèmewit gemarmerd. Ze geuren naar honing.

Bestelnr. 557

3 st. 7.50

5 st. 12.00




Cyclamen balearicum

Aanvankelijk werd aangenomen dat deze species uitsluitend op de Balearen zou voorkomen. Later werden ook exemplaren aangetroffen in Zuid-Frankrijk, groeiend in de schaduw in struikgewas. De smalle witte bloempjes met een grijsroze gloed geuren heerlijk. De bladeren zijn zilverkleurig of groen met heel veel zilveren vlekjes. De plant heeft bescherming tegen strenge vorst nodig.

Bestelnr. 527

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Cyclamen cilicium

Intro: 1872. Herkomst: Turkije, vooral in de bosrijke omgeving van het Taurus gebergte. Zachtroze, soms roze bloemen zijn vaak voorzien van een W-vormige vlek op iedere lob. De bladeren zijn grijs of crèmewit gevlekt en licht getand. Winterhard tot -18 °C.

Bestelnr. 529

3 st. 6.00
5 st. 9.50





Cyclamen cilicium forma album

Een vorm van *C. cilicium* met zuiverwitte bloemen die verschijnen in de periode september tot november. De kleine bloemen met bloemblaadjes van 15 tot 20 mm lengte verspreiden een heerlijke honinggeur.

Bestelnr. 523

3 st. 7.50
5 st. 12.00





Cyclamen coum subsp. coum

Bestelnr. 531

3 st.

6.00

5 st.

9.50

CYCLAMEN COUM SUBSP. COUM

(Synoniemen: *C. coum* subsp. *hiemale* en *C. orbiculatum* var. *coum*)

Herkomst: Oost-Bulgarije, Noord- en Zuid-Turkije, West-Syrië, Libanon, Noord-Israël en het schiereiland Krim. Het blad is rond tot niervormig en heeft een vrijwel gave rand.

De bloem- en bladkleur is zeer variabel, we bieden u een mooi mengsel en schitterende selecties aan. Winterhard tot maar liefst -30 °C.



Cyclamen coum subsp. coum forma albissimum

Bestelnr. 8555

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen coum subsp. coum 'Pewter Leaf'

Bestelnr. 537

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen coum subsp. coum 'Album'

Bestelnr. 533

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen coum subsp. coum 'Rubrum'

Bestelnr. 8557

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen coum subsp. coum 'Meaden's Crimson'

Bestelnr. 6935

p.st. 3.50

3 st. 9.75



Cyclamen coum subsp. coum -wit met zilver blad-

Bestelnr. 6936

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Cyclamen coum subsp. elegans

(Synoniem: *C. elegans*)

Een zelden aangeboden Cyclamen uit de bossen van Noord-Iran. In eerste instantie werd gedacht dat het een eigen species zou zijn, maar nu ingedeeld als subspecies bij *C. coum* terwijl zowel het blad als de bloemen groter zijn. Het hartvormige gemarmerde blad is vaak voorzien van een langwerpige patroon. De bloemen zijn roze met een donkerroze blosje.

Bestelnr. 9939

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Cyclamen cyprium

Herkomst: West- en Noord-Cyprus, in bossen met een rotsachtige ondergrond. Het is een jaarlijks genot voor de Cyprioten wanneer deze heerlijk geurende cyclaam en masse in de herfst en winter staat te bloeien. De bloemen verschijnen gelijk met het blad en zijn wit of zeer zachtroze met een magenta keelvlek. De hartvormige olijfgroene bladeren zijn verfraaid met grijze of crèmekleurige streepjes en aan de onderzijde voorzien van een purperen gloed. De plant heeft bescherming tegen strenge vorst nodig.

Bestelnr. 543

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Cyclamen graecum

(Syn.: vele o.a. *C. aegineticum*, *C. cypro-graecum*, *C. maritimum*, *C. mindleri*, en *C. pseudograecum*)

Intro: ca. 1930. Herkomst: Zuid-Griekenland, Kreta, West- en Zuid-Turkije, Noord-Cyprus. Op de oorspronkelijke vindplaatsen worden de knollen op een grote diepte aangetroffen, wat wordt veroorzaakt door de vlezig 'bijwortels'. De bloemkleur is van zachtroze tot ceriseroze, met drie rode streepjes aan de binnenzijde van elk bloemblaadje. De bladtekening is variabel; overwegend in de tinten groen, grijs en crème.

Bestelnr. 559

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Cyclamen graecum forma album

Pas in 1980 werd deze witbloeiende vorm ontdekt. En recentelijker zijn ook op West-Kreta witbloeiende planten aangetroffen. Nakomelingen uit zaad komen zuiver terug.

Bestelnr. 6121

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Cyclamen graecum 'Glyfada'

Brian Mathew, de President van de Cyclamen Society heeft in Glyfada, ten zuidoosten van Athene, een vorm gevonden met puur zilver blad. 's Zomers graag een lekker warm en droog plekje.

Bestelnr. 9463

p.st. 3.50

3 st. 9.75



Cyclamen intaminatum


(Synoniem: *C. cilicium* var. *intaminatum*)

Werden in juni 1934 door E.K. Balls verzameld in de omgeving van Burujuk, Noordwest-Turkije. Voorkomend op rotsachtige bodem en tussen boomwortels (eiken). De geschulpte bladeren zijn donkergroen met zilverachtige vlekken. De bloemkleur is wit, soms zeer zachtroze. Een heel mooi fijn cycloampje.

Bestelnr. 547

3 st. 7.50

5 st. 12.00





Cyclamen hederifolium
var. hederifolium forma hederifolium

Bestelnr. 541 3 st. 6.00
 5 st. 9.50

CYCLAMEN HEDERIFOLIUM

(Synoniem: *C. neapolitanum*)

Herkomst: Corsica, Sardinië, het zuidoosten van Frankrijk, Italië, grote delen van de Balkan, Griekenland en West-Turkije. In 1538 wordt er melding gemaakt van deze bekende cyclaam onder de naam: *C. neapolitanum*. Uit de platte knol die door een kurkachtige huid wordt omgeven, komen vanaf eind augustus vele 10-15 cm hoge bloemsteeltjes tevoorschijn, voorzien van roze bloempjes. De sterk op klimop lijkende bladeren die zich na de bloei volop ontwikkelen, zijn in grootte, vorm en tekening zeer verschillend.

Cyclamen
hederifolium
var. hederifolium
forma albiflorum

Bestelnr. 539

3 st. 6.00
 5 st. 9.50



Cyclamen
hederifolium
-Silver Leaf Pink-

Bestelnr. 6124

3 st. 7.50
 5 st. 12.00



Cyclamen
hederifolium
var. hederifolium
-paarse selectie-

Bestelnr. 8093


3 st. 6.00
 5 st. 9.50



Cyclamen
hederifolium
-Silver Leaf White-

Bestelnr. 6125

3 st. 7.50
 5 st. 12.00



Cyclamen libanoticum

Een bijna uitgestorven species die nog sporadisch voorkomt in de bergen van Libanon. Het is één van de mooiste cyclamen met grote lichtroze geurende bloemen die in het voorjaar, februari-april, verschijnen. Op de bloemblaadjes is aan de buitenzijde een duidelijk zichtbaar rood merkje te zien. Het donkergroene blad met onregelmatige lichtere patronen is aan de onderkant glanzend rood gekleurd. Voor de zekerheid deze cyclamen tegen strenge vorst beschermen.

Bestelnr. 8095

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Cyclamen mirabile

Volgens de overlevering werden in 1901 de eerste exemplaren verzameld in het zuidwesten van Turkije (Anatolië) en via het toenmalige Smyrna (nu Izmir) door de firma Van Tubergen ingevoerd. De donkergroene bladeren zijn hartvormig met onregelmatige grijsgroene, crème of zilveren vlekken en zijn getand. De geurende roze bloemen met een steenrood oog verschijnen vanaf september. Tip: een handje gecomposteerde dennennaalden door de grond mengen. Winterhard tot -18 °C.

Bestelnr. 549

3 st. 7.50

5 st. 12.00




Cyclamen persicum subsp. persicum

Intro: waarschijnlijk 1739. Herkomst: Rhodos, Cyprus, Kreta(?), op 'n enkele locatie in Zuid-Griekenland (de omgeving van Athos), Zuidwest-Turkije, Jordanië, Libanon, Israël, het noordoosten van Algerije en Noord-Tunesië. Uit deze van december tot maart bloeiende species ontwikkelden hybridiseurs de welbekende (pot)cyclamen. De bloemkleur varieert van wit tot zachtroze. Geurend. De veelal hartvormige, getande groene bladeren kennen vele vormen en zijn voorzien van lichtgele strepen en stippen. Niet goed winterhard.

Bestelnr. 551

3 st. 7.50


5 st. 12.00



Cyclamen pseudibericum

Het is één der mooiste voorjaarsbloeiende cyclamenen, al bekend sinds 1895. In 1952 aangetroffen door de Turkse botanicus Dr. Demiriz op de Duldul Dag in de provincie Adana (het Adanus gebergte). De hartvormige bladeren zijn gekarteld en aan de onderzijde purperrood. Waarschijnlijk heeft deze wildvorm de donkerste bloemkleur, donker paarsrood naar de keel donkerder. Nabij het oog is elk bloemblaadje gemarkeerd met een vlekje in de vorm van een schoppenaas. Geurend.

Bestelnr. 553 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00




Cyclamen purpurascens

(Synoniemen: *C. europaeum*, *C. fatrense* en *C. purpurascens* subsp. *immaculatum*)

Herkomst: in kalkrijke bergwouden van Centraal- en Zuid-Europa: van Frankrijk tot Polen, van Slowakije tot Kroatië en Bulgarije. De sterk geurende bloemen zijn roze tot karmijnrood, vaak voorzien van een donkere gloed. Het donkergroene blad is subtiel wit gemarmerd en meestal aan de onderzijde rood. Opvallend is dat de gehele knol voorzien is van wortels.


Bestelnr. 8097 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75



Cyclamen repandum

Herkomst: de landen aan de noordkant van de Middellandse Zee, plaatselijk in Zuid-Frankrijk, de eilanden Corsica, Sardinië, Kos en Rhodos en in Algerije. Een mooie *Cyclamen* die zacht geurt en vele bloemen geeft. De hartvormige bladeren zijn donkergroen tot grijsgroen met, afhankelijk van de vindplaats, grijsgroene soms zilveren vlekjes. Licht getand. De bloemkleur is donkerroze met een paarsrood oog.

Bestelnr. 555 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75



Cyclamen repandum subsp. rhodense


(Synoniem: *C. rhodium*)

Voorkomend op het eiland Rhodos en op Kos, voornamelijk in naaldbossen op 150 tot 800 meter boven zeeniveau in de (half)schaduw. Het blad toont een grijze zweem en is met grijswitte spikkels bedekt. De bloemen zijn wittig, soms zachtroze met een wat intensere tint roze bij de overgang naar de keel en verspreiden een zachte geur.

Bestelnr. 6126

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Cyclamen rohlfsianum

De redelijk zeldzame naar Lelietjes-der-Dalen geurende species is de enige Cyclamen-soort die voorkomt in Libië, en dan nog slechts in een beperkt gebied in Cyrenaica. Uniek voor de soort is dat de helmknoppen 1,5-2,5 mm uit de bloembuis steken. Roze bloemen en groot, breed, niervormig, bijna rond blad, helder glimmend groen met meestal een zilverkleurige markering. Het blad ontwikkelt zich in het begin van de herfst en is enigszins vorstgevoelig.

Bestelnr. 6127

p.st. 3.50

3 st. 9.75



DICENTRA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER FUMARIACEAE


Dicentra cucullaria

Een charmant bosplantje uit Canada en de V.S., prima winterhard. De crèmewitte, 2 cm grote bloemen harmoniëren perfect met het diep ingesneden zilvergrijze loof. Het bloempje heeft de bijnaam: Dutchman's breeches. Wanneer het bloempje wordt omgedraaid lijkt het inderdaad op een pofbroek, een Volendammer broek. Na de bloei gaat de plant in rust en sterft het loof geheel af.

Bestelnr. 9466

p.st. 2.95

3 st. 8.25



Uit het Grieks: *dichelos* (twee-wiggig) en *stemma* (kroon). Dit heeft te maken met de meeldraden van *D. congestum* die halverwege in twee delen zijn gesplitst.

Ze verlangen een zonnige standplaats met een goed doorlatende grond. Vermeerderen geschiedt uit zaad of door het in de herfst afnemen van de jonge klisters. Deze klisters zullen dan na twee tot drie jaar weer bloeien. Het zijn goed houdbare snijbloemen.



Dichelostemma congestum

(Synoniem: *Brodiaea congesta*)


Intro: 1806. Herkomst: Washington tot Noord-Carolina (U.S.A.). Een bolgewas met dicht op elkaar staande zacht lilablauwe buisvormige bloempjes, geplaatst boven op een bladloze 70-90 cm lange bloemsteel. Zeer langdurig bloeiend en schitterend voor op de vaas en prima te combineren in de border samen met *Papaver* en *Nepeta*.



Bestelnr. 561

10 st. 3.00

25 st. 7.00



Dichelostemma ida-maia


(Synoniemen: *Brodiaea ida-maia*, *B. coccinea* en *Breevoortia ida-maia*)

Intro: 1870. Herkomst: Californië en Oregon waar ze groeien en bloeien in de 'Redwood' bossen, voornamelijk op graslanden. De Amerikaanse naam 'Firecracker-Flower' (vuurwerkbloem) is zeer toepasselijk: de bloemknop die zich bevindt aan 50-60 cm lange veelal kromme stengels spat uitéén in vijf tot negen vuurrode hangende en buisvormige bloempjes, die weer geaccentueerd worden door heldergroene topjes en een wit hart.

Bestelnr. 563

10 st. 3.00

25 st. 7.00




Dichelostemma 'Pink Diamond'

Een hybride die is ontstaan uit *D. ida-maia* x *D. multiflorum*. De kleur is roze met groen. Voor wie het rood van de *D. ida-maia* te vurig is, is dit een prima alternatief. Mede door de frivole groeiwijze mooi te combineren met *Geranium*, *Nepeta* of *Alchemilla*.

Bestelnr. 565

10 st. 3.00

25 st. 7.00




Dichelostemma volubile

Een klimmende *Dichelostemma*, voorkomend aan de voet van de bergen in Californië. De stengel kan tot 2 meter lang worden en kronkelt zich een weg omhoog door struikgewas in de natuur. In de tuin kan ook een oude tak als steunmateriaal fungeren. Een dicht bloemschermbloem met roze bloemen. Een aanrader, een originele klimplant.

Bestelnr. 567

p.st. 3.95

3 st. 11.25



ERANTHIS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER RANUNCULACEAE

Nederlandse naam: winterakoniet. De naam werd ontleend aan de Griekse woorden: er (lente) en anthos (bloem). De ondergrondse delen zijn nogal klein, ongeveer de grootte van een erwt en veelal onregelmatig van vorm; grotere exemplaren lijken op een vleugelmoer! De bladeren vormen een op de grond liggend rozet, de bovenste bladeren tonen enige gelijkenis met een halskraag, die de bloemen omvat. De gele bloemen voorzien van vele meeldraden bevinden zich aan het einde van zeer korte (ca. 5 cm) steeltjes en vormen na enige tijd een waar bloementapijt. Na de bloei verschijnen de stervormige zaaddozen. Wanneer ze openbarsten, zullen de ronde zaden voor vele nakomelingen zorgen.



Eranthis cilicica

Intro: 1892. Herkomst: Turkije. De bladeren zijn diep ingesneden en enigszins bronsgroen bij het ontlukken. Ze bloeien iets later dan *E. hyemalis*, maar de goudgele bloemen zijn weer groter terwijl de halsband rond de bloem kleiner en fijner gedeeld is. *E. cilicica* verlangt een drogere standplaats en meer zon.

Bestelnr. 570 25 st. 4.50
100 st. 17.00




Eranthis hyemalis

(Synoniem: *E. bulgarica*)

Intro: 1570, in grote delen van Europa en Noord-Ameika verwilderd voorkomend. Oorspronkelijk: Zuid-Frankrijk, Italië, voormalig Joegoslavië en Bulgarije, maar ook in Noord-Irak en Afghanistan. De bladeren zijn niet zo diep ingesneden als die van *E. cilicica*, de bloemsteeltes zijn wel wat langer (7-10 cm) en de bloemdoorsnede is vaak niet groter dan twee cm. De bloemkleur is heldergeel. *E. hyemalis* verdraagt een wat vochtiger bodem en kan meer schaduw hebben.


Bestelnr. 572 25 st. 4.50
100 st. 17.00



Eranthis hyemalis 'Grünling'

In de tuin van Frau Ruth Treff in Darmstadt worden bijzondere winterakonieten aangetroffen. Zo ook werd in 1998 'Grünling' gevonden en vernoemd naar de Duitse naam voor de Gele ridderzwam *Tricholoma equestre*. Op de buitenzijde van de diepgele bloemblaadjes zit een groene streep, soms ook aan de binnenkant van de blaadjes. Uniek!

Bestelnr. 9467 p.st. 7.50
3 st. 21.00



Eranthis hyemalis 'Orange Glow'


(Synoniem: *E. hyemalis* 'Aurantiaca' en
E. 'Copenhagen Orange')

Al in 1950 ontdekt door Jens Ole Pederson, Denemarken. Destijds verstuurd naar de Botanische tuin van Göteborg. Pas in 1989 op naam gezet door Richard Blakeway-Philips. De winterakoniet verrast ons wanneer de net ontluikende knoppen hun eierdooiergele bloemen tonen in de sombere maanden van het jaar. Orange Glow komt zuiver van zaad terug.

Bestelnr. 6128

p.st. 8.95

3 st. 25.50




Eranthis hyemalis 'Schwefelglanz'

Sterk onderscheidend van de bekende *Eranthis* is deze zacht zwavelgele akoniet, ontluikend uit abrikooskleurige bloemknoppen. In 1985 aange troffen in de tuin van Frau Ruth Treff in Darmstadt, maar pas in 1997 geïntroduceerd. Makkelijk groeiend en fantastisch gezelschap voor de sneeuwkllokjes.

Bestelnr. 9469

p.st. 5.95


3 st. 16.50



EREMURUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ASPHODELACEAE

Nederlandse namen: Naald van Cleopatra en Steppenlelie. *Eremurus* komt van de Griekse woorden: eremos (woestijn, eenzaam) en oura (staart). De natuurlijke vindplaatsen zijn de droge rotsachtige en sterk begraasde berghellingen van Oost-Turkije tot aan de Himalaya, met species in China. De wortels zijn dik en vlezig en doen denken aan een zeer groot model spin. Ondanks deze 'grootte' dient een *Eremurus* zeer ondiep te worden geplant: drie cm aarde op de wortelvormende knol is voldoende. Zoals de natuurlijke standplaats aangeeft, verlangt een *Eremurus* een goed doorlatende grond op een zonnig plekje. Tijdens de bloei en groei, flink organisch bemesten. Let wel op in de winter, *Eremurus* is enigszins vorstgevoelig, afdekken dus.



Eremurus 'Cleopatra'

2015

In 1956 door N.C. Ruiter geïntroduceerd. Men spreekt dan ook van Ruiter-hybride. De bloemen zijn oranje met aan de buitenzijde een opvallende donkerrode nerf, de meeldraden zijn ook oranje. In het knopstadium is deze *Eremurus* donkeroranje. Uit Duits onderzoek is gebleken dat Cleopatra een goede en betrouwbare hybride is.

Bestelnr. 8559

p.st. 2.95
3 st. 8.25

125-150 6 50 3-5 l.



Eremurus himalaicus

Intro: 1811. De herkomst van deze zuiver witte species ligt in het noordwestelijk gelegen deel van de Himalaya. De bloemaar, bestaande uit vele witte bloemen, bereikt op z'n sloffen 80-90 cm, terwijl de totale lengte van de bloemsteel gemiddeld twee meter kan worden.

Bestelnr. 575

p.st. 5.95
3 st. 16.50

150-250 5-6 50 3-5 l.



Eremurus robustus

Intro: 1871. Herkomst: Afghanistan en Centraal-Azië. Robustus betekent: sterk, krachtig. De hoogte kan wel 250 cm zijn, waarvan de bloemtros een lengte van zo'n 100 cm voor haar rekening neemt.

Bestelnr. 577

p.st. 6.95
3 st. 19.50

200-250 6-7 50 3-5 l.



Eremurus stenophyllus

(Synoniem: *E. bungei*)


Intro: 1914. Inheems in Centraal-Azië, vooral in Kopet Dag, Iran, Afghanistan, West-Pakistan en de Pamir Alai, op stenige hellingen. De kanariegele bloemaren bereiken een lengte van 40 cm, de totale lengte van de plant is ongeveer 100 cm, maar kan iets variëren. Opvallende rode meeldraden.



Bestelnr. 8563

3 st. 6.00

5 st. 9.50



ERYTHRONIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER LILIACEAE

Het geslacht *Erythronium* is al vele eeuwen in cultuur. Knollen van *Erythronium* zijn erg gevoelig voor wind en kunnen daardoor na het rooien snel indrogen. Machinaal rooien is niet bevorderlijk voor de kwaliteit, een beschadiging op de knol leidt al snel tot schimmelvorming, een moeizame teelt. Het verspreidingsgebied is groot: Midden- en Zuid-Europa, Iran en de Kaukasus en vele species vinden hun oorsprong in Noord-Amerika. De Nederlandse benaming hondstand is ontleend aan de vergroeide buisvormige knol, vergelijkbaar met de tand van een hond. De bladeren staan tegenovergesteld, zijn breed ovaalvormig en steeds twee per plant. Vrijwel alle *Erythronium* hebben schitterend getekend blad. Een opvallend detail is dat behalve vele soorten die knikkende bloemen hebben, de topjes van de bloemblaadjes naarmate uitbloei vordert, achterwaarts gebogen zijn. De planten houden van een wat zanderige humusrijke grond op een beschaduwde plekje en de knollen dienen vrij diep te worden geplant. Ze kunnen vele jaren op dezelfde plaats staan en vermeerderen zich voornamelijk door zaad.

Erythronium californicum


Intro: 1904. Inheems in voornamelijk de beboste kustgebieden van Noordwest-Californië. De crèmekleurige bloemen, meestal twee tot drie per bloemsteel, hebben mooie oranjegele tekeningen aan de basis en steken ruim boven het schitterend gemarmerde blad uit. De aangeboden partij is uit zaad geteeld, direct afkomstig uit Californië.



Bestelnr. 8111

p.st. 6.50

3 st. 18.00




Erythronium 'Kondo'

Een hybride waarvan de ouders *E. tuolumnense* en waarschijnlijk *E. californicum* zijn.

Krachtig groeiende planten met zwavelgele knikkende bloemen. De brede bladeren zijn licht gemarmerd en kenmerkend is een vanuit het midden van het blad lopende band waarop geen marmering zichtbaar is. In de jaren zestig rijkelijk onderscheiden met vele awards.

Bestelnr. 8115

5 st. 4.50
10 st. 8.50




Erythronium krylovii

(Synoniem: *E. sibiricum* 'Altai Snow',
E. sibiricum subsp. *altaicum*)

In de voorgaande jaren aangeboden onder de naam die nu het synoniem is. Nieuwe inzichten hebben de naam doen veranderen. Herkomst: Altai-gebergte in West-Siberië. De aangeboden partij is afkomstig van nakomelingen uit de Republiek Toeva, stroomopwaarts langs de rivier Ka-hem op een hoogte van 2300-2500 meter. Over de grote zuiver witte bloemen ligt een zacht-lila waas. Krachtig groeiend en vaak vroeger bloeiend dan de soort.

Bestelnr. 604

p.st. 11.50
3 st. 33.00




Erythronium 'Pagoda'

Verreweg de meest geteelde hybride van *E. tuolumnense*, destijds waarschijnlijk ook gekruist met *E. californicum*, met dank aan dhr. Lou Slikker. De ca. 30 cm hoge bloemstelen worden geflankeerd door vier tot vijf knikkende zwavelgele bloemen met in de keel een opvallende brede roodbruine kring. De bladeren zijn gevlekt met 'n ietwat overheersing van een bronskleurige gloed. In 2010 reikte de K.A.V.B. aan deze selectie een jubileumgetuigschrift uit.

Bestelnr. 606

10 st. 4.00
25 st. 9.50





Erythronium dens-canis 'Snowflake'

Bestelnr. 600	3 st.	6.00
	5 st.	9.50

ERYTHRONIUM DENS-CANIS

Wordt sinds 1596 in cultuur aangetroffen, oorspronkelijk verspreid voorkomend in Europa. De meest voorkomende Nederlandse benamingen zijn hondstand of hondstand-viooltje. Schitterend gemarmerd blad. Worden ze geplant (als onderbegroeiing) in een voedselrijke niet te droge grond dan kunnen ze zich, na een wat langzame start, snel vermeerderen. Het aanbod betreft de wildvorm en een aantal mooie selecties.



Erythronium dens-canis

Bestelnr. 587	5 st.	4.50
	10 st.	8.50




Erythronium dens-canis 'Rose Queen'

Bestelnr. 598	3 st.	6.00
	5 st.	9.50



Erythronium dens-canis 'Lilac Wonder'

Bestelnr. 592	3 st.	6.00
	5 st.	9.50





Erythronium dens-canis var. niveum

Bestelnr. 9943	p.st.	5.50
	3 st.	15.00

Erythronium dens-canis 'Purple King' →

Bestelnr. 596	3 st.	6.00
	5 st.	9.50



Erythronium dens-canis 'Frans Hals'

Bestelnr. 590	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Erythronium dens-canis 'Pink Perfection'

Bestelnr. 594	3 st.	6.75
	5 st.	11.00






Erythronium x revolutum
'Sunset Serenade'

2015

Bestelnr. 6937

p.st.
3 st.

7.95
22.50



Mooie nieuwe selecties ontstaan door jarenlang kruisingswerk uit nakomelingen van *E. revolutum* x *E. 'White Beauty'*, uit handen de heer Huisman.

Het blad is onregelmatig gemarmerd, soms bijna effen groen.



Erythronium x revolutum
'Moonlight Serenade'

Bestelnr. 9945

p.st. 3.95
3 st. 11.25



Erythronium x revolutum
'Grand Old Man'

Bestelnr. 6938

p.st. 13.50
3 st. 39.00

2015


Erythronium sibiricum subsp. sibiricum

De uit Siberië afkomstige tegenpool van *Erythronium dens-canis*. Ze bloeien later, maar de bloemen zijn aanmerkelijk groter: cyclamenpurper met gele helmknopjes. De vegetatieve vermeerdering gaat moeizaam, maar als het verse zaad direct gezaaid wordt, dan is deze schoonheid goed te vermeerderen.



Bestelnr. 8565

p.st. 12.00
3 st. 34.50




Erythronium 'White Beauty'

Intro: ca. 1895. Een cultivar met grote witte bloemen met in de keel een smalle bruingele ring. Het blad is mooi gemarmerd en overwegend lichtgeel geaderd. Deze roomwitte schoonheid zal zich op humusrijke grond prima uitbreiden. Schitterend in een bostuin, nabij varens en Hosta.



Bestelnr. 608

5 st. 4.95
10 st. 9.50



Onkruidwieder of cape cod weeder

Gesmeed en uitgehard van zeer hoogwaardige kwaliteit staal.



totale afmeting : 400 mm
afmeting blad : 85x20 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4704 (Linkshandig) p.st. 24.00
Bestelnr. 4705 (Rechtshandig) p.st. 24.00

Schrepel

Gesmeed en uitgehard van zeer hoogwaardige kwaliteit staal.



totale afmeting : 450 mm
afmeting blad : 120x40 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4706 (Linkshandig) p.st. 28.00
Bestelnr. 4707 (Rechtshandig) p.st. 28.00

Warrenhakje met punt

Uitgesmeed, gehard en ontlaten. Doordat het materiaal volledig is uitgehard, is dit hakje zelfslijpend.



Bestelnr. 4709 p.st. 25.00




De naam is afkomstig van het Latijnse woord: fritillus, dit betekent dobbelbeker. Eén van de opvallendste kenmerken van *Fritillaria* is het gat (gaatje) in de bol. Dit is vooral bij de grote cultivars duidelijk waarneembaar. Deze opening markeert de plaats waar de oude bloemstengel heeft gezeten. De bol is vrij kwetsbaar vanwege het ontbreken van 'n droge, beschermende huid. Vrijwel alle fritillaria's hebben hangende klokvormige bloemen. De grondsoort behoort goed doorlatend en humusrijk te zijn waar de *Fritillaria* diep moet worden geplant. Hoewel de bollen redelijk winterhard zijn, wordt een winterdek warm aanbevolen. De decoratieve zaaddozen zijn te verwerken in boeketten.

Fritillaria acmopetala

(Synoniemen: *F. lycia* en *F. intermis*)

Intro: 1874. Herkomst: het zuidwesten van Turkije, Syrië, Libanon en Cyprus waar ze in wijngaarden worden aangetroffen. De bladzetting aan de tot 50 cm hoge bloemsteel is opvallend. Slechts enkele dunne bladeren staan om de 10 cm aan de bloemsteel. De tot drie knikkende klokvormige bloemen zijn aan de buitenzijde olijfgroen met bruine vlekken terwijl de binnenzijde kastanjebruin is.

Bestelnr. 620	10 st.	4.00
	25 st.	9.50




Fritillaria amana

(Synoniemen: *F. hermonis subsp. amana*, *F. guicciardii*, *F. ochridiana*, *F. unicolor*, *F. urmensis* en *F. zahnii*)

Intro: 1975 door E.K. Bells. Herkomst: Turkije (het Amana gebergte), Syrië en Libanon. Eén, soms twee breed klokvormende bloemen op een 20-30 cm hoge bloemsteel. De bloemkleur is groen met een variabel bruinachtig purperen ruitpatroon aan de randen van de buitenste bloemblaadjes. De bladeren zijn glanzend groen.

Bestelnr. 628	5 st.	4.00
	10 st.	7.50




Fritillaria amana 'Goksun Gold'

De groene kleur in *F. amana* is hier vervangen door een mooie diep goudgele kleur. Er zit minder rood in de bloem en het bruine ruitpatroon is ook niet aanwezig. Deze mooie vorm van *F. amana* is gevonden op de berg Goksun in Zuid-Turkije.

Bestelnr. 618

p.st. 6.95
3 st. 19.50




Fritillaria aurea

(Synoniemen: *F. cilico-aurica* en *F. bornmuelleri*)

Intro: 1854. Inheems in Centraal-Turkije waar deze groeit tussen kalksteenrotsen en klippen, vaak bij smeltende sneeuwplekken op 1800-2000 meter hoogte. Waarschijnlijk de mooiste geelbloeiende *Fritillaria* met een enkele hangende klokvormige bloem, voorzien van een bruin ruitpatroon. Behoorlijk variabel in hoogte.

Bestelnr. 8121

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Fritillaria bithynica subsp. carica

(Synoniem: *F. carica*?)

Vindplaatsen voornamelijk in cederbossen in het zuidwesten van Turkije. De 10-15 cm hoge steel heeft brede, lancetvormige bladeren, gerangschikt in paren, tegenover elkaar staand met een grijze gloed. De bloemkleur is geel met een zweem van bruin en groen.

Bestelnr. 640

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Fritillaria bucharica 'Giant'


Intro: 1884. Herkomst: Noord-Afghanistan, Tadzjikistan en het oosten van Oezbekistan. De donkergroene bladeren zijn breed lancetvormig die naar de top smaller worden. Zo'n acht tot tien witte bloemen met een grijsachtige waas is normaal. Verlangt een droge en zonnige plek gedurende de zomermaanden.



Bestelnr. 642

p.st. 3.95

3 st. 11.25



Fritillaria camschatcensis


(Synoniem: *Lilium camschatcense*)

Intro: 1757. De enige trans-Atlantische species. Komt voor in Noord-Amerika, van Washington tot Alaska en daar door de Eskimo's: Eskimo-aardappelen genoemd. Ook wordt hier de naam Chocolate Lily gebruikt. Ze worden ook aangetroffen op de Koerilen, Kamtsjatka en Noord-Japan. 'Rijstekorrelbolletje' is een toepasselijke bijnaam, dit vanwege de vele kraaltjes die na uitgroei de oorspronkelijke bol omgeven. Heldergeroene bladerkransen, meestal vijf in getal, omgeven de bloemsteel. Knikkende, bijna zwarte bloemen met opvallende gele helmknopjes.

Bestelnr. 644

p.st. 4.50

3 st. 12.75



Fritillaria davisii

Herkomst: Griekenland (het zuidoosten van de Peloponnesus). Vernoemd naar Dr. Peter H. Davis die deze *Fritillaria* daar in 1940 aantrof. Onder aan de bloemsteel bevinden zich twee brede en glanzende bladeren. De tot drie dikke wasachtige bloemknoppen tonen een sterk ruitpatroon. De bloemkleur is chocoladebruin met groen en aan de uiteinden van de kelkblaadjes een minuscule geel randje, aan de binnenzijde lichter gevekt.

Bestelnr. 648

5 st. 4.75

10 st. 9.00



Fritillaria eduardii 'Castor'

2015

(Synoniemen: *F. imperialis* subsp. *eduardii*
en *Petilium eduardii*)

F. eduardii wordt o.a. aangetroffen hoog in de bergen van Tadzjikistan, Turkije, Noordoost-Irak, Iran en Afghanistan. De bloeiwijze bestaat uit knikkende klokvormende bloemen, die enigszins terug krullen. Kenmerkend is dat de bloemen en de bollen niet de de zogenaamde vossengeur verspreiden, zoals *F. imperialis* dat wel doet. De cultivar *Castor* onderscheidt zich door de mooie zachtoranje bloemen.

Bestelnr. 6939

p.st. 4.95
3 st. 13.50

70-80 3-4 20 15-20 18



Fritillaria eduardii 'Pollux'

2015

Pollux (beta Geminorum) is de helderste ster in het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini). Het is met een afstand van 33,8 lichtjaar de dichtstbijzijnde oranje reuzenster. Een toepasselijke naam voor de cultivar *Pollux* die opvalt vanwege zijn de vurig oranje bloemen.

Pollux is ook genoemd naar de gelijknamige Romeinse mythologische figuur, de onsterfelijke tweelingbroer van Castor.

Bestelnr. 6940

p.st. 4.95
3 st. 13.50

70-80 3-4 20 15-20 18



Fritillaria elwesii

(Synoniem: *F. sieheana*)

Herkomst: het zuidwesten van Turkije, waar ze worden aangetroffen als onderbegroeiing van pijnbomen. Het steeltje is omgeven door smalle gewelfde bladeren. De tot vier semi-knikkende en klokvormige bloemen zijn purperbruin met heldergroene streepjes. Het hart van de bloem is gevuld met gele meeldraden en een brede harige stijl.

Bestelnr. 652

5 st. 3.50
10 st. 6.50

30-40 5-6 10 6-8 6



Fritillaria gibbosa


2015

Een zeldzaam en zeer moeilijk te houden *Fritillaria* voorkomend op droge hellingen in o.a. Afghanistan en Iran, het aanbod is verzameld in Armenië. De wonderschone platte bloemen zijn donker gespikkeld, het hartje is opvallend getekend. Het blad is grijsgroen, smal lancetvormig en doen vlezig aan. Bij voorkeur kweken in een alpinekasje.



Bestelnr. 6940

p.st. 49.50
3 st. 135.00



Fritillaria glauca 'Sunray'


2015

De oorspronkelijke *F. glauca* komt nog op grote schaal voor van Oregon tot in Noordwest-Californië. De bloemsteel is 10-15 cm hoog en heeft lancetvormige lichtgroene tot grijze bladeren omgeven door een blauwgrijs waas. Aan de buitenkant zijn de kelkbladeren wasachtig en goudgeel met een blauwe gloed. Aan de binnenkant is het geel bruin gespikkeld en er zitten chocaladekleurige vlekjes rond de nectariën. Ze verlangen een vochtige grond.



Bestelnr. 654

p.st. 4.00
3 st. 11.25




Fritillaria 'Golden Flag'

Een mutant uit *F. aurea*. Een opmerkelijk verschil met het type is dat de bloem wijder uitstaat. De gele bloemetjes zijn aan de buitenzijde voorzien van een verbluffend mooie nervatuur en spikkeltjes.



Bestelnr. 656

3 st. 4.95
5 st. 7.50



Fritillaria meleagris

Intro: 1573. Kievitsbloem, komt voor in vrijwel geheel Europa, in Nederland op de uiterwaarden langs de IJssel, massaal voorkomend in Hasselt en bij de Reeuwijkse plassen. Het is een stinzenplant. Bij uitstek geschikt voor verwildering. De bladeren zijn langwerpig. De bloemsteel heeft vrijwel altijd één klokvormige bloem per stengel, maar naarmate de planten langer op een plaats vast staan, kan dit aantal oplopen tot drie. De bloemen zijn wit tot paars met vele tussenliggende nuances, vaak met een gespikkeld en/of blokvormig patroon.


Bestelnr. 670	25 st.	3.50
	100 st.	13.00
	250 st.	30.00



Fritillaria meleagris 'Alba'

Een selectie uit verzamelde witte tinten van *F. meleagris*. Een frisse verschijning op wat donkerdere plaatsen in de tuin. De groene bloemtekening zoals bij de soort is nauwelijks waarneembaar.


Bestelnr. 673	10 st.	3.50
	25 st.	8.00



Fritillaria michailovskyi

Intro: 1905. Herkomst: het noordoosten van Turkije, vooral rond het Vanmeer en Kars. In 1904 voor het eerst aangetroffen en beschreven door Michailovski. Prima geschikt voor een wat beschaduwde rotstuin. De weinige bladeren zijn enigszins ellipsvormig. De bloemen tot wel acht in getal, zijn roodachtig purper met een kunstig goudgeel gebiesde bloemrand, de keel is geel.

Bestelnr. 675	10 st.	4.00
	25 st.	9.75



Fritillaria minuta


(Synoniem: *F. carduchorum*)

Intro: 1859. Herkomst: Zuidoost-Turkije en Noordwest-Iran. De bloemkleur is bruinachtig oranje met 'n zweem van stofgrijs, aan de binnenzijde is de smalle bloem voorzien van een barnsteen-geel netwerk. De stijl is glad en in drieën gedeeld. Glanzend groen blad. Deze *Fritillaria* houdt ervan om diep geplant te worden in een humusrijke bodem en wilt 's zomers niet te droog komen te staan.

Bestelnr. 677

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Fritillaria montana


(Synoniemen: *F. caulescens*, *F. neglecta*, *F. nigra*, *F. orsiniana*, *F. racemosa* en *F. tenella*)

Een wijdverbreid soort dat in heel Zuid-Frankrijk tot in Noord-Italië en verder weg tot in het voormalige Joegoslavië en Noord-Griekenland vrij goed is te vinden op steile hellingen. Het verspreid staande blad is kort en blauwachtig. De bloemkleur: aan de buitenzijde donker paarsachtig bruin met bruin en wat geelgroen. De binnenzijde is overwegend citroengeel met groen en kastanje, naar de basis bruinachtig. De bloemblaadjes zijn aan de top iets teruggeslagen.

Bestelnr. 679

3 st. 7.50

3 st. 21.00




Fritillaria pallidiflora

Intro: 1857. Ontdekt door de Duitse botanicus en plantenverzamelaar Eduard August von Regel (1815-1892). Mooie zeegroene kruislings geplaatste bladeren. Grote (ca. 5 cm) knikkende citroengele (pallidus betekent bleekgeel) bloemen met zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde fijne groene nerven. De plant draagt wel tot zeven bloemen per stengel. Herkomst: Oost-Siberië en Noordwest-China in vochtige veenachtige gras- en weidelanden. In China worden ze gekweekt voor medicinale doeleinden, net als alle andere Chinese species.

Bestelnr. 681

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Fritillaria persica


(Synoniemen: *F. eggeri*, *F. libanotica*, *F. arabica* en *Lilium persicum*)

Herkomst: Cyprus, Turkije, Iran en Syrië. De ca. 90 cm hoge bloemsteel wordt omgeven door blauwgroene bladeren die beurtelings langs de steel staan, vaak alleen, soms met drie bladeren op gelijke hoogte. De klokvormige intens donker purperen bloemen vormen een tros met een lengte van zo'n 30 cm.

De aangeboden bollen zijn Nederlands gekweekt.

Bestelnr. 718

p.st. 3.00
3 st. 8.25




Fritillaria persica 'Ivory Bells'

Een crèmewitte mutant uit *F. persica*. Mooie volle bloemaren met afhangende klokvormige bloemetjes. De selectie 'Ivory Bells' onderscheidt zich van *F. persica 'Alba'* door veel dichter bezette bloemstelen. De gehele plantopbouw oogt voller en krachtiger.

Bestelnr. 720

p.st. 7.95
3 st. 23.25




Fritillaria pontica

(Synoniem: *F. olympica*)

Intro: 1826. Herkomst: Albanië, Noord-Griekenland en Zuid-Bulgarije tot en met het Pontisch Gebergte in Turkije. Verlangt een licht beschaduwde plekje, maar is probleemloos te kweken. Bloeit in april-mei met één tot drie bloemen aan 15-35 cm lange stengels. De aparte bloemkleur is het best te omschrijven als: lichtgroen, naar de rand purperachtig bruin.

Bestelnr. 685

10 st. 4.00
25 st. 9.50




Fritillaria raddeana

(Synoniem: *F. askhabadensis*)

Intro 1909. Herkomst: Afghanistan, het noordoosten van Iran en het zuidoosten van Turkije. Verwant aan *F. imperialis*. Glanzend groene spits toelopende bladeren, die afwisselend zijn geplaatst tot vijftien cm van de bloeiwijze. Ieder stervormig en hangend bloemetje, vrijwel horizontaal geplaatst ten opzichte van de steel, is sleutelbloemgeel met een zachtgroene gloed. Fantastische voorjaarsbloei.

Bestelnr. 691

p.st. 5.50
3 st. 15.75




Fritillaria reuteri

Herkomst: Iran, nabij Isfahan, in natte, leemhoudende weiden op 2500-3000 meter hoogte. De plant lijkt op een rijk bloeiende *F. michailovskyi*, maar de bloemen zijn korter en slanker, de bloemstengel is langer. De klokvormige bloemen zijn donker kastanjebruin tot rood van kleur, ze staan horizontaal en wijd open en zijn voorzien van een geel randje. Het blad is lancetvormig. *F. reuteri* gedijt het beste op een koele, vochtige standplaats.

Bestelnr. 8127

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Fritillaria sewerzowii

(Synoniem: *Korolkowia sewerzowii*)

Herkomst: op puinhellingen in Kirgizië, Kazachstan, Afghanistan, Noord-Pakistan en Kasjmir, tot ver in China. Het tegenover elkaar geplaatste ellipsvormige blad is grijsgroen en zit langs een 25 tot 30 cm hoge steel. De pagodevormige bloemen, tot wel vijftien per steel, zijn slank tot halverwege de kroonbladeren, daarna naar buiten uitwaaiend waardoor de zwarte helmknoppen extra opvallen. De bloemkleur varieert van groen en bruin aan de buitenkant en zuiver groen aan de binnenkant tot paars.

Bestelnr. 700

p.st. 6.50
3 st. 18.00




Fritillaria stananthera

Herkomst: Oezbekistan, via Afghanistan naar Noord-Iran, en in het Kara-Tau beergebte in Kazachstan. Ze worden pleksgewijs aangetroffen rond Tasjkent en Chimgan. Een brede paarse cirkel rond de nectar klieren overheerst de bijzonder fraaie, zachtroze bloemen die ver opengaan en bijna horizontaal staan. De bladeren zijn grijsgroen.



Bestelnr. 695

p.st. 7.95
3 st. 22.50




Fritillaria thunbergii

F. thunbergii heeft aan de bladtoppen een soort hechtranken, waarmee deze zich in het wild staande houdt tussen de bamboe. Wanneer de *Fritillaria* geplant staat bij heesters, zal die zich vastgrijpen met zijn hechtranken in de takken. De bloemsteel draagt zo'n zestal verspreid zittende crèmegroene knikkende klokvormige bloemen die aan de binnenzijde rood gespikkeld zijn. Herkomst: Oost-Siberië, het noordwesten van China en verwilderd in Japan.



Bestelnr. 8129

p.st. 4.95
3 st. 14.25




Fritillaria uva-vulpis

Nederlandse naam: vossendruif. Intro: 1974. Herkomst: Oost-Turkije, Noord-Irak en West-Iran. Enkele glanzend groene en smalle bladeren omhullen de ca. 25 cm hoge bloemsteel. De bloeiwijze bestaat uit klokvormige knikkende bloemetjes, purperachtig van kleur en gehuld in een groene waas. De topjes van de bloemblaadjes zijn goudgeel, zo ook de keel. Leuk snijbloempje maar indien u ze laat uitgroeien, verschijnen de fraaie vruchtbeginsels. Het is één van de gemakkelijkste fritillaria's.



Bestelnr. 703

25 st. 3.50
50 st. 6.50





**FRITILLARIA IMPERIALIS
HISTORISCHE CULTIVARS**

Fritillaria imperialis 'Maxima Lutea'

Bestelnr. 8241

p.st.	3.50
3 st.	9.75

De Nederlandse naam luidt: keizerskroon. Rond het midden van de zestiende eeuw werden in Leiden, via Wenen (Oostenrijk) door Carolus Clusius de eerste fritillaria's aangeplant. Herkomst: Turkije, het zuidoosten en westen van Iran, Afghanistan, Pakistan en het Kashmir gebergte.




**Fritillaria imperialis
'Argenteovariegata'**

Bestelnr. 710

p.st.	11.00
3 st.	30.00




**Fritillaria imperialis
'Slagzwaard'**

Bestelnr. 6940

p.st.	3.50
3 st.	9.75



**Fritillaria imperialis
'Aureomarginata'**

Bestelnr. 724


p.st.	11.00
3 st.	30.00



**Fritillaria imperialis
'William Rex'**

Bestelnr. 6131

p.st.	3.50
3 st.	9.75





**FRITILLARIA IMPERIALIS
MODERNE CULTIVARS**

Fritillaria imperialis 'Orange Beauty'

Bestelnr. 9695

p.st. 3.50

3 st. 9.75

De zeer stevige bloemsteel is aan de onderste helft voorzien van smalle en spits toelopende glanzende bladeren. De lelieachtige bloemen, gevormd als een trompet, gaan vergezeld van een kroon met groene bladeren. Elk geaderd bloemblaadje heeft aan de binnenzijde een duidelijk zichtbaar honingstempel. U kunt genieten van de heerlijke honingsmaak door in de vroege ochtend eens, nadat de dauwdruppels hun werk hebben verricht, een licht tikje tegen de bloem te geven (uiteraard uw hand eronder houden) om van dit heerlijke vocht te proeven. De typische 'vossengeur' van keizerskronen, waarvan wordt gezegd dat het mollen, veldmuizen en woelratten weghoudt, wordt veroorzaakt door één vluchtige stof, een zwavelhoudend terpeen, dat de plant produceert. Om meerdere jaren achtereen een goede bloei te krijgen, is het belangrijk dat de keizerskroon jaarlijks van flink wat voeding en organische stof wordt voorzien. Herplanten is alleen nodig als de groepen te massief geworden zijn.



Fritillaria imperialis 'Garland Star'

Bestelnr. 722

p.st. 3.50

3 st. 9.75



Fritillaria imperialis 'Sunset'

Bestelnr. 6226


p.st. 3.95

3 st. 11.25





Nog een nieuwe groep in het assortiment keizerskronen. Mooie subtiele kleuren, veelal geaderde bloemen, maar vooral een zeer bruikbare hoogte in de border, rond 60-70 cm. Prettig vroeg bloeiend.

← **Fritillaria imperialis 'Early Wonder'** 
Bestelnr. 6945 **p.st. 3.50**
 3 st. 9.75




Fritillaria imperialis 'Early Fantasy' 
Bestelnr. 6942
 p.st. 4.75
 3 st. 13.50



Fritillaria imperialis 'Early Passion' 
Bestelnr. 6943
 p.st. 4.75
 3 st. 13.50



Fritillaria imperialis 'Early Romance' 
Bestelnr. 6944
 p.st. 4.75
 3 st. 13.50






Fritillaria 'Brahms'

Bestelnr. 6946

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Inmiddels al een vertrouwde groep keizerkronen, in vakjargon spreken we over de 'componisten'. Vroeger bloeiend dan de bekende *Fritillaria imperialis*, zachtere tinten en betrouwbaar terugkomend. Mogelijk ontstaan uit *Fritillaria raddeana* x *Fritillaria eduardi* var. *inodora*. Na de bloei ontstaan de zeer decoratieve zaaddozen die mooi te drogen zijn. Zowel de bloemen als de bollen zijn vrijwel geurloos. De drie componisten worden gemengd aangeboden onder de naam: Symphonica.



Fritillaria 'Chopin'

Bestelnr. 9686

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Fritillaria 'Vivaldi'

Bestelnr. 9687

3 st. 7.50
5 st. 12.00

Fritillaria -Symphonica-

Bestelnr. 9482

5 st. 12.00
10 st. 21.50

Fritillaria whittallii


Herkomst: het zuiden en westen van Turkije op stenige hellingen. Werd al in 1909 beschreven. De knikkende bloempjes, 2 tot 3 cm groot, soms twee per steel, zijn groengeel met een donkerbruin netwerk, soms ook donkerbruin geruit. De gespleten stijl is kort.



Bestelnr. 705

p.st. 4.50

3 st. 12.75



GALANTHUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER AMARYLLIDACEAE

Van het sneeuwkllokje zijn tot nu toe negentien soorten bekend. Dat kan nog best eens veranderen en niet alle botanici zijn het ook eens over dit aantal. Soorten komen ergens ter wereld in het wild voor. Veel sneeuwkllokjes zijn erg variabel en als iemand een afwijkend sneeuwkllokje ontdekt en dat een naam geeft dan is er weer een cultivar bij. In: GALANTHUS, a list of cultivarnames, van Hanneke van Dijk & Wim Snoeijer (ISBN: 978-90-73350-04-5), staan al ongeveer 2000 cultivars.

Het is nog steeds "in" om sneeuwkllokjes te verzamelen en fanatieke galanthofielen hebben grote bedragen voor een bolletje over. Door al die verschillende soorten en cultivars is het mogelijk om vanaf de herfst tot in april sneeuwkllokjes bloeiend in de tuin te hebben. Belangrijk is de bollen meteen na aankomst te planten. Vaak worden bijzondere sneeuwkllokjes "in the green" verkocht, houd hiervoor onze webwinkel in de gaten op www.nijssenbulbs.nl



Galanthus 'Atkinsii' (Imperial Group)


Intro: ca. 1870. Ontstaan uit een kruising tussen *G. nivalis* en *G. plicatus* uitgevoerd door J. Allen, Shepton Mallet, Engeland. Witte lange bloemen die doen denken aan de oorbellen van koningin Elizabeth I.



Bestelnr. 8573

p.st. 3.50


3 st. 9.75



Galanthus 'Charlotte' (Imperial Group)

In een partij sneeuwkllokjes die bollenkweker Jan Huisman van een boer in de Wieringermeer kocht, ontdekte hij een sneeuwkllokje dat duidelijk anders was. Niet wat tekening betrof, want die was niet afwijkend van de *Galanthus nivalis* waar het tussen stond, maar wel wat bloei betrof. Dit sneeuwkllokje dat maar kleine bolletjes heeft, bloeit ongelooflijk rijk en iets later dan de gewone soort. Jan noemde het naar zijn kleindochter Charlotte.


Bestelnr. 9219 5 st. 4.95
 10 st. 9.50



Galanthus 'Dionysus' (Double Group)

De dubbele sneeuwkllokjes van Heyrick Greatorex zijn beroemd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw voerde hij geheimzinnige kruisingen uit met als resultaat een aantal dubbele sneeuwkllokjes waarbij de binnenste bloemblaadjes veel netter gerangschikt zijn dan van 'Flore Pleno'. Het is vaak moeilijk om de dubbele sneeuwkllokjes van Greatorex uit elkaar te houden. 'Dionysus', ook wel op de markt als 'Sybil Roberta' heeft soms langere, meer overhangende bloemsteeltes dan de andere.

Bestelnr. 727 3 st. 4.95
 5 st. 7.50



Galanthus elwesii var. elwesii

(Synoniem: *G. elwesii*)

In 1874 ontdekte de Engelse plantenverzamelaar Henry John Elwes het grote sneeuwkllokje. Het werd naar hem vernoemd, *Galanthus elwesii*. Van dit sneeuwkllokje bestaan twee variëteiten, *Galanthus elwesii* var. *elwesii* en *Galanthus elwesii* var. *monostictus*. Die twee ontlopen elkaar niet veel, het enige verschil is dat de laatste één vlek op de binnenste bloemblaadjes heeft en de eerste twee. Ze zijn niet in een groep ingedeeld omdat het soorten zijn en geen cultivars.

Bestelnr. 729 10 st. 3.00
 25 st. 7.00
 100 st. 27.00




Galanthus 'Flore Pleno' (Double Group)

(Synoniem: *G. nivalis* var. *hortensis flore semipleno*)

Het bekende dubbele sneeuwkllokje dat al sinds 1731 in cultuur is. De binnenste bloemblaadjes vormen een frivool rokje waarbij de blaadjes lang niet zo netjes gerangschikt zijn als bij de *Greatorex doubles* bijvoorbeeld. Het leuke van deze sneeuwkllokjes is dat ze al uit de verte te herkennen zijn. De buitenste bloemblaadjes worden opgetild door de binnenste en daardoor zien ze er extra wit uit. Ze bloeien lang, zijn sterk en vermeerderen zich snel, voor je het weet heb je een veldje.


Bestelnr. 750	10 st.	5.00
	25 st.	11.25
	100 st.	39.50



Galanthus 'Happy New Year' (Imperial Group)

Zoals uit de naam op te maken is, hebben we hier een sneeuwkllok die het nieuwe jaar inluidt. Waardevol om zo vroeg in januari een sneeuwkllokje in de tuin te ontdekken, of om in een potje naar binnen te halen. Gevonden in een partij *G. elwesii* var. *elwesii*.


Bestelnr. 9949	p.st.	3.50
	3 st.	9.75



Galanthus 'Magnet' (Imperial Group) 2015

Een sierlijk sneeuwkllokje dat al meer dan 100 jaar bestaat en door James Allen werd geselecteerd. Tegelijk met 'Magnet' selecteerde hij het sneeuwkllokje 'Galatea'. Volgens Matt Bishop (Snowdrops) kunnen deze twee uit elkaar gehouden worden door naar hun bloemsteeltje te kijken. Bij 'Galatea' knikt het (lange, gebogen) bloemsteeltje net bij het vruchtbeginsel en bij 'Magnet' niet. Als je het helemaal zeker wilt weten kijk dan naar de tekening op de binnenste bloemblaadjes, de hoek van het V-tje is bij 'Magnet' 70° en bij 'Galatea' 90°.

Bestelnr. 743	p.st.	3.50
	3 st.	9.75




Galanthus 'Maximus' (Imperial Group)

2015

De kweker van deze reuzensneeuwlok had enige overredingskracht nodig om mij te overtuigen deze aan te bieden, er wordt in de literatuur getwijfeld aan het bestaan van deze cultivar. Er is sprake dat dit oude ras door van Tubergen is geregistreerd in 1914. Maar toch: echt onderscheidend vanwege hoogte, groei­kracht en grootte van de bloemen. In alle delen is deze *Galanthus* groter dan het gewone sneeuw­klokje. Ideaal om te laten verwilderen tussen iets forsere bodembedekkers.

Bestelnr. 6948

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Galanthus nivalis

Het gewone sneeuw­klokje dat iedereen kent. Als sneeuw­klokjes in sprookjes, gedichten en verhalen voorkomen dan is het dit sneeuw­klokje. Deze soort komt oorspronkelijk uit West-, Midden- en Zuid-Europa, maar werd rond 1500 in Nederland geïmporteerd. De buitenste bloemblaadjes zijn wit en op de binnenste bevindt zich een kleine groene U-vormige tekening. Uitstekende tuin­plant, geschikt voor verwildering.

Voor grote hoeveelheden treft u aanbod van een kleinere bolmaat op www.nijssenbulbs.nl aan.

Bestelnr. 745

10 st. 3.00
25 st. 7.00
100 st. 27.00




Galanthus nivalis

Het gewone sneeuw­klokje, duurzaam gekweekt, maar een kleinere bolmaat: 4. In het eerste jaar bloeien deze nog niet 100%.

Bestelnr. 6947

25 st. 7.00
100 st. 27.00




Galanthus reginae-olgae subsp. reginae-olgae

Een herfstbloeiende sneeuwkllok die in 1876 in Griekenland werd ontdekt en vernoemd naar de toenmalige koningin Olga. Deze subspecies krijgt eerst bloemen en pas daarna blad. De buitenste bloemblaadjes zijn wit en de tekening op de binnenste bloemblaadjes is V- of U-vormig. De aangeboden kloon is afkomstig uit de Peloponnesus. 's Zomers droog houden.



Bestelnr. 754

p.st. 9.00
3 st. 25.50



Galanthus 'S. Arnott' (Imperial Group)


(Synoniemen: *G. 'Arnott's Seedling'* en *G. 'Sam Arnott'*)

Als je maar één cultivar zou mogen kiezen dan moet je deze nemen. Dit is een super sneeuwkllokje. (Hanneke van Dijk, auteur). De bloemstengels zijn meer dan 30 cm lang en de grote bloemen hebben mooie bolle buitenste bloembladen. De binnenste bloembladen hebben een V-U-vormige groene tekening. Bijzonder is dat 'S. Arnott' heel sterk naar honing geurt.



Bestelnr. 756

3 st. 4.50
5 st. 7.00




Galanthus 'Viridapice' (Green Group)

Deze sneeuwkllokjes worden wel oneerbiedig 'groenpunten' genoemd, maar je weet dan wel meteen waar je het over hebt. De buitenste blaadjes hebben groene punten alsof ze in een potje groene verf gedoopt zijn. J.C.M. de Hoog vond dit sneeuwkllokje rond 1900 bij een oude boerderij in Noord-Holland. De Engelsen denken nog wel eens dat dit sneeuwkllokje van Engelse afkomst is en dat komt omdat het in 1922 door een Engelse bollenkweker op een RHS Show werd ingezonden. Maar ook toen al was er veel handel tussen Nederland en Engeland.

Bestelnr. 752


5 st. 4.95
10 st. 9.50



Galanthus 'Warei' (Green Group)

In 1886 kreeg William Boyd dit sneeuwkllokje in handen van Thomas S. Ware, Hale Farm Nursery, Tottenham, London. Aanvankelijk werd gedacht aan *G. nivalis* 'Scharlockii', maar de plant verschilde zich in het niet gespleten schutblad. Een goed ontwikkeld schutblad kan tot 11 cm lang worden en buigt zich soms sierlijk boven de bloemen. Groene tipjes op de buitenzijde van de bloemblaadjes.


Bestelnr. 6949 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75



Galanthus 'White Dream' (Imperial Group)

Zeer opvallend vanwege zijn spierwitte kleur. Van grote afstand is *G. 'White Dream'* herkenbaar, het is een van de witste sneeuwkllokken. Laat bloeiend, maart en krachtig groeiend. Een Nederlandse sneeuwkllok, geïntroduceerd door Tom Koopman.

Bestelnr. 6950 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75




Galanthus woronowii

(Synoniemen: *G. ikariae*, *G. ikariae* subsp. *latifolius*, *G. ikariae* subsp. *snogeruppi* en *G. latifolius*)

Deze soort werd in 1935 gevonden door een Russische botanicus en vernoemd naar Woronow, een plantenverzamelaar uit Georgië. Dit sneeuwkllokje is zo duidelijk afwijkend dat het goed te herkennen is. De bladeren zijn veel breder dan van andere sneeuwkllokjes en glanzend groen van kleur. De buitenste bloemblaadjes zijn wit en veel langer dan de binnenste die een groene tekening hebben.

Bestelnr. 758 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00
100 st. 27.00



GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN

Hotdrops o.a. uit Engeland.

De partijen zijn niet groot, maar wel van uitzonderlijke Engelse kwaliteit. Om zeker te zijn van de beschikbaarheid en om niet achter het net te vissen, kunt u de Engelse sneeuw klokken het beste bestellen op www.nijssenbulbs.nl, daar is het aanbod ook groter. Met bestellen middels het bestelformulier loopt u het risico dat op het moment van verwerken van uw bestelling het één en ander al is uitverkocht.



Galanthus 'Ballerina' (Double Group)

Een zeer mooi en regelmatig gevuld sneeuw klokje. De bloem lijkt wel een balletrok, zo mooi. In 1991 door J. Cornish geïntroduceerd.

Bestelnr. 9873

p.st. 24.50



Galanthus 'Big Boy' (Green Group)

Een zeer mooie *G. elwesii*, destijds gevonden door Alan Street. Doet zijn naam eer aan vanwege de inmens grote, variabel groen getekende buitenste bloemblaadjes. Dit komt pas tot uiting bij een volgroeide plant.

Bestelnr. 6201

p.st. 48.50



Galanthus 'Big Mask' (Imperial Group)

Een grote sneeuw klok waar op de binnenste bloemblaadjes de markeringen zo geplaatst zijn, dat het op een masker lijkt. Evenals *G. 'Grumpy'*, maar forser.

Bestelnr. 6950

p.st. 27.50



Galanthus 'Bill Clark' (Gold Group)

Een door de opzichter Bill Clark in 1970 op de Wandlebury Ring aangetroffen sneeuw klok. Een geel vruchtbeginsel en gele markering op de binnenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 6951

p.st. 39.50



Galanthus 'Blewbury Tart' (Spiky Group)

Ook door Allen Street gevonden, maar nu in Blewbury. Gevulde onregelmatig gevormde bloemen, vaak naar boven of opzij wijzend met veel groen in de bloem. Zeldzaam en opvallend soort.

Bestelnr. 9874

p.st. 11.50



Galanthus 'Cowhouse Green' (Green Group)

Eind jaren tachtig aangetroffen op een grondstuk waar vroeger een koeienstal heeft gestaan. Grote bloemen met op de buitenkant olijfgroene strepen. Vaak twee tot drie stelen per bol.

Bestelnr. 9952

p.st. 39.50

GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN



Galanthus 'Diggory' (Imperial Group)

Zeer afwijkend. De buitenste bloemblaadjes vormen een pukkelige ballonvorm, met een koord langs de zoom.

Bestelnr. 9628

p.st. 29.50



Galanthus 'Godfrey Owen' (Double Group)

Waarschijnlijk het enige sneeuwklkje met zes buitenste bloemblaadjes en zes binnenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9631

p.st. 32.50



Galanthus 'Hanneke' (Double Group)

Een klein dubbel sneeuwklkje, maar dan groen aan de buitenkant. Bij mooi weer krullen de buitenste bloemblaadjes sierlijk op. Vernoemd naar Hanneke van Dijk.

Bestelnr. 6252

p.st. 27.50



Galanthus 'Heffalump' (Double Group)

De gevulde bloemen zijn intens groen gemarkeerd. De buitenste bloemblaadjes zijn smal. Aangetroffen in de tuin in South Hayes, eind jaren tachtig.

Bestelnr. 9607

p.st. 19.50



Galanthus 'Kildare' (Green Group)

Uit Ierland. Grote, slanke bloemen waarvan de buitenste bloemblaadjes aan de onderkant groen gestreept zijn. Binnenin groen, naar de basis lichter wordend. Krachtig.

Bestelnr. 9609

p.st. 16.50



Galanthus 'Madeleine' (Gold Group)

Een wat nieuwere gele sneeuwklk met een kleinere habitus. Naarmate de plant langer vast staat, wordt het geel in de bloem intensiever van kleur.

Bestelnr. 6905

p.st. 32.50



Galanthus 'Mrs. Thompson' (Imperial Group)

Een rareiteit, meestal hebben de bloemen vijf bloemblaadjes in plaats van drie. Robuuste plant, veel gezocht.

Bestelnr. 9613

p.st. 16.00



Galanthus 'Primrose Warburg' (Gold Group)

Een 'gouden' sneeuwklk. Het vruchtbeginsel is geel en de binnenste bloemblaadjes zijn heldergeel gemarkeerd.

Bestelnr. 9647

p.st. 23.50

GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN



Galanthus 'Rosemary Burnham' (Green Group)

Fantastische *G. elwesii* met op de buitenste bloemblaadjes schitterende groene nerven, de binnenste bloemblaadjes tonen een mooi groot groen merk.

Bestelnr. 6906

p.st. 65.00



Galanthus 'South Hayes' (Fancy Group)

Uit handen van de zeer gewaardeerde Colin Mason, deze selectie uit Trym. Nog veel mooier vanwege de bijzondere groene tekening op de buitenzijde van de bloemblaadjes. Schaars.

Bestelnr. 6907

p.st. 49.50



Galanthus 'Spindlestone Surprise' (Gold Group)

Wellicht de mooiste 'gouden' sneeuwkllok. Een wat grotere vorm met een geel vruchtbeginsel en duidelijke gele markeringen op de binnenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9617

p.st. 24.50




Galanthus 'Trumps' (Fancy Group)

Een vroegbloeiende zaailing waarvan de buitenste bloemblaadjes, voorzien van een groene markering, zich na enige tijd horizontaal uitspreiden. In de tuin van John Morley aangetroffen.

Bestelnr. 6206

p.st. 40.00



Galanthus 'Trymlet' (Fancy Group)

Een plicatus, een selectie uit nakomelingen van Trym. Schaars. Prachtige bloemvorm met opvallende groene tekening op de buitenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9879

p.st. 32.50



Galanthus 'Walrus' (Double Group)


Echt een buitenbeetje. De groene buitenste bloemblaadjes zijn zeer slank en wijzen ver naar buiten, gelijkend de snorharen van een walrus. Kleine plant, langzaam groeiend.

Bestelnr. 6953

p.st. 24.50

Handcultivator

3 gebogen tanden gelast en gehard.



totale lengte : 240 mm
breedte van de tanden : 65 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4710

p.st. 30.00

Zevenbladvork

2 tanden gezet, gelast en gehard.



totale lengte : 315 mm
lengte x breedte tanden: 180x35 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4711

p.st. 24.00

Het geslacht Ooievaarsbek omvat vele honderden soorten waarvan 'n enkele verdikte wortelstokken als onderaardse delen heeft. Het overgrote deel zijn vaste planten waarvan het aangeboden sortiment jaarlijks toeneemt en verbetert, kijk voor een actueel aanbod op www.nijssenbulbs.nl. Ze verlangen een plekje in de lichte schaduw en een normale, doorlatende grondsoort die liever te droog dan vochtig dient te zijn (vooral in de zomermaanden!).



Geranium macrostylum



(Synoniem: *G. tuberosum* subsp. *macrostylum*)


Een prachtige grootbloemige species met purper-roze bloemen, gemarkeerd met purperen aderen. Herkomst: Het Talish-gebergte in Zuid-Azerbeidjzan. Het aanbod is afkomstig van materiaal dat verzameld is nabij Gosmoljan. *G. macrostylum* wordt ook aangetroffen in het noordwesten van Turkije en het voormalige Joegoslavië. Het is een snelle groeier die ook op wat drogere plekken optimaal tot zijn recht komt.



Bestelnr. 767

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Geranium transversale forma laciniata


Herkomst: Oezbekistan, door Janis Ruksans aangetroffen in het Tschatkal-gebergte. Deze ongewone vorm van *G. transversale* met zeer smal loof dat dun en spichtig oogt, heeft een luchtige, exotische habitus. De purperlila bloemen verschijnen in april-mei.



Bestelnr. 8141

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Geranium tuberosum

Intro: 1596. Herkomst: Zuid-Europa en Turkije. Nederlandse naam: knolooievaarsbek. (Tuberosus betekent: knolachtig verdikt). De bladeren zijn diep ingesneden. Op een behaarde 20-25 cm hoge en rechte bloemsteel ontwikkelen zich ca. 2 cm grote bloemen die uit vijf gekerfde roze tot lichtpaarse bloemblaadjes bestaan; elk bloemblaadje heeft een donkere nerf. Na de bloei verkleurt het blad rood alvorens het afsterft.

Bestelnr. 771

10 st. 3.00

25 st. 7.00



GETHYUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Gethyum atropurpureum


(Synoniem: *Solaria atropurpurea*)

Afkomstig uit de omgeving van Santiago, Chili, een gebied met milde winters en droge zomers. Hier winterhard op een beschutte standplaats. De langdurige bloei volgt in het voorjaar met zijdenzwarte, bruine stervormige bloemetjes op 30 cm hoge steeltjes. Minder aangenaam geurend, alhoewel daar weinig van te merken is.

Bestelnr. 9753

p.st. 6.50

3 st. 18.00



GLADIOLUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

De grootbloemige, felgekleurde Gladiolen-hybriden zijn overbekend als snijbloem, maar in het algemeen hier niet zo populair voor tuinbeplanting. Maar, er zijn een aantal bijzondere Gladiolen-species die vrijwel winterhard zijn en zich prima lenen voor beplanting in een border.




Gladiolus atroviolaceus

2015

Voorkomend in vochtige weides en korenvelden op hellend terrein in o.a. Oost-Turkije, Irak, Armenië en Iran waar dit aanbod vandaan komt. Schitterende tot twaalf donkere bloemen per steel. Een prima winterharde wildgladiool en goed houdbaar als deze na de bloei maar niet te nat komt te staan.

Bestelnr. 6954

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Gladiolus communis subsp. byzantinus

Het is mij niet duidelijk of we hier te maken hebben met een vorm van *G. italicus* (*G. segetum*) of met een uit zaad geselecteerde vorm van *G. communis subsp. byzantinus*. Het betreft hier een aanbod van een winterhard en makkelijk groeiend gladiooltje dat prima toepasbaar is in de border tussen de vaste planten. Licht violette bloemen in aren en na de bloei mooie zaaddozen. Herkomst: grote delen van Zuid-Europa.

Bestelnr. 9962

10 st. 2.50
25 st. 6.00




Gladiolus imbricatus

Inheems in Zuidoost-Europa en Turkije, waar het in moerassen en vochtige weilanden groeit. De dichte aar draagt vier tot twaalf grote bloemen, in kleur variërend van diep paars tot karmijnrood. Karakteristiek voor de soort is dat het onderste blad niet scherp is maar rond, stomp. Winterhard op doorlatende grond waarbij de bodem vochtig moet zijn ten tijde van de groei.

Bestelnr. 9696

p.st. 3.95
3 st. 11.25



GYMNOSPERMIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER BERBERIDACEAE

Gymnospermium albertii




(Synoniem: *Leontice albertii*)

Misschien wel het mooiste bolgewasje dat begint te bloeien zodra de sneeuw smelt. De diepgele bloemen, met een purperen adering, ontluiken in knikkelde bloemtrossen aan de roodbruin steel-tje. Het roodbruine, handvormige blad ontwikkelt zich gelijktijdig. Inheems in Centraal-Azië, het aanbod is verzameld op de berg Chimgan in Oezbekistan. Bij voorkeur droog overzomereren.

Bestelnr. 9483

p.st. 17.50

3 st. 51.00



HERMODACTYLUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE


Hermodactylus tuberosa

Vingerknol. Intro: 1597. Herkomst: Zuid-Europa, Noord-Afrika, Israël en Turkije. De lange en vierkantige bladeren komen zeer vroeg tevoorschijn. De geurende bloemen zijn bijzonder: het opgaande gedeelte van de bloem (de staander) is geelachtig groen terwijl het hangende deel (de lip) zeer donkerpaars is, voorzien van een crème streep. Verwildert goed op een warm plekje op een doorlatende zanderige grond.

Bestelnr. 776

10 st. 3.00

25 st. 7.00



HYACINTHELLA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE


Hyacinthella campanulata

In 1981 werd dit bijzondere bolgewasje geïntroduceerd door Karin Person. Inheems in Turkije op kalksteenrotsen op 1100 tot 1300 meter hoogte. Het bloemsteel-tje ontwikkelt zich tussen slechts twee glanzende bladeren en draagt een compact trosje met tot twaalf zachtblauwe belvormige bloempjes. Groeit prima in een pot.

Bestelnr. 6136

p.st. 8.50

3 st. 24.00




Hyacinthella pallens

(Synoniemen: *Hyacinthus dalmaticus*,
Hyacinthella dalmatica en *Bellevalia dalmatica*)

Herkomst: Dalmatië, in het bijzonder het gebied rond Dubrovnik. Ook aangetroffen op Cyprus en in gedeelten van Turkije. De bloemtrosjes zijn dicht bezet met klokvormige helder azuurblauwe bloempjes die aan de top zijn omgebogen. Leuk gewasje voor verwildering.

Bestelnr. 6137 **10 st. 4.50**
25 st. 10.50




Hyacinthoides non-scripta

(Synoniemen: *Scilla non-scripta* en *Scilla nutans*)

Hazenklokje en ook: 'Bluebell'. Deze species was al in de middeleeuwen bekend. Hoewel de oorspronkelijke vindplaatsen zich in het noordwesten van Italië en het zuidoosten van Frankrijk bevinden, treffen we de hazenklokjes verwilderd aan in vrijwel geheel Europa. Het glanzend groene blad is vrij breed en lintvormig. De smalle klokvormige en zacht geurende blauwe bloemen zijn min of meer naar één zijde gericht. Perfect voor verwildering en onderbegroeiing. Het aanbod is afkomstig van een kwekerij uit Engeland.

Bestelnr. 792 **10 st. 3.50**
25 st. 8.25
100 st. 30.00




Hyacinthoides vicentina

(Synoniem: *Scilla vicentina*)

Uitsluitend voorkomend in het zuidwestelijke puntje van Portugal in het natuurpark: Parque Natural do S.W. Alentejano e Costa Vicentina. Aanvankelijk werd gedacht dat het hyacintje was uitgestorven, gelukkig zijn er toch weer enige populaties aangetroffen. De zachtblauwe kleine bloemetjes verschijnen in mei. Voor een zonnige standplaats.

Bestelnr. 8579 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00





De eerste beschrijving van de boshyacint dateert van 1601. De brede bladeren zijn wat hangend en lintvormig. De ronde tot 40 cm hoge bloemstelen zijn voor ongeveer eenderde bezet met vele knikkende, breed klokvormige bloemen die de volle zon verdragen, maar hun bloemkleur optimaal tonen op een beschaduwde plek. Prima soortje voor verwilderde ring. Herkomst: Noord-Afrika, Portugal en het westelijk deel van het Middellandse Zeegebied.

← **Hyacinthoides hispanica 'Miss World'**

Bestelnr. 9965	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	25.00



Hyacinthoides hispanica -blauw-

Bestelnr. 780	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	25.00

Hyacinthoides hispanica -blauw- 

Biologisch geteeld:		
Bestelnr. 6956	10 st.	3.50
bolomvang 6 cm.	25 st.	8.00
	100 st.	30.00




Hyacinthoides hispanica 'White City'

Bestelnr. 9698	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	25.00



Hyacinthoides hispanica -gemengde kleuren-

Bestelnr. 788	10 st.	2.50
	25 st.	5.75
	100 st.	20.00




Hyacinthus orientalis

De koningin van de voorjaarsbloeiers! Intro: 1562. De aangeboden partij van deze wildvorm komt oorspronkelijk uit de Hortus Bulborum in Limmen. De hyacint is inheems in Klein-Azië, met name in Turkije, Syrië en Libanon. Ze groeien tussen rotsen op wel 2000 meter hoogte. Uit de *H. orientalis* zijn de tegenwoordig aangeboden hyacinten ontstaan. Welriekend.

Bestelnr. 795

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Hyacinthus orientalis -Festival mix-

Bestelnr. 6138

5.st. 3.75
10 st. 7.00


Heerlijk geurende hyacinten met een natuurlijke uitstraling. Er verschijnen meerdere bloemstelen per bol. Door de luchtige opbouw vallen deze niet snel om. Prima toepasbaar in de border, potten en manden. Festivalhyacinten kunnen jaren in de grond blijven. Een (organische) bemesting direct na de bloei en in de herfst is dan wel van belang.



Hyacinthus orientalis 'Blue Festival'

Bestelnr. 8581


5.st. 3.75
10 st. 7.00



Hyacinthus orientalis 'White Festival'

Bestelnr. 8585


5.st. 3.75
10 st. 7.00



Hyacinthus orientalis 'Pink Festival'

Bestelnr. 8583

5.st. 3.75
10 st. 7.00





Ipheion uniflorum 'Alberto Castillo'

Bestelnr. 804	10 st.	2.50
	25 st.	6.00

Oude Wijfjes. *I. uniflorum* werd al in 1832 geïntroduceerd. Herkomst: Zuid-Brazilië, Uruguay, Argentinië en Peru waar ze in grote aantallen voorkomen in weide- en graslanden alsook op rotsachtige terreinen. Ze gedijen bij voorkeur in de volle zon. Het fijngewreven blad heeft een lichte uiengeur, de bloemen ruiken naar zeep. Vanwege deze uiengeur wordt *Ipheion* ook gebruikt tussen rozenstruiken tegen het rozenaaltje. Zeer geschikt voor verwildering.

Ipheion uniflorum 'Jessie'

Bestelnr. 814

25 st.	4.00
100 st.	15.00



Ipheion uniflorum 'Rolf Fiedler'

Bestelnr. 810

25 st.	4.00
100 st.	15.00




Ipheion uniflorum 'Tessa'

Bestelnr. 6957

10 st.	2.50
25 st.	6.00



2015



Iris betekent: regenboog, een goede benaming voor dit geslacht waarin we ook werkelijk alle kleuren van de regenboog aantreffen en ook combinaties hiervan. Dit geslacht bestaat uit wel 200 species, die uitsluitend op het Noordelijk-Halfrond voorkomen. Hieruit zijn duizenden cultivars voortgekomen. De ondergrondse delen bestaan uit bollen of (vaak verdikte) wortelstokken, zogenaamde: rhizomen. De bloem van een iris bestaat uit twee (hoofd)delen: het opgaande gedeelte wordt aangeduid met staander, vlag of kroonblad, het neergaande (hangende) gedeelte met lip of baard.



Iris aucheri

(Synoniemen: *I. fumosa* en *I. sindjarensis*)


Intro: 1890. Herkomst: het zuidoosten van Turkije, Noord-Irak, Jordanië, Noord-Syrië en het noordwesten van Iran. De bloemstengel wordt omvat door preigroene bladeren; aan de top van de bloemstengel worden tussen de okselbladeren tot zes naar vanille geurende bloemen gevormd. De staanders zijn lichtblauw, de lip donkerblauw met purperen lijntjes en het honingmerk is geel.



Bestelnr. 820

3 st. 3.75

5 st. 6.00




Iris bucharica

Intro: 1901. Een gemakkelijk te kweken species die voorkomt in het Pamir Alai-gebergte maar ook in Tadzjikistan en het noordoosten van Afghanistan. De glanzende in lagen geplaatste bladeren staan tegenover elkaar. De tot zeven heerlijk geurende bloemen komen uit de bovenste bladoksels tevoorschijn. De aangeboden cultuurvorm heeft een crèmewitte vlag, de lip is van dezelfde kleur maar heeft een grote ovale goudgele vlek en donkere strepen. Houdt van zon en van een goed gedraineerde grondsoort.

Bestelnr. 824

5 st. 3.50

10 st. 6.50




Iris cycloglossa

(Synoniem: *Iris duclouxii*)

Intro: 1958. Herkomst: Zuid-Afghanistan. De vorm van de bloem is ongewoon voor een Juno-type. Ze bestaat namelijk uit brede vlakke buitenste bloembladen en horizontale binnenste bloembladen. Op de lavendelblauwe lip bevindt zich een grote witte vlek waarop weer een klein geel vlekje (het honingmerk) zit dat wordt omgeven door ragfijne donkere adertjes. De plant wordt 40 cm hoog en heeft zo'n zes smalle bladeren op het onderste deel van de stengel. Welriekend.

Bestelnr. 826

p.st. 2.95
3 st. 8.25




Iris danfordiae

(Syn.: *I. amasiana*, *I. bornmuelleri* en *I. crociformis*)

Geïntroduceerd in 1876 door Mrs. Danford. De plant heeft zeer smal blauwgrijs blad. De goudgele bloemen met groene spikkels op de lip verschijnen in februari. Herkomst: Turkije (Taurus gebergte). Zacht geurend. De bol van *Iris danfordiae* heeft de vreemde gewoonte om na de bloei in vele kleine kraaltjes uiteen te vallen. Dit kan voorkomen worden door deze dieper te planten en van een royale hand voeding te voorzien.

Bestelnr. 828

25 st. 3.75
100 st. 14.00




Iris foetidissima 'Citrina'

Nederlandse naam: Stinkende lis. De aangeboden vorm is een rijk bloeiende zachtgele lis die zelfs op droge grond in de schaduw gedijt. Ruim na de bloei barsten de opgezwollen peulen open en ontluikt er een dikke tros rode bessen die decoratief blijft tot ver in de winter.

Bestelnr. 9701

p.st. 5.50
3 st. 15.75




Iris histrio

Het verspreidingsgebied van deze variabele wildvorm is groot: van Israël via Libanon en Syrië en grote delen van het zuiden van Turkije. De babyblauwe lippen zijn besprenkeld met stipjes en vlekjes en zijn naar de basis donkerder gekleurd. Een mooie, opvallende dwergiris.

Bestelnr. 6149

10 st. 3.50

25 st. 8.00



Iris histrio var. aintabensis


©2015

Intro: 1933. Herkomst: het zuiden van Turkije en Syrië. De bloempjes zijn zeer lichtblauw met donkerblauwe en witte spikkeltjes op de lip met daarop een geel honingmerk. Het slechts 10 cm hoge irisje bloeit al in februari. Diep planten om te voorkomen dat de bol na de bloei in vele kraaltjes uiteen valt.

Bestelnr. 881

3 st. 4.95

5 st. 8.00




Iris histrioides 'George'

Intro: 1973. Vernoemd naar George Rodionenko, hortulanus te Leningrad. Ontstaan uit een kruising van *Iris histrioides* var. *major* x *Iris reticulata* 'J.S. Dijt'. Een grote bloem, waarvan de vlag paars is. De lip is ietsje donkerder van kleur met een zweem van donkerpaars, versierd met gele spikkels en paarse streepjes met een geel honingmerk op een witte achtergrond. Een iris die betrouwbaar terugkomt.

Bestelnr. 840

25 st. 4.00

100 st. 15.00



Iris historioides 'Lady Beatrix Stanley'

Intro: 1930. De bloemen zijn uniform morsblauw. Op de lippen witte veertjes en een geel honingmerk. De bloem verspreidt een heerlijke viooltjesgeur. In 1977 een Award of Merit van de Royal Horticultural Society ontvangen.


Bestelnr. 842 10 st. 3.00
25 st. 7.00



Iris hoogiana

In 1913 door Van Tubergen geïntroduceerd. Direct in die jaren daarna, zijn er vele onderscheidingen en getuigschriften verdiend. Herkomst: Turkestan. De twee, soms drie heerlijk geurende bloemen per steel, zijn zacht lavendelblauw met een gele baard. Het blad is donker blauwgroen.


Bestelnr. 8153 p.st. 4.95
3 st. 14.25



Iris iberica subsp. elegantissima 2015

Sectie Onocyclus. Inheems in Noordoost-Turkije, Noordwest-Iran en Armenië, op grassteppen en kleiheuvels, vaak op ongecultiveerde terreinen. Een zeer aantrekkelijke en opvallende species met witte opstaande bloembladen en sterk bruingeaderde onderste bloembladen. Winterhard, maar vergt in de nazomer en winter enige bescherming tegen regen.

Bestelnr. p.st. 22.00
3 st. 63.00



Iris 'Katharine Hodgkin'

Werd in 1958 door E.B. Anderson geselecteerd en vernoemd naar de echtgenote van Eliot Hodgkin. Hij was een vermaard bollenverzamelaar en kweker. Ontstaan uit een kruising van *I. histrioides* var. *major* x *I. winogradowii*. De vlag is blauw-achtig groen, de lip is groenachtig blauw met een zweem van geel en voorzien van blauwe adertjes. Het honingmerk is geel. De bloem is vrij groot.



Bestelnr. 846

10 st. 2.75

25 st. 6.50



Iris (Regelio-cyclus groep) 'Dardanus'

Een waardevolle iris die is ontstaan uit een kruising van *I. korolkowii* 'Concolor' en *I. iberica*.


De paarse vlag heeft zachtlila nerven met een lila waas. De baard is crèmekleurig, voorzien van donkerpaarse nerven en een honingmerk in dezelfde tint.



Bestelnr. 866

5 st. 6.00

10 st. 11.50



Iris 'Sheila Ann Germany'

Ontstaan uit de kruisingsouders *I. histrioides* var. *major* en *I. winogradowii*. Evenals 'Frank Elder' en 'Katharine Hodgkin' ontving dit mooie irisje een Award of Merit van de Royal Horticultural Society.

De staanders zijn wit met een blauwe waas. De lippen zijn wit met licht- en donkerblauwe veertjes, voorzien van een geel honingmerk.



Bestelnr. 889

10 st. 3.00

25 st. 7.00




Iris winogradowii

Intro: 1927. Herkomst: Trans-Kaukasus, waar ze werden verzameld door P.F. Winogradow.

De bloemen zijn uniform lichtgeel met op het midden van de lippen een oranje lijn omgeven door groene vlekjes. Op de oorspronkelijke vindplaats zijn zij, nadat deze daar bijna waren verdwenen, door George Rodionenko teruggeplant. Het uitgezette materiaal was afkomstig van een goed groeiende partij van de Komarov Botanical Institute. *I. winogradowii* gedijt het best op een 's zomers niet te droge grondsoort.

Bestelnr. 874

3 st. 6.75
5 st. 11.00




IRIS RETICULATA CULTIVARS

Iris reticulata 'Alida'

Uit *I. reticulata* 'Harmony' geselecteerd en in 1990 geregistreerd. De lip is korenbloemblauw, licht barijmeel gestreept, uitlopend in ivoorkleurig witte vlekjes. De standers zijn zachtblauw.

Bestelnr. 9703

25 st. 3.50
100 st. 13.00




Iris reticulata 'Clairette'

Intro: 1953. *Iris reticulata* x *Iris bakeriana*. Hemelsblauwe standers worden omsloten door middenblauwe lippen voorzien van een witte tekening. Opvallend mooi.

Bestelnr. 8593

25 st. 3.75
100 st. 14.00



Iris reticulata 'Eye Catcher'


2015

Een cultivar van Alan McMurtie. Ijsblauwe, bijna sneeuwwitte bloemen, vanuit het hart van de bloem diep violetblauw. Midden op de ijsblauwe lippen is een heldergele band zichtbaar met rondom onregelmatige blauwe spikkeltjes. Een echte blikvanger zodra dit irisje de eerste voorjaarswarmte ervaart.

Bestelnr. 6958

5 st. 4.00

10 st. 7.50




Iris reticulata 'Gordon'

Intro: 1971. *I. bakeriana* x *I. reticulata* 'Cantab', vernoemd naar de Amerikaan Gordon Blackwell. De staanders zijn lichtblauw, de lippen violetblauw met een violette blos. Het honingmerk is oranje op een witte ondergrond vergezeld van piepkleine blauwe streepjes.

Bestelnr. 850

25 st. 3.75

100 st. 14.00




Iris reticulata 'Halkis'

In maart 2007 geregistreerd. Dit soortje is gekweekt uit plantmateriaal dat oorspronkelijk is ontdekt door Norman Stevens op de berg Mount Halkis, Turkije in 1990. De bloemen zijn donker violet, bijna zwart, de lippen zijn diep marineblauw waarop een levendig wit met gele tekening zit.

Bestelnr. 836

25 st. 3.75

100 st. 14.00



IXIA


BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Ixia paniculata 'Eos'

Ixia paniculata is inheems op vochtige zandvlaktes in het noordwesten en zuidwesten van de Kaap. De cultivar 'Eos' is vernoemd naar de godin van de dageraad uit de Griekse mythologie. Elk steeltje produceert zeker vijftien zacht abrikoosgele bloemen. De stervormige bloemen ontluiken uit een purperrood steeltje. De bollen kunnen in het najaar geplant worden en hebben bewezen goed winterhard te zijn.

Bestelnr. 9486

25 st. 3.00
100 st. 11.00



IXIOLIRION

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IXIOLIRIACEAE


Ixiolirion tataricum

(Synoniemen: *I. ledebourii*, *I. montanum* en *I. pallasii*)

Blauwe sterlelie. Intro 1821. Herkomst: van de Kaspische-Zee via Klein-Azië tot aan Israël en Egypte. De ranke bloemstelen met donkerblauwe trechtervormige bloemen verschijnen vanaf eind mei. Het bloemscherf bevat tien tot vijftien los ogende bloemen. Ze gedijen op een droog en zonnig plekje, perfect voor verwildering.

Bestelnr. 877

25 st. 2.50
100 st. 9.00



LEUCOJUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER AMARYLLIDACEAE

Ontleend aan het Griekse woord leucoieon wat zoveel betekent als: 'witte ogen'. Deze naam werd gebruikt door Hippocrates. Dit geslacht is nauw verwant aan *Galanthus*. Het voornaamste verschil zit in de lengte van de kelkblaadjes. Bij *Leucojum* zijn ze van gelijke lengte.




Leucojum aestivum

(Synoniemen: *L. hernandezii* en *L. pulchellum*)

Intro: 1594. Herkomst: grote delen van Europa en het zuidwesten van Azië tot Noord-Iran, zeldzaam in België en Nederland (stinzenplant). Ze vragen om een vochtig standplaats. Het blad verschijnt soms tijdens de wintermaanden, dat bij vorst e.d. geen consequenties heeft. De 20-35 cm hoge bloemstelen zijn voorzien van drie tot vijf klokvormige witte bloempjes die op ieder kelkblaadje met een groen topje zijn versierd. Nederlands gekweekte bollen.

Bestelnr. 895

10 st. 4.50
25 st. 10.50




Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'

De aangeboden partij *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant' is een grootbloemige kloon. De tot zes knikkende klokvormige en helderwitte bloemen hebben aan het uiteinde van de kelkblaadjes zeer opvallende zachtgroene punten. Dit in mei-juni bloeiende gewas houdt van een vochtige voedselrijke grond, bijvoorbeeld geplant rond vijvers. Gravetye Manor was het landgoed van de plantenliefhebber William Robinson, Sussex, Engeland.

Bestelnr. 897

10 st. 5.00
25 st. 11.25




Acis autumnalis 'September Snow'

(*Leucojum autumnale* 'September Snow')

Het herfstklokje en uit het Duits vertaald: feeënklokje. Vanaf augustus verschijnen de sierlijke parelwitte klokvormige bloempjes, vaak per twee, aan een roodverkleurend steeltje. Dit rood loopt door tot in het vruchtbeginsel bovenaan de bloem. De variërende wildvorm komt voor in het Zuidwesten van Europa en Noord-Afrika, waar het makkelijk groeit op zonnige standplaatsen in doorlatende grond.

Bestelnr. 901

5 st. 6.00
10 st. 11.50



Acis nicaeensis


(Synoniemen: *Leucojum nicaeense* en *L. hiemale*)

Het Franse lenteklokje. Herkomst: het zuidoosten van Frankrijk, de Côte d'Azur alwaar zij Nivéole de Nice genoemd worden. De witte knikkende bloempjes worden vergezeld door donkergroene bladeren.

Bestelnr. 903

3 st. 5.25

5 st. 8.00



Leucojum vernum


(Synoniem: *L. carpathicum*)

Intro: 1420. Herkomst: van België tot Polen en van de Pyreneeën tot voormalig Joegoslavië. Verwilderd in Nederland, Zuid-Engeland en Denemarken. De geurende bloemen zijn roomwit met groene puntjes aan de bloemtoppen voor zover de species afkomstig is uit westelijke gebieden. In de zuidelijke streken zijn ze voorzien van gele bloemtopjes. De donkergroene bladeren glanzen. Behoren geplant te worden in een vochtige grond. Na aanplant kunnen de bollen wel een jaar latent blijven!

Bestelnr. 905

10 st. 5.00

25 st. 11.25




Leucojum vernum var. *carpathicum* 'Podpolozje'

De oorspronkelijke species werd aan het einde van de 19e eeuw beschreven. Verzameld nabij de plaats Podpolozje, in het oosten van de Karpaten. Een selectie waarbij twee bloemetjes per bloemsteeltje zitten. Op de topjes van de bloemblaadjes bevinden zich gele puntjes. Ideaal voor een vochtig plekje in de lichte schaduw tot schaduw.

Bestelnr. 907

p.st. 8.95

3 st. 25.50



Bij benadering zijn er honderd species van het geslacht Lelie bekend. Het aantal cultivars rijst de pan uit en loopt in de duizenden. De species worden aangetroffen in bosachtige streken van Europa, Centraal- en Zuid-Azië tot aan de Filippijnen en Noord-Amerika. Vele lelies geuren. Het zinnebeeld van reinheid en onschuld! Ze behoren tot de oudst bekende planten en worden terecht tot schoonheidskoninginnen van de tuinplanten verheven.



Lilium auratum var. platyphyllum


De Goudband-lelie. Een vooral op Honshu, in Japan, inheemse vorm waarbij over de witte, licht gespikkelde bloembladeren een brede goudgele band te zien is. De wasachtige bloemen verspreiden gedurende de zomermaanden een heerlijke geur. Robuuste planten die bij voorkeur op een zure bodem in de halfschaduw staan.



Bestelnr. 6255

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Lilium candidum

Maria- of Madonnalelie. Ze worden aangetroffen in Libanon en Oost-Israël, hoewel ervan wordt uitgegaan dat ergens in de Balkan, de eerste exemplaren aangetroffen zijn. De Romeinen namen deze bloem mee als teken van overwinning, later de kruisvaarders. Zij zorgden ervoor dat *Lilium candidum* naar Midden- en West-Europa kwam. Aan de bloemsteel zitten verspreide lancetvormige bladeren en tot wel twintig geurende naar buiten gerichte breed trechtersvormige witte bloemen. De eerste bladeren verschijnen vaak in de herfst.

Bestelnr. 910

p.st. 4.50

3 st. 12.75




Lilium 'Eurydice'

Zij was de mooiste nimf van de Naiaden en de geliefde en bruid van de Thracische zanger Orpheus. Het is niet zomaar dat deze hoge Aziat vernoemd wordt naar Eurydice. Elegante, diep fuchsiarode knikkende bloemen op tot 150 cm hoge stelen. Uit handen van de Tsjechische hybridiseur Vaclav Jost, die ons persoonlijk deze schoonheid adviseerde.

Bestelnr. 9971

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Lilium henryi

Intro: 1889. De Ierse botanicus en dendrograaf Augustine Henry (1857-1930) introduceerde deze zacht geurende species. Herkomst: Ichange gorge (West-Hubei) en Guihoe in Centraal-China. De in hun oorspronkelijke omgeving voorkomende planten worden vaak niet hoger dan 100 cm, terwijl de robuuste lelie in onze contreien wel twee keer zo hoog kan worden. De stevige bloemsteel is voorzien van purperen vlekken. De vele bloemen zijn oranje en verfraaid met bruine spikkels en papillen.

Bestelnr. 916

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Lilium lancifolium 'Flore Pleno'

2015


(Synoniem: *L. tigrinum* 'Flore Pleno')

De gevuldbloemige vorm van de bekende tijgerlelie. *L. lancifolium* komt o.a. voor in China, Korea en Japan. In de zomer verschijnen de licht knikkende, orangerode, hevig gespikkelde, geurloze bloemen. In de bladoksels ontstaan bulbillen, de stengels zijn opvallend grijsig behaard. Een sterke, makkelijk groeiende lelie.

Bestelnr. 6959

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Lilium 'Night Flyer'

Spectaculaire hoge tijgerlelie met grote, bijna zwartrode, geurloze bloemen. De bloemblaadjes zijn sierlijk teruggebogen. De twaalf tot twintig bloemen per steel vormen tezamen een luchtige bloemtros. Mooi voor verwildering.

Bestelnr. 6156

3 st. 4.50

5 st. 7.00



Lilium regale


(Synoniem: *L. myriophyllum*)

De koningslelie, één van de mooiste en tevens makkelijkst te kweken lelies. In 1903 werden ze door Ernest Henry Wilson voor het eerst aangetroffen in het westen van de Chinese provincie Szechuan. De door hem verzamelde bollen waren eerst bekend als *L. myriophyllum*, in 1912 werd de naam *L. regale* voor het eerst gebruikt. Minstens vijf trechtvormige, ietsjes gebogen tot horizontaal op de bloemsteel staande bloemen, aan de binnenzijde glanzend wit, de buitenzijde roze met een purperen gloed. Geurend.

Bestelnr. 9707

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Lilium tsingtauense




Bekend als de 'Twilight Lily', inheems in het oosten van China en Korea. De naam is afgeleid van de plaats: Tsingtao in China. De licht trompetvormige, oplichtend oranje bloemen (tot 15 in totaal) worden gedragen door een stevige stengel met kransgewijs geplaatst, glad, lancetvormig blad.

Bestelnr. 9489

p.st. 5.95

3 st. 16.50



HYBRIDEN VAN LILIUM MARTAGON EN MARTAGON-TYPE LELIES

De Turkse lelie komt voor in grote delen van Europa tot aan Azië. De lelies houden van een lichte humusrijke grond (kalk) met goede drainage. Probeer de wortelvoet in de schaduw (tussen beplanting in de border) te houden. Ten tijde van de bloei verspreiden de bloemen een 'wilde bloemengeur', gonst het van de hommels en bijen en zelfs vlinders genieten van de schoonheid. U ontvangt Nederlands gekweekte bollen.



Lilium martagon


Intro: 1596. Nederlandse naam: Turkse lelie. De bladeren die lancetvormig tot ovaal zijn, zijn in kransen geplaatst langs de forse 120-150 cm hoge bloemstengels. De knikkende paarse bloemen zijn op de kroonbladeren gemerkt met donkere vlekjes. Stinzenplant, heerlijk geurend. Extra grote bolmaat.



Bestelnr. 920

p.st. 4.95

3 st. 13.50



Lilium martagon var. album


De witte vorm wordt al sinds de 16e eeuw aangetroffen in tuinen en ontving in 1889 een First Class Certificate van de Royal Horticultural Society en een AGM in 1933. De statige plant met de stevige stelen showt zijn geurende, ivoorwitte bloemen, tot wel twintig per steel, in mei-juni. Opvallend mooie oranje meeldraden. Extra grote bolmaat.



Bestelnr. 9249

p.st. 6.95

3 st. 19.50



Lilium martagon var. albiflorum 2015


Mijn favoriet. Zachtroze in knop, aan de punt van de knop iets donkerder roze. Als de bloemen ontluiken, krullen de licht zachtroze bloemblaadjes sierlijk naar achteren en vormen het Turkse mutsje. Onregelmatig besprenkeld met maroen-rode spikkeltjes. Het geheel in de bekende luchtige bloemtros.



Bestelnr. 6960

3 st. 6.95

3 st. 19.50



Lilium 'Arabian Night'

(*L. martagon* 'Arabian Night')


Schitterende nazaat, al in 1999 geregistreerd, uit kruisingswerk verricht met o.a. *L. martagon*. Heerlijk geurende, vele knikkende bloemen, bordeaux-rood, vanuit het hart goud bespikkeld, in grote trossen. De stevige stelen bereiken een lengte van 100 cm.



Bestelnr. 9239

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Lilium 'Chameleon'


Een bijzondere hybride, wanneer de bloemen zich openen zijn zij zachtroze, enkele dagen later veranderen ze naar crèmekleurig. De mooi getekende bloemen zijn 5 cm groot en verschijnen, bij volle wasdom, met wel veertig stuks aan de stevige steel.



Bestelnr. 9708

3 st. 6.00

5 st. 9.50




Lilium 'Claude Shride'

Een krachtige cultivar met lange bloemtrossen. De typische martagon-bloemvorm is duidelijk herkenbaar. Diep maroonrode bloemen, aan de buitenzijde roze gekleurd.



Bestelnr. 8621

3 st. 6.00
5 st. 9.50



Lilium 'Gaybird'


©2015

Een vrolijke vogel enigszins vergelijkbaar met *L. 'Manitoba Morning'*, echter de bloemen zijn iets kleiner. Daarentegen is de totale plantopbouw forsere. De leverroze bloemen zijn voorzien van mahonierode spikkels omzoomd door goudgele markeringen.



Bestelnr. 9709

3 st. 6.00
5 st. 9.50




Lilium 'Orange Marmalade'

Oorspronkelijk in 1972 door E. Robinson geïntroduceerd onder de naam 'Tsinson', samengesteld uit de Latijnse namen van de ouders (dahlansoni en tsingtauense). Deze naam is echter niet acceptabel volgens de internationale code van ICNCP 2004, vandaar de nieuwe naam 'Orange Marmalade', door Eugene Fox in 1994 gegeven. Luchtige, slanke bloemtrossen met zacht oranje bloemen. De donkere bloemstelen contrasteren mooi met de talrijke bloemen waarvan de bloemblaadjes minder ver naar achter gebogen zijn.



Bestelnr. 9257

3 st. 6.00
5 st. 9.50



Lilium 'Peppergold'

2015


Kruidig goudgele tot oranje bloemen, met kaneelkleurige stippen. Een recentie selectie met een opvallende, afwijkende kleurstelling. De als Turkse muts gevormde bloemen vormen een forse luchtige bloemtros. Prettig geurend.



Bestelnr. 6961

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Lilium 'Pink Morning'


De schitterende, opvallende, zachtroze bloemen, besprenkelt met purperroze stipjes aan de krachtige stelen in de karakteristieke luchtige bloemtros maakt deze lelie een goede aanvulling op het groeiende assortiment Martagon-lelies.



Bestelnr. 9973

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Lilium 'Sunny Morning'


Warmgele bloemen waarop aan de binnenkant van de bloemblaadjes, veel paarsrode spikkels zichtbaar zijn. Op het uiteinde van het bloemblaadje zitten de spikkels dichter op elkaar en geeft dit dezelfde kleurindruk als die van de meeldraden, heel mooi! Eveneens van oorsprong uit de V.S.



Bestelnr. 9492

3 st. 6.00

5 st. 9.50



MORAEA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Moraea spathulata


(Synoniem: *M. spathacea*)

Een wintergroene plant die inheems is in Zuid-Afrika. De gele op iris lijkende bloemen verschijnen op stevige stelen die zich tussen het slanke opgaande blad ontwikkelen. Door de opeenvolgende bloei bloeit de plant weken achtereen. Met enig geduld, in de volle zon en in humusrijke grond vormt de *Moraea* een prachtige pol. Gedurende de groei voldoende water geven.

Bestelnr. 9711

p.st. 5.95

3 st. 16.50



MUSCARI

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Dit alom bekende geslacht kent enige synoniemen: *Botryanthus*, *Muscarimia* en *Pseudomuscari*. *Muscari* komt van het Latijnse: muscus (muskusachtig). Sommige species zijn omgeven door deze muskusgeur. Het geslacht *Muscari* bestaat uit een dertigtal species afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, Turkije tot de Kaukasus. Bekend onder de verzamelnaam blauwe druifjes. Echter niet alleen de diverse tinten blauw of blauwpaars, maar ook witte, sporadisch gele en zelfs roze kleuren worden aangetroffen.



Muscari armeniacum


Het bekende blauwe druifje. Intro: 1877. Herkomst: Roemenië, Klein-Azië en de Kaukasus. Het bloemtrosje is zeer compact. De vele kobaltblauwe klokvormige bloempjes zijn voorzien van een wit randje. De smalle bladeren zijn vaak langer dan de bloeiwijze.

Bestelnr. 937

25 st. 3.00

100 st. 11.50

250 st. 27.50



Biologisch geteeld:

Bestelnr. 6964 25 st. 4.50

Bolomvang: 6 100 st. 17.00

Muscari armeniacum 'Esther'

2015

Afgelopen voorjaar bood de Muscarikeuring van de K.A.V.B. een overvloed aan nieuwe cultivars *Muscari*. Esther viel mij direct op met de mooie porceleinblauw naar wit verkleurende bloemen.

Bestelnr. 6965

25 st. 3.50

100 st. 13.50




Muscari armeniacum 'Siberian Tiger'

In het jaar van registratie, 2005 werd deze nieuwkomer gewaardeerd met een Getuigschrift Proeftuin van de K.A.V.B. Aanvankelijk zijn de bloemen spierwit maar langzaam verschijnt er ten tijde van de bloei een zweem van violetblauw over de bloemen waardoor op afstand lijkt alsof zij viltig grijs zijn.

Bestelnr. 9712

10 st. 2.50

25 st. 6.00




Muscari aucheri 'Mount Hood'

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de geurende *M. aucheri* is niet geheel zeker, maar waarschijnlijk is dat Noord-Iran. 'Mount Hood' is in eind 2003 geregistreerd. Violetblauw bloemtrosje waarvan de bovenste bloemetjes in het bloemtrosje wit zijn. Zeer opvallend voor zowel in de border, verwildering, als in potten.

Bestelnr. 8175

10 st. 3.00

25 st. 7.00




Muscari aucheri 'Sky Blue'

(Synoniem: *M. species nova* 'Sky Blue')

In de jaren zeventig ontving Dr. Aldonis Verinsh in het wild verzamelde bollen van *M. pallens*. Er zat een enorme variatie in de bloei, in eerste instantie gezien als variëteiten van *M. pallens*. Dit bleek niet juist te zijn. Waarschijnlijk waren het hybriden ontstaan uit *M. pallens* en *M. neglectum*, die naast elkaar, wel onder verschillende groeiomstandigheden, in het wild voorkomen. Het aanbod betreft één van deze selecties. Licht hemelsblauwe bloemen met witte topjes.

Bestelnr. 8599

25 st. 3.50
100 st. 13.50




Muscari aucheri 'White Magic'

Een van de introducties van Kwekersvereniging Muscari Blue Magic. Maar nu munt de selectie uit in het bloeitijdstip, een vroege zuiver witte druif. Zeer geschikt voor potcultuur.

Bestelnr. 960

10 st. 3.00
25 st. 7.00




Muscari azureum

(Synoniemen: *Bellevalia azurea*, *Hyacinthella azurea*, *Hyacinthus azureus* en *Pseudomuscari azureum*)

Intro: 1859. Herkomst: Oost-Turkije. De slechts twee tot drie grijsgroene bladeren omsluiten aan de voet het tot 15 cm hoge plantje. Het bloemtrosje kan wel tot 60, nauwelijks vijf millimeter grote klokvormige en dicht op één zittende bloemetjes bevatten. De hemelsblauwe (azureus) bloempjes hebben een donker streepje op elk bloembladje. De uiteinden van de kelkbladen zijn niet samengetrokken. Prima soortje voor verwilderding.

Bestelnr. 940

25 st. 3.50
100 st. 13.50



Muscari azureum 'Album'


(Synoniemen: *Hyacinthella azurea* 'Alba' en *Hyacinthus azureus* 'Albus')

Intro: 1939 (J. Bijl van Duyvenbode). Een zuiver witte vorm uit *M. azureum*. Het is net alsof er een groene waas over de bloempjes ligt. Relatief weinig blad, twee tot drie grijsgroene blaadjes omsluiten het bloemsteeltje. Bloeit prettig vroeg.

Bestelnr. 942

10 st. 3.50

25 st. 8.00




Muscari 'Baby Breath'

Geïntroduceerd door Jenny Robinson, uit Cyprus. In 2004 geregistreerd als een selectie van *M. neglectum*. De zeer licht ijsblauwe bloempjes verschijnen uit een limegroene bloemknop, een werkelijk prachtige kleurencombinatie. Heerlijk geurend.

Bestelnr. 8177

25 st. 3.50

100 st. 13.50




Muscari 'Bling Bling'

Glanzende violetblauwe bloemen in dichte, stevige rechte bloemtrossen. Lang bloeiend en een goed vaasleven. Geregistreerd in juli 2013, 'Bling Bling' ontving in 2011 een getuigschrift op de proeftuin van de K.A.V.B.

Bestelnr. 9974

25 st. 3.50

100 st. 13.50




Muscari botryoides 'Album'

Intro: 1596. Het is een witte mutant uit *M. botryoides*. De bladeren zijn opmerkelijk korter dan de nagenoeg rechthoekige bloeiwijze. Herkomst: Zuid-Europa en de Balkan, ook bekend als: 'Pearls of Spain'.

Bestelnr. 946

10 st. 2.50
25 st. 6.00




Muscari botryoides 'Superstar'

Muscari botryoides is de enige echte blauwe druifhyacint die nog sporadisch, verwilderd, in Nederland voorkomt (stinzenplant). We bieden de selectie 'Superstar' aan, een in 1997 geregistreerde cultivar met korenblouwe bloemen. Elk bloemetje is afgebiesd met een ivoorkleurig wit randje.

Bestelnr. 8601

25 st. 4.00
100 st. 15.00




Muscari comosum

Intro: 1596. Herkomst: Noord-Afrika, Frankrijk, Midden-Europa, het zuiden van Rusland en zuidwesten van Azië. Nederlandse naam: kuifhyacint. Verspreid voorkomend in onze duinen. Het onderste gedeelte van de bloem bestaat uit olijfgroene bloempjes op korte steeltjes die fertiel (vruchtbaar) zijn en de bovenste steriele (onvruchtbare) lang gesteelde lokbloemetjes zijn zacht violet. Het verhaal wil dat de plant in Nederland zou zijn ingevoerd met fazantenvoer. De bloeiwijze is curieus.

Bestelnr. 948

10 st. 3.00
25 st. 7.00




Muscari discolor

Aangetroffen in de omgeving van Konya, Turkije. Spraakmakende dwergspeciees waarbij de fertiele bloemen opvallend tweekleurig zijn. Diep zwartblauw aan de basis en bijna wit aan de top. De steriele bloemen zijn licht- tot violetblauw. De bloemtros is in verhouding groot. De tot vier slanke blaadjes liggen gedraaid op de grond.



Bestelnr. 9975

p.st. 4.95
3 st. 14.25




Muscari latifolium

Intro: 1858. Herkomst: West- en Zuid-Turkije. De sterk ontwikkelde topbloemen zijn lichtblauw, het onderste gedeelte van de bloeiwijze bestaat uit donkerblauwe steriele bloemetjes. Gewoonlijk heeft de plant slechts één breed blad (latifolius). Goed voor verwildering.



Bestelnr. 954

25 st. 3.00
100 st. 11.50




Muscari macrocarpum 'Golden Fragrance'

M. macrocarpum is inheems in Griekenland, op de Cycladen en in West-Turkije. Het aanbod betreft een selectie van *M. macrocarpum*. Het bloemtrosje bestaat uit zuivergele bloemen, de bloemetjes in het topje van de bloemtros zijn violet gekleurd. Zoals de naam al doet vermoeden, heerlijk zoetgeurende bloemen.



Bestelnr. 6159

5 st. 3.50
10 st. 6.50




Muscari muscarimi

(Synoniemen: *M. ambrosiacum*,
M. moschatum en *Muscarimia muscari*)

Intro: 1554, al lang in cultuur vanwege de muscusgeur. Herkomst: het zuidwesten van Turkije. Het bovenste gedeelte bestaat uit slechts enkele paarze onvruchtbare bloemetjes. Het overige gedeelte is zachtgeel met een amberkleurig bloemrandje.

Bestelnr. 962 **10 st. 4.95**
25 st. 12.00




Muscari neglectum

(Synoniemen: *M. atlanticum*, *M. compactum*,
M. elwesii, *M. leucostomum*, *M. mordoanum* en
M. racemosum)

Intro: 1568. Herkomst: België (Maasvallei), Frankrijk, Duitsland, Noord-Afrika en het zuidwesten van Azië. De drie tot zes lichtgroene bladeren zijn smal en kunnen een lengte bereiken van 30 cm. De bloemkleur is bijna zwart (zeer donkerblauw) met aan het einde van de bloembuis een smal helderwit randje. De steriele bloemetjes aan de top van de bloemtros zijn blauw.

Bestelnr. 964 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00




Muscari parviflorum



Dit is het enige blauwe druifje dat in de herfst bloeit. Behorende tot de pseudomuscari-groep. Inheems in het Mediterrane gebied, van Spanje tot Turkije. Intro in 1798. De los ogende tien cm lange bloemtros bestaat uit een twintigtal lichtblauwe belvormige bloemen, 3-4 mm groot. Planten op een beschutte standplaats.


Bestelnr. 970 **p.st. 3.95**
3 st. 11.25



Muscari 'Peppermint'

Geselecteerd door M. Filippo. Behoort tot de *M. armeniacum*, gezien de uiterlijke kenmerken en groeiwijze. Smal langwerpige bladen liggen vlak op de grond. Zachtblauwe bloemen, waarvan het topje verbloeit naar zilverwit in 8 cm grote trossen. 'Peppermint' verwildert goed en blijft jarenlang betrouwbaar bloeien.


Bestelnr. 972 25 st. 3.50
 100 st. 13.50



Muscari 'Pink Sunrise'

Geregistreerd in 2011. Een zaailing van *M. 'White Rose Beauty'*, door Augis Dambrauskas geselecteerd. Een prachtig zachtroze, langbloeiend en geurend druifje. De kleur is intenser wanneer het koeler weer is. De dichte cilindervormige bloemtros is tot 3 cm lang. De vier tot zes bladeren, tot 16 cm lang, zijn midden grijsgroen. Ook prima voor verwildering en goed te combineren met andere voorjaarsbloeiende bolgewasjes.

Bestelnr. 9494 5 st. 4.00
 10 st. 7.50




Muscari tenuiflorum



Wordt ten noorden van Refahiye in Turkije aangetroffen op rotsige hellingen. De tot 70 cm hoge bloemsteel draagt een langgerekte bloemtros waarvan de steriele bloemen zacht lila tot rozelila zijn en lange bloemsteeltjes hebben. De aan korte bloemsteeltjes zittende fertiele bloemen, zijn diepblauw.

Bestelnr. 9265 5 st. 4.00
 10 st. 7.50



Het verspreidingsgebied is groot, namelijk: Zuid-, Midden- en West-Europa, Noord-Afrika, China, Japan en pleksgewijs in het zuidwesten van Azië. Het overgrote deel echter treffen we aan in Spanje en Portugal. De naam 'Narcis' is afgeleid van het Griekse werkwoord 'narkao', dat verdoven betekent. De geur van narcissen werd vroeger namelijk als verdovend of slaapverwekkend beschouwd. Het aanbod is ontstaan uit een kleurig samenspel van wildvormen, moderne- en historische rassen. Met name de oude rassen geuren en verwilderen goed, dat hebben ze immers bewezen. Vooral bij de moderne rassen zijn de bloemen beter kleurvast en hebben zij een perfectere vorm.



Narcissus 'Albus Plenus Odoratus'


Intro: 1590. Division 4. Reeds in 1590 ontving Carolus Clusius de eerste bolletjes van deze zachtgeurende narcis. Door de jaren heen heeft ze nogal wat bijnamen gekregen, een mooi voorbeeld: "The Large Gardenia Flowered Double White Daffodil". De bloemkleur: gevuldbloemig wit, de gele meeldraden en helmknoppen worden zichtbaar als de bloemen rijpen. Ook voor verwildering. Niet altijd even betrouwbaar bloeiend.



Bestelnr. 1490

5 st. 4.75

10 st. 9.00



Narcissus asturiensis

(Synoniem: *N. minimus*)


Division 13. Inheems op de bergweiden van Spanje en Noord-Portugal. De perfecte miniatuur van de trompetnarcis. Zowel de dekblaadjes als het trompetje zijn goudgeel, waarbij de rand van het trompetje meestal is geplooid. Vroeg bloeiend, ideaal voor de rotstuijn.



Bestelnr. 9976

p.st. 4.95

3 st. 13.50



Narcissus 'Audubon'

2015


Division 2 maar zal gedurende de bloei overgaan in division 3. Grant E. Mitsch 1965. De sneeuw-witte bloemen omsluiten een ondiep, aanvanke-lijk zacht citroengeel cupje met een roze rand. Bij het rijper worden, vervaagd het geel in de bloem.



Bestelnr. 6966

5 st. 4.75

10 st. 9.00



Narcissus 'Beryl'

2015


Intro: voor 1907. Division 6. (P.D. Williams). Deze cyclamineus is waarschijnlijk ontstaan uit een spontane kruising met een poeti-cus-narcis. De vele bloempjes lijken als lantaarn-tjes aan de bloemsteel te bengelen. De gele bloemblaadjes zijn sterk achterwaarts gebogen zodat de bijna oranje cup (donkerder oranje naar de bloemrand) getoond wordt.



Bestelnr. 1616

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium -selectie-


Intro: 1629. Division 10. Nederlandse naam: hoepelroknarcisje. Herkomst: Algerije, Marokko, Spanje, Portugal en het zuidwesten van Frankrijk. Het aanbod bestaat uit een selectie die veel beter en rijker bloeit dan de soort en waarbij er meerdere bloemstelen (tot wel 7) per bol verschij-nen. Graag een zonnig plekje en een niet te droge grond.



Bestelnr. 9267

10 st. 3.50

25 st. 8.00




Narcissus 'Canary Bird'

Een Nederlandse introductie van voor 1913. Division 8. Meerbloemige Tazetta-narcis met ronde heerlijk geurende donker citroengele bloemen met een oranje cupje.

Bestelnr. 9714

10 st. 4.50
25 st. 10.50




Narcissus cantabricus

Division 13. Een variabele species oorspronkelijk voorkomend in Zuid-Spanje, de Balearen en Noord-Afrika. De subspecies verschillen met name door het aantal grasachtige bladeren en de bladgrootte van elkaar. Op een hoepelrokje gelijkende glazig witte bloemen op korte steeltjes, 10-15 cm. Vaak al bloeiend in januari-februari.

Bestelnr. 8181

3 st. 4.95
5 st. 7.50




Narcissus 'Centannees'

Intro: 1984. Division 11. Heerlijk geurende opvallende spleetkronige narcis. De grote gespleten echt oranje kroon bedekt bijna in z'n geheel de goudgele kroonbladeren. Goed houdbare snijbloem.

Bestelnr. 8183

5 st. 4.50
10 st. 8.50



Narcissus 'Changing Colours'


2015

Division 11. Een Nederlandse spleetkronen narcis, J. Gerritsen & Zn 1993. Zoals de naam doet vermoeden, een narcis waarbij meerdere kleurstadia getoond worden ten tijde van de bloei. De bloemen openen zachtgeel, verbloeien naar wit en eindigen abrikoosroze, waarbij de kroonbladen wit blijven.

Bestelnr. 6967

5 st. 4.00

10 st. 7.50




Narcissus 'Cherry Spot'

Intro: 1975. Division 3. Grant E. Mitsch, ontstaan uit *N. 'Artillery'* x *N. 'Avenger'*. Zeer opvallende levendig orangerode cup, mooi contrasterend met de witte kroonbladeren die bij het ontluiken een crèmegele band rond de basis tonen.

Bestelnr. 8605

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Narcissus 'Daphne'

(Synoniem *N. 'Spalding Queenie'*)

Intro: voor 1914. Division 4. De dubbele dichtersnarcis, een selectie uit zaailingen van *N. poeticus 'Ornatus'*. Heerlijk geurende mooi gevormde dubbele witte bloemen.

Bestelnr. 1620

3 st. 4.95


5 st. 8.00



Narcissus 'Derringer'

Division 7. Uit handen van Brent C. Heath, 2003. De heerlijke geur van *Narcissus jonquilla*, één der kruisingsouders, is zeer herkenbaar. De zachtoranje cup wordt omsloten door zachtgele bloemblaadjes die aan de rand lichter van kleur zijn.


Bestelnr. 9717	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus 'Dutch Lemon Drops'

Intro: 2007. Division 5. Voorheen aangeboden als *N. 'Lemon Drops'*. Meerdere knikkende bloemen aan een 20-25 cm lange bloemsteel. De kroonblaadjes zijn wit en het cupje is citroengeel.

Bestelnr. 1519	5 st.	4.00
	10 st.	7.50



Narcissus 'Dutch Master'

2015

Division 1, intro voor 1938. Een klassieke trompetnarcis die vele onderscheidingen heeft mogen ontvangen. De kroonbladeren zijn helder groengeel en de trompet is levendig geel. Prima voor verwilderding. Biologisch geteeld.

Bestelnr. 1642	10 st.	7.00
	25 st.	16.50



Narcissus 'Eaton Song'

2015


Division 12. Intro 1989. Een opvallende en vrolijke narcis, meestal drie bloemen per steel, meerdere stelen per bol. Aanvankelijk ontluiken de bloemen zwavelgeel, gedurende de bloei worden de bloemen bijna wit. Het cupje van het iets knikkende bloempje kleurt van oranjegeel naar helderoranje.

Bestelnr. 6968

10 st. 3.50

25 st. 8.00

100 st. 30.00



Narcissus 'Elka'

Division 1. Terecht in 2011 een Award of Garden Merit ontvangen. Een miniatuur trompetnarcis die in knopstadium een zachtgele trompet toont, maar bij volle wasdom van de bloem uiteindelijk zuiver wit is. In 1989 door Alec Gray, Engeland, geïntroduceerd. Mooi voor verwildering.

Bestelnr. 9718

10 st. 3.50

25 st. 8.00




Narcissus 'Emcys'

Intro: 2002. Division 6. Door de heer Jan de Winter geselecteerd uit zaailingen van *N. 'Jenny'*. Een gezonde witte cyclamineus, de kroonbladeren wijzen strak naar achteren, het langwerpige cupje is wit. De naam is ontstaan uit: Een Mooie CYclamineus Selectie. Vroegbloeiend. Betoverend mooi in combinatie met bontbladige Brunnera.

Bestelnr. 8191

5 st. 4.00

10 st. 7.50




Narcissus 'February Gold'

Division 6. Al een oudje, van voor 1923 maar nog steeds een heel betrouwbare gele cyclamineus die zeer geschikt is voor verwildering. Een Nederlandse hybride, van de Graaff Bros.

De levendig gele bloemen kunnen al vanaf februari verschijnen.

Bestelnr. 9719	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00




Narcissus 'Golden Echo'

2015

Intro: 2002 door Brent Heath. Division 7. Een heerlijk geurende Jonquilla narcis met een trompetvormige bloem in een bijzonder mooie heldere witgele kleur. Zeer rijkbloeiend. Dit voorjaar stonden in de Keukenhof duizenden van deze narcis geplant in lange banen in het gras. Wekenlang hebben zij daar uitbundig staan bloeien.

Bestelnr. 1574	10 st.	4.50
	25 st.	10.00




Narcissus 'Hawera'

Intro: 1928. Division 5.

Door Dr. William M. Thomson in Nieuw-Zeeland gewonnen met als kruisingsouders *N. jonquilla* en *N. triandrus*. Gewoonlijk meerdere, zes tot acht, knikkende citroengele bloemetjes aan een 25 cm hoog bloemsteeltje. Het blad is smal, enigszins grasachtig. Heerlijk geurend. Hawera heeft al vele prijzen gewonnen zoals een Award of Merit in 1938 en een AGM, Award of Garden Merit in 1995.

Bestelnr. 8193	25 st.	4.00
	100 st.	15.00



Narcissus hedraeanthus

(Synoniem: o.a. *N. bulbocodium* subsp. *hedraeanthus*)


Division 13. Zeldzame species uit Zuidoost-Spanje, voornamelijk voorkomend in de Sierra de Cazorla op stenig terrein boven 1500 meter. Opvallend vanwege het zwavelgele opstaande bloempje waarbij de meeldraden uitsteken, en opvallend door het gebogen bloemsteelkje.



Bestelnr. 6162

p.st. 4.50

3 st. 12.75



Narcissus 'Irene Copeland'

Division 4. Een historische narcis van voor 1915 door William F.M. Copeland op de wereld gezet, vernoemd naar zijn dochter. Sneeuw wit en sprankelend groengeel zijn de kleuren die de perfect gevulde bloem omschrijven.



Bestelnr. 8689

3 st. 3.75

5 st. 6.00



Narcissus jonquilla

Division 13, section Jonquilla. Herkomst: Zuid-Spanje. Heerlijk zoetgeurende wildvorm voor een zonnige standplaats. Elk 20 cm hoog stengel-tje geeft twee tot zes helder diepgele bloemen met een klein cupje. Het cilindervormige blad is donkergroen van kleur.



Bestelnr. 1576

25 st. 4.95


100 st. 18.00



Narcissus jonquilla var. henriquesii

Division 13, section Jonquilla. Een jonquille die veelvuldig werd gebruikt als kruisingsouder. Nu wat in de vergetelheid geraakt, maar het blijft één van de fraaiste wildvormen. Zeer rijke bloei, per bol verschijnen er meerdere (zes-acht) bloemstelen waaraan per steel drie tot vijf heerlijk geurende goudge bloempjes ontluiken.


Bestelnr. 1511	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	25.00



Narcissus 'Julia Jane'

Intro: 1966. Division 10. Een goed groeiende vorm van *N. romieuxii* subsp. *romieuxii* met mooie zachtgele buitenwaarts bollende bloempjes. Geselecteerd door J.C. Archibald in 1966 uit een wildcollectie van Marokkaanse origine.


Bestelnr. 1496	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Narcissus 'Kaydee'

Intro: 1984. Division 6. Gewonnen door Brian S. Duncan, Rathowen Daffodils, uit de kruisingsouders: *N. 'Foundling'* x *N. 'Delta Wings'*. Kaydee is een gezond en rijkbloeiend narcisje met een verrassend frisse kleur, de sterk naar achter gebogen witte bloemblaadjes omsluiten een licht geribd zalmroze cupje.

Bestelnr. 1578	5 st.	3.50
	10 st.	6.50




Narcissus 'Keats'

Intro: 1952. Division 4. Vernoemd naar Keats, John K. (1795-1821), een vooraanstaand Engelse dichter. Geselecteerd door Alec Gray, Engeland. Gewoonlijk één bloem per steel, de kroonbladen zijn zuiver wit, het cupje is crèmewit met een groen randje. De uitstekende meeldraden zijn kunstig gevormd, als molenwieken. Deze licht geurende narcis bloeit laat, vanaf eind mei.

Bestelnr. 8195

3 st. 4.95

5 st. 7.50




Narcissus 'Laurens Koster'

Intro: voor 1906. Division 8. (A. Vis). Naar 'onze' Haarlemse uitvinder van de boekdrukkunst werd deze een eeuw geleden tot de groep tazetta behorende narcis genoemd. Een nakomeling van *N. 'Ornatus'* x *N. tazetta*. Een werkelijk heerlijk ruikende narcis met een botergeel cupje omsloten door witte bloemblaadjes.

Bestelnr. 1600

10 st. 3.50

25 st. 8.25



Narcissus 'Lemon Silk'

Division 6. Uit Amerika afkomstig, met als ouders *N. 'Nazareth'* x *N. cyclamineus*. Een schoonheid die zelden wordt aangeboden. De bloemblaadjes zijn zacht citroengeel, wit aan de basis, los staand en licht naar achter buigend. Het cilindervormige cupje is wit, licht geribbeld.

Bestelnr. 9722

3 st. 4.95


5 st. 7.50



Narcissus 'Lieke'

Intro: 2009. Division 7. Een heerlijk geurende witte jonquilla, met meerdere bloemen per bloemsteel, krachtig groeiend. Het hart van het gele cupje is groen. Een zaailing van Brent and Becky Heath, vernoemd naar de dochter van de kweker Gerrit Preijde, die een deel van hun zaailingen test en teelt.


Bestelnr. 9496	10 st.	3.50
	25 st.	8.25
	100 st.	30.00



Narcissus 'Little Gem'

Intro: voor 1938. Division 1. Een klein geel trompetnarcisje voor verwildering, vroeg bloeiend. Een historisch narcisje voor een natuurlijk effect, wat eenvoudig bereikt kan worden door de bollen uit te strooien. Waar zij vallen, worden ze geplant.


Bestelnr. 6163	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	25.00



Narcissus 'Lucifer'

Intro: voor 1890. Division 2. Een klassieker, in 1898 bekroond met een Award of Merit en in 1901 een FCC. Losjes ogende crèmekleurige bloemblaadjes omvatten het slanke cupje dat naarmate de bloem rijpt, van oranje naar geel kleurt. Het verkleuren van de bloem ten tijde van de bloei is een eigenschap van oude narcissenrassen.

Bestelnr. 9275	5 st.	4.95
	10 st.	9.50
	25 st.	22.50




Narcissus 'Manly'

Intro: 1972. Division 4. J. Lionel Richardson. Een perfect gevormde dubbele groengele narcis met in het hart korte oranje bloemblaadjes. Award of Merit in 1986, AGM in 2002. Lang bloeiend.

Bestelnr. 8609

5 st. 4.00

10 st. 7.50



Narcissus moschatus

(Synoniem: *N. pseudonarcissus* subsp. *moschatus*)

Intro: rond 1700. Division 13. Een paar mooie bijnamen: 'Silver Trumpet', 'The Drooping White Spanish Daffodil' en 'The Swan's Neck Daffodil'. Moschatus betekent: naar muskus riekend. Dit narcisje is al meer dan 300 jaar in cultuur. De oorspronkelijke vindplaats is niet bekend, mogelijk daar uitgestorven. Gracieus hangende witte bloemen op 30 cm hoge steeltjes.

Bestelnr. 1584

3 st. 3.75

5 st. 6.00




Narcissus 'Mother Duck'

Division 6. Een Amerikaanse selectie die in 1998 is geregistreerd. De zachtgele bloemblaadjes zijn donkergeel omrand. De sterk naar voren wijzende cup is goudgeel. Als een moedereend zitten de hogere bloemen boven de kortere bloemen, een geweldig gevonden naam voor deze rijk bloeiende narcis.

Bestelnr. 9981

10 st. 3.50

25 st. 8.00



Narcissus 'Mrs. Langtry'

Intro: voor 1869. Division 3. Vernoemd naar de actrice Lily Langtry en tevens geliefde van King Edward VII. Een historische narcis met ongekende schoonheid, melkwitte slanke, iets gedraaide kroonblaadjes omvatten het kanariegele cupje. De knikkende bloemen geven de narcis een natuurlijke uitstraling.


Bestelnr. 9279	5 st.	4.95
	10 st.	9.50
	25 st.	22.50



Narcissus x odorus

Intro: 1601. Division 13. Een spontane in de natuur ontstane kruising tussen *N. jonquilla* en *N. pseudonarcissus*. Ze worden in grote delen in het westelijke gedeelte van Zuid-Europa aangetroffen. De 30-40 cm hoge bloemsteel draagt twee, soms drie of zelfs vier heerlijk geurende (odorus) heldergele bloemen. In de volksmond alsook bij oudere kwekers, worden deze narcissen ook wel Campernellen genoemd. Bijzonder geschikt voor verwildering.


Bestelnr. 1521	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus x odorus 'Plenus'

Intro: 1601. Division 4. De gevuldbloemige vorm van *N. odorus*. Dubbele Campernellen. De heerlijk geurende gele bloemen lijken net roosjes. Bijzonder geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 1523	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	26.00




Narcissus 'Petrel'

Intro: 1970. Division 5. Door G.E. Mitsch 1970 (Grant Mitsch Novelty Daffodils, Canby, Oregon, U.S.A.). Een Triandrus-type, met gewoonlijk twee of meer hangende bloempjes per steel. De kroonblaadjes zijn teruggeslagen. Een roomwitte, meerbloemige en zeer rijk bloeiende beauty. Lange bloeitijd en heerlijk geurend.

Bestelnr. 1590

10 st. 4.95

25 st. 12.00



Narcissus poeticus var. recurvus

(Syn.: N. 'Jean(n)ette Blanche' en N. 'Pheasant's Eye')

Intro: voor 1600. Division 13. Bekend onder de namen: fazanten- of pauwenoog narcis.

Als bijna alle narcissen zijn uitgebloeid, ontluiken de heerlijk geurende bloemen van deze schoonheid. De helderwitte licht achterwaarts gebogen bloemblaadjes omgeven een groen cupje met daar op een gele stip voorzien van een fel rood randje. Is niet moeilijk maar bloeit het ene jaar spontaner dan het andere jaar. Geeft een voorkeur aan een niet te droge standplaats.

Bestelnr. 1525

10 st. 4.75

25 st. 11.50

100 st. 42.50



Biologisch geteeld:

Bestelnr. 6969 10 st. 6.50

Bolomvang: 12 25 st. 15.75

Narcissus 'Princeps'

(Synoniemen: N. 'Irish Princeps', N. 'Princeps Grand Trumpeter', N. 'Principe Umberto Primo')


Intro: voor 1830. Division 1. N. 'Princeps' is een wilde narcis die vroeger in Drenthe voorkwam. Het zaad is zeer vruchtbaar, na enige jaren groeien er rondom de narcis allemaal zaailingen. Ten tijde van de bloei is te zien hoe variabel die is, als de eerste bloemen zijn uitgebloeid, zijn er nog andere die moeten ontluiken. De crèmewitte kroonbladeren, die elkaar niet raken, omvatten een warmgele trompet.

Bestelnr. 8201

5 st. 4.95

10 st. 9.50

25 st. 22.50



Narcissus 'Regeneration'

Intro: 1995. Division 7. Een Amerikaanse hybride met als ouders: *N. 'Hillstar'* x *N. 'Quick Step'*.


De geurende bloemen openen zich scherp citroengeel, de cup is crèmewit. Rondom het cupje zijn de bloemblaadjes aan de basis ook crèmewit. Drie tot vijf bloemen per steel.



Bestelnr. 9726

10 st. 4.00

25 st. 9.50



Narcissus 'Rip van Winkle'

Intro: voor 1884. Division 4. Een historische narcis afkomstig uit Ierland. Zowel de kelkblaadjes als ook het trompetje van dit gevuldbloemige goudgele narcisje zijn verdeeld in smalle stukjes. Net een cactusdahlia. De bloei vangt groengeel aan en is vroeg, begin maart. Is ook leuk om in een pot te gebruiken.




Bestelnr. 1634

10 st. 3.50

25 st. 8.00

100 st. 30.00



Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation'

Intro: 1946. Division 1. De allervroegste gele trompetnarcis voor verwildering. De laatste jaren gebeurt het wel dat de Zandvoortselaan, de verbindingsweg tussen Zandvoort en Heemstede, al vanaf december geel kleurt. De bloei houdt bijna de hele winter aan, alleen tijdens sneeuw of strenge vorst staat deze stil. Uiteindelijk volgt er in maart nog een toegift. Award of Merit in 1984 en een AGM in 1993.




Bestelnr. 9281

10 st. 3.50

25 st. 8.00


100 st. 30.00



Narcissus 'Sea Princess'

Division 3. Een kleinkronige, zacht geurende Engelse narcis uit 1984, van Mrs. J. Abel Smith. Perfect gevormde, aankijkende bloemen met in hun hart een subtiel groenbeige cupje, voorzien van een donker oogje.


Bestelnr. 8819	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus 'Segovia'

Intro: 1962. Division 3. De dekbladeren, die elkaar voor een derde overlappen zijn wit. De cup is aan het uiteinde ribbelig en voorzien van een groengele kleur. Uniek, een heel leuk dwergnarcisje.

Bestelnr. 1545	10 st.	3.95
	25 st.	9.50




Narcissus 'Snowball'

(Synoniem: N. 'Shirley Temple')

Intro: voor 1937. Division 4. Een Nederlands product, G.A. Uit den Bogaard, dat in de decennia na zijn introductie zorgde voor een sneeuwbal-effect aan awards. Terecht, de ivoorwitte kroonbladeren buigen sierlijk naar achteren en het hart is vergroeid tot een balvorm van bloemblaadjes. Heerlijk geurend.


Bestelnr. 6166	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Narcissus 'Spoirot'

Intro: voor 1998. Division 10. Een ivoorwit hoepelroknarcisje. De vorm van de kleine bloemen lijkt op een hoepelrokje. Vernoemd naar Hercule Poirot. H. Poirot is een fictieve Belgische detective en speelde de hoofdrol in een boekenreeks van Agatha Christie. Het vroegbloeiende miniatuurtje heeft zijn oorsprong in Australië en is ontstaan uit *N. bulbocodium subsp. bulbocodium var. conspicuus* x *N. cantabricus subsp. cantabricus var. foliosus*.


Bestelnr. 9503 5 st. 3.25
 10 st. 6.00



Narcissus 'Stainless'

Intro: 1960. Division 2. Uit handen van Guy L. Wilson, Noord-Ierland. De ultieme perfectie, smetteloos zuiver witte bloemen met een plat cupje. Fantastisch is het groene hartje. Wellicht de mooiste narcis in zijn klasse.


Bestelnr. 9287 5 st. 4.00
 10 st. 7.50



Narcissus 'Sugar Baby Love'

Intro: 2014. Division 2. Een grootkronige narcis waarvan de cup intens roze met een blauwige gloed is, prachtig in combinatie met de helderwitte kroonbladeren. Een unieke zaailing, met stevig grijsgroen loof. Het aanbod hebben we te danken aan Gerrit Preijde.

Bestelnr. 6167 5 st. 3.50
 10 st. 6.50
 25 st. 15.75



Narcissus 'Telamonius Plenus'

2015

(Synoniem: o.a. N. 'Van Sion')

Division 4. Een historische gevuldbloemige narcis van voor 1620 die beter bekend is onder het synoniem *Narcissus 'Van Sion'*. Zowel Parkinson als George Wilmer ontvingen in 1620 de bollen, echter Wilmer bracht de narcis als 'Wilmer's Double Daffodil' in omloop. Verwarring en irritatie alom. Goudgele onregelmatig gevulde bloemen. Prima voor verwildering.

Bestelnr. 6971 5 st. 3.50
 10 st. 6.50

40 3-4 10 15-20 1. 1



Narcissus 'Tête-à-Tête'

Al voor 1949 werd dit narcisje door de Engelsman Alec Gray aangetroffen. Division 12. De overbekende 'Tête-à-Tête' die bij iedereen wel eens in een potje op de venstebank heeft gestaan en die meer dan de helft van het opgeplante arenaal narcissen voor zijn rekening neemt. Leuk en prima voor verwildering. Biologisch geteeld.

Bestelnr. 9372 10 st. 3.00
 25 st. 7.00

20 3-4 10 12-15 12 1



Narcissus 'Thalia'

Intro: voor 1916. Division 5. De zuiver witte ietwat naar achter gebogen kelkblaadjes vormen een ster. De eveneens zuiver witte cup, aan het uiteinde gegolfd, heeft de vorm van een drinkbeker. Drie tot vier bloemen per steel is normaal. Thalia wordt veelal toegepast in verwilderingsborders.

Bestelnr. 1553 10 st. 3.50
 25 st. 8.00
 100 st. 30.00

30 4 10 12-15 14 1




Narcissus 'Topolino'

Intro: 1965. Division 1. Een leuke narcis voor verwildering. Lijkt enigszins op *N. pseudonarcissus subsp. lobularis*. Door J. Gerritsen & Zoon op de wereld gezet. De kroonbladeren zijn bij het ontluiken crèmekleurig en verbloeien naar bijna wit. Het cilindervormige trompetje is levendig geel. Vroeg bloeiend, vanaf begin maart.

Bestelnr. 8209

10 st.	2.75
25 st.	6.50
100 st.	25.00




Narcissus 'Toto'

Intro: 1983. Division 12. Ook dit narcisje is afkomstig uit de handen van W.G. Pannill. Op slechts 20 cm hoge steeltjes staan één tot drie zuiver witte bloemen met, bij het ontluiken een zachtgeel cupje, dat later verkleurt naar het crèmewit. In alle stadia een prachtige bloem. Een zacht geurende elegante narcis, die ook zeer geschikt is voor verwildering. Bezit alle kwaliteiten van de bekende *N. 'Tête-à-Tête'*, maar dan in het wit.

Bestelnr. 1596

10 st.	4.95
25 st.	12.00




Narcissus 'Tresamble'

2015

Intro voor 1930 P.D. Williams. Division 5. Een historische narcis met een luchtige, elegante groeiwijze. De twee tot drie ivoorwitte bloemen per steel doen denken aan *N. 'Thalia'* maar de bloei is wat later en de plant is wat lager. Prima voor verwildering.

Bestelnr. 6970


10 st.	3.50
25 st.	8.00



Narcissus 'Velocity'

Intro: 1995. Division 6. Door de sterk naar achter gebogen goudgele bloemblaadjes toont dit narcisje de indruk haast te hebben. Velocity, de naam, is snelheid, beweging in een dimensie, geeft dit aardig weer. Daarbij de vurige kleurencombinatie, goudgeel met een oranje rode cup, maakt dit een goede aanvulling op het assortiment die bovenal veel gezonder is dan de andere narcissen uit deze division in dezelfde klearsamenstelling.

Bestelnr. 9985 **10 st. 3.75**
25 st. 9.00




Narcissus watieri

(Synoniem: *N. rupicola* var. *watieri*)

Intro: 1931. Division 13. Een prachtig wildvormpje uit Marokko, het Atlas-gebergte. Meestal voorkomend in bosrijk gebied op 1800 tot 2600 meter hoogte. Zowel de zes kroonblaadjes als het platte cupje zijn wit. Het geheel wordt niet veel hoger dan 10-12 cm.

Bestelnr. 8211 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75




Narcissus 'Waxwing'

©2015

Division 1. Van voor 1910 uit Engelse handen: P.D. Williams. De zuiverwitte wasachtige grote bloemen combineren mooi bij het stevige, brede grijsblauwe loof. Een opvallende narcis die op grote afstand de aandacht trekt.

Bestelnr. 6977 **3 st. 6.00**
5 st. 9.50





Narcissus viridiflora IV

Bestelnr. 6974

p.st.	7.95
3 st.	21.75

NARCISSUS VIRIDIFLORA 2015

N. viridiflora is een herfstbloeiende species, die na een warme zomer door een regenbui tot bloei wordt aangezet. Inheems in het zuidelijkste puntje van Spanje, Gibraltar en deels langs de kustlijn van Marokko. In Nederland niet winterhard, maar als potplant in bijvoorbeeld een kasje prima houdbaar.

Uniek, en ik ben best wel een beetje trots, dat wij de schitterende selecties van *Narcissus viridiflora* van de firma W.F. Leenen & Zn. uit Voorhout mogen aanbieden. Jarenlange inspanning en expertise hebben de volgende schitterende resultaten opgeleverd. Waaronder de winnaar van de Narcissenshow op de Keukenhof 2015.



Narcissus viridiflora I

Bestelnr. 6971

p.st.	7.95
3 st.	21.75



Narcissus viridiflora III

Bestelnr. 6973

p.st.	7.95
3 st.	21.75



Narcissus viridiflora II

Bestelnr. 6972


p.st.	7.95
3 st.	21.75



Narcissus viridiflora V

Bestelnr. 6975

p.st.	7.95
3 st.	21.75




Narcissus 'Yazz'

Intro: 1991. Division 7. Een rijk bloeiende heerlijk geurende jonquille in een bijzondere kleurencombinatie. De bloemblaadjes ontluiken zachtgeel en verbloeien naar het ivoorwit. Het cupje is mosterdgeel met een koperoranje randje. Veel bloemen in rijke kleuren.



Bestelnr. 9986

10 st. 3.75
25 st. 9.00




Narcissus -mengsel- biologisch geteeld

Een vrolijke mengeling van biologische gekweekte narcissen. Prima voor verwildering.



Bestelnr. 6976

10 st. 6.95
25 st. 16.50
100 st. 62.50



MEER NARCISSEN OP WWW.NARCISSEN-SITE.NL



Een enorme collectie van zelden aangeboden narcissen. Een verleidelijke site voor de ware narcissieniefhebber. Door een plezierige samenwerking met Kwekerij H.M. Meeuwissen biedt deze site ons de mogelijkheid u een aanbod van ruim 200 onbekende, meestal niet commerciële rassen te presenteren. Veelal bestelbaar in kleine hoeveelheden, dus ideaal voor de verzamelaar.

Regelmatig wordt op de website een narcis in het zonnetje gezet.



NECTAROSCORDUM TRIPEDALE EN NECTAROSCORDUM MELIOPHYLLUM

2015

Herkomst van *N. tripedale* is Armenië. De 1,5-2 cm grote, klokvormige satijnroze bloemen vormen samen een compacte bloemtros op 100-130 cm stevige bloemstelen. *N. tripedale* is hoger dan *N. meliophilum*, die is afkomstig van de Krim. In de bloeitijd worden de bloemen vanwege de overvloedige nectar intensief door onder andere hommels bezocht. Waardevolle snij- en droogbloem. Uniek aanbod van selecties.



Nectaroscordum tripedale

Bestelnr. 977

p.st.	7.95
3 st.	22.50



Nectaroscordum meliophyllum -kloon jr-

Bestelnr. 6979

p.st.	17.50
3 st.	51.00



Nectaroscordum tripedale x meliophyllum

Bestelnr. 6978


p.st.	17.50
3 st.	51.00



Nectaroscordum meliophyllum -zachtroze hoge kloon-

Bestelnr. 6980

p.st.	11.50
3 st.	33.00



NECTAROSCORDUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Nectar was op de berg Olympus de drank der Goden (maar het is ook een zoet vocht dat de bijen uit de bloemen halen) en uit het Grieks/Latijn scordion wat zoveel betekent als: de plant geurt naar uien. Een klein geslacht van planten nauw verwant aan *Allium* met als voornaamste verschillen: een vruchtbeginsel met talrijke zaaddozen en drie tot zeven nerven tekenen elk bloemblaadje, bij *allium* slechts één. Er zijn een viertal species bekend. De plant groeit op alle goed gedraineerde grondsoorten en verdraagt zowel de volle zon als een schaduwrijk plekje.




Nectaroscordum siculum subsp. bulgaricum

(Synoniemen: *Allium bulgaricum*, *A. dioscoridis* en *A. siculum*)

Intro: 1873. Herkomst: Zuid-Frankrijk, Sicilië, Sardinië, Zuid-Italië, Noord-Irak, Zuidoost-Turkije en West-Iran. De wat 'lossig' ogende ca. 15 cm brede bloeiwijze bestaat uit 20-30 zeer fraaie klokvormige en knikende bloemen die op ca. 10 cm lange en donkere steeltjes staan. De kleur van de bloemen, met overlappende bloemblaadjes is purper met een brede crèmewitte rand en een zweem van groen. Tijdens de uitbloei richten de bloemen zich omhoog. Het is een bijzonder waardevolle snij- en droogbloem.

Bestelnr. 975	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



ORNITHOGALUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Uit het Grieks: ornis (vogel) en gala (melk). De Nederlandse naam luidt aldus: vogelmelk. Het geslacht *Ornithogalum* bestaat uit een groep bolgewassen die zich lenen voor verwildering. De vele species, maar ook de cultivars zijn zonder meer geschikt als snijbloem. Ze zijn overwegend afkomstig uit de gematigde streken van Europa, Azië, en Afrika. De bollen zouden tamelijk voedselrijk en smakelijk zijn, uiteraard na te zijn gekookt.




Ornithogalum balansae

Intro: 1884. Herkomst: Noordoost-Turkije en het aangrenzende gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Nederlandse naam: breedbladige vogelmelk. Bloeit in maart-april met kortgesteelde, enigszins kegelvormige bloemtrossen geflankeerd door twee à drie tot 1 centimeter brede heldergroene bladeren. De witte bloemen zijn aan de buitenkant voorzien van brede groene strepen. Verwildert goed.

Bestelnr. 981

25 st. 3.00

100 st. 11.00




Ornithogalum magnum

Intro: 1935. Herkomst: Noord-Kaukasus. De bloemstelen met tientallen knoppen komen in mei boven het blad en dan vangt de bloei vanuit de onderste knoppen aan met zuiver witte ster-vormige bloemen met lichtgele meeldraden. De direct na de bloei gevormde zaaddozen beginnen vanaf half juli open te springen. Het smalle donkergroene blad is lijnvormig. Combineer met *Allium* en vaste planten.

Bestelnr. 983

5 st. 3.50

10 st. 6.50




Ornithogalum nutans

Intro: 1594. Nederlandse naam: knikkende vogelmelk. Oorspronkelijk voorkomend in Zuid-Europa en het zuidwesten van Azië. Nu ook in vele Europese landen verwilderd voorkomend. Prefereren een schaduwrijke en wat bosachtige omgeving. De bloemsteel is voorzien van een aarvormige bloeiwijze met tien tot twintig knikkende (nutans), klokvormige en 2 tot 3 cm lange witte bloemen met een groene buitenkant. De lange en smalle bladeren zijn zachtgroen met een opvallende witte middennerf. Prima voor verwildering.

Bestelnr. 987

25 st. 3.00

100 st. 11.00



Ornithogalum ponticum 'Sochii'

Eind jaren tachtig verzameld in de bossen in Sochi, aan de Russische Zwarte Zee, inmiddels veruit de meest populaire badplaats van Rusland en de plaats waar de Olympische Winterspelen 2014 hebben plaatsgevonden. De lange piramidiaal groeiende dichte bloemtros bestaat uit grote zuiver witte bloemen en is niet alleen perfect voor in de border, maar ook als snijbloem fantastisch.

Bestelnr. 9729

3 st. 4.95
5 st. 7.50




Ornithogalum reverchonii

Inheems in het zuidwesten van Spanje en Marokko, waar deze vogelmelk groeit in spleten in de kalksteenrotsen. Een sierlijk soort met tot twintig zuiver witte, hangende, 2 centimeter grote klokvormige bloemen. Sterke snijbloem.

Bestelnr. 979

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Ornithogalum umbellatum

Intro: 1594. Gewone vogelmelk, plaatselijk: snottebellen. Herkomst: grote delen van Europa, Noord-Afrika, Turkije, Syrië, Libanon en Israël. De lijnvormige gegroefde en half opgaande groene bladeren hebben een duidelijke witte middenstreep. Het bloemscherm bestaat uit zo'n twintig zuiver witte stervormige bloemetjes met op de achterzijde de groene strepen die vrijwel niet worden opgemerkt wanneer de bloemetjes wijd geopend zijn. Dit gebeurt in de namiddag; bij het invallen van de avond sluiten ze zich.

Bestelnr. 993

25 st. 3.50
100 st. 13.00



Oxalis versicolor

Zeer opvallende Zuid-Afrikaanse species al bekend in 1774. De witte bloemen showen een sterk contrasterende rode rand. De bloemen, die tot ver in de winter bloeien, zijn op zijn mooist in halfgeopende toestand, dan tonen de spiraalvormige bloemblaadjes het zuurstokeffect. Een echte potplant die tot zes graden vorst verdraagt. Als kamerplant zou deze *Oxalis* jaarrond kunnen bloeien.

Bestelnr. 9511

5 st. 3.50
10 st. 6.75



Oxalis versicolor 'Golden Cape'

2015

Een kleurige nieuweling waarbij de kleuren van de bloemen levendig geel met een rode rand zijn. De bekervormige bloemen, bestaande uit vijf bloemblaadjes, openen zich in de volle zon en sluiten in de avond. Helder frisgroen ingesneden loof. Een echte potplant.

Bestelnr. 6981

3 st. 3.75
5 st. 6.00




Paris thibetica

(Syn.: o.a. *P. polyphylla* var. *thibetica*)

Een recent geïntroduceerde species uit China. De 20 tot 40 cm hoge steel draagt een krans van smalle, iets gegolfde blaadjes, in het midden een limegroene bloem. De overlappende kelkblaadjes vormen een mooie ondergrond voor de opvallende opgerolde roodbruine bloemblaadjes, waar tussenuit de lange meeldraden verschijnen. In de herfst verschijnt een opvallende hoeveelheid rode bessen. Op bosgrond in de (half)schaduw.

Bestelnr. 8217

p.st. 4.95
3 st. 13.50



Vernoemd naar de Russische graaf Apollon Apollosvich Mussin-Pushkin, een in 1805 overleden botanicus die veel planten in de Kaukasus verzamelde. Een zeer klein geslacht nauw verwant aan *Scilla* en *Chionodoxa*, maar het verschilt van deze doordat de kroon samengesteld is uit meel- en helmstralen.



Puschkinia scillooides var. libanotica

(Synoniem: *Puschkinia libanotica*)


Intro: 1808. Herkomst: West-Azië en de Kaukasus. Het bloemtrosje wordt gevormd door ongeveer tien ster- en klokvormige licht porseleinblauwe bloemetjes met een blauwgroene middennerf. Goed toepasbaar bijvoorbeeld als onderbeplanting en prima voor verwildering.



Bestelnr. 1001

25 st. 2.75

100 st. 10.00



Puschkinia scillooides var. libanotica 'Alba'


De zuiver witte vorm van *Puschkinia scillooides* var. *libanotica*. Herkomst: Turkije, Hakkari, bij Yuksekova op 2000 meter hoogte. Zeer aantrekkelijk wanneer ze massaal worden aangeplant zoals zij in het wild voorkomen.



Bestelnr. 1003

25 st. 2.75


100 st. 10.00



Sanguinaria canadensis

Herkomst: het oosten van Noord-Amerika. De hartvormige en gelobde bladeren zijn aan de bovenzijde grijsgroen, aan de onderzijde blauwgroen en verschijnen vaak tijdens of direct na de bloei. De helderwitte bloempjes bloeien in april-mei. De vlezige wortelstokken bevatten een rood melksap, vandaar de Nederlandse benaming: bloedwortel. Voor een licht beschaduwde plekje in een humusrijke, vochtige maar goed doorlatende grondsoort.

Bestelnr. 1007 3 st. 7.50
 5 st. 12.00




Sanguinaria canadensis 'Multiplex'

(Synoniem: *S. canadensis* 'Flore Pleno')

Een gevuldbloemige vorm. Elke award die te winnen is, is door deze bloedwortel gewonnen. Tussen het blauwgroene loof ontluiken de witte pompons. De bloemen houden langer aan dan de enkelbloemige. Schitterend voor iedere schaduw-tuin in een humusrijke, vochtige maar goed doorlatende grondsoort.

Bestelnr. 1009 p.st. 9.95
 3 st. 29.25



Scilla (krenken, benadelen) was het woord dat door Hippocrates gebruikt werd met betrekking tot de wortels die een gewelddadig gif bevatten. De scilla die gewoonlijk werd gebruikt door de Romeinen en de Grieken is de plant die we nu kennen als *Urginea maritima* (Zee-ui). Het geslacht *Scilla* omvat ongeveer 100 species, maar daarvan zijn er de laatste jaren nogal wat opgegaan in andere geslachten (bijv. *Scilla non-scripta* heet nu *Hyacinthoides non-scripta*). Ze komen voor in zowel tropische- als gematigde streken van Zuid-Afrika tot aan het gebied langs de Middellandse Zee en overige delen van Europa en Azië. De sterhyacint hoort thuis op kalkhoudende en humusarme zandgrond die niet al te droog mag zijn. Verwildering!



Prospero autumnale

(Synoniem: *Scilla autumnalis*)

Intro: 1753. Herkomst: grote delen van Europa (inclusief het Britse Rijk), Noord-Afrika en West-Azië. Zoals de naam aangeeft is dit een in de nazomer of herfst (autumnale) bloeiende species. De voor de bloei verschijnende bladeren zijn smal en grasachtig. De meest voorkomende bloemkleur is paarsblauw, maar ook lila en donkerroze exemplaren zijn gesignaleerd.



Bestelnr. 1015

p.st. 2.95
3 st. 8.25




Scilla bifolia

(Synoniemen: *S. dubia*, *S. minor*, *S. nivalis*, *S. uluensis* en *S. xanthandra*)

Intro: 1568, in Nederland sinds 1594. Herkomst: Midden- en Zuid-Europa en Klein-Azië. Een vroeg-bloeiend (maart) en welriekend soortje. Het blad, vaak twee in getal (bifolia), is schedevormend en aan één zijde van de bloemsteel geplaatst. Het bloemtrosje omvat zo'n tien opvallend grote gentiaanblauwe stervormige bloemetjes. Verwildering.

Bestelnr. 1017

10 st. 2.50
25 st. 6.00
100 st. 22.50




Scilla bifolia 'Rosea'

(Synoniem: *S. bifolia* var. *carnea*)

Een fraaie zachtroze vorm. In cultuur sinds 1601. Prima geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 1021

10 st. 2.50
25 st. 6.00
100 st. 22.50




Scilla ingridiae 'Vaclav'

2015

Een zich sterk onderscheidende vorm van de soort, destijds aangetroffen door de Tjechische kenner en liefhebber Vaclav Jost, in het Taurus-gebergte in Zuid-Turkije. De talrijke lange bloemtrossen dragen tot tien blauwe bloemen per steel.

Bestelnr. 6982

p.st. 4.95
3 st. 14.25




Scilla litardierei

(Synoniemen: *S. albanica*, *S. amethystina*, *S. italica* en *S. pratensis*)

Intro: 1827. Herkomst: Dalmatië, voormalig Joegoslavië en het westen van de Balkan. Het slechts 15 cm hoge bloemsteeltje, omgeven door donkergroene smalle bladeren,orst vijftien tot wel zeventig stervormige zachtlila tot lavendelblauwe bloemetjes die dicht bijéén geplaatst staan en een tros vormen. Na de bloei buigen de bloemblaadjes zich over de stampers.

Bestelnr. 1023

10 st. 2.75
25 st. 6.50




Scilla mischtschenkoana 'Tubergeniana'

(Synoniemen: *S. diziensis* en *S. tubergeniana*)

Intro: 1931. Herkomst: het noordwesten van Iran (Tabris) en de Kaukasus. De weinige bladeren zijn smal en lijn- tot gootvormig. De bloemtrossjes, waarvan het lijkt dat ze direct uit de grond komen, bestaan uit stervormige wat knikkende zeer lichtblauwe geurende bloemetjes met op ieder bloemblaadje een lichtblauw nerfje. Deze zeer vroegbloeiende *Scilla* doet denken aan een verijnde uitgave van *Puschkinia*. Uit ieder bolletje komen drie tot vier bloemsteeltjes. Verwildering.

Bestelnr. 1025

10 st. 3.50
25 st. 8.00
100 st. 30.00




Scilla siberica

(Synoniemen: *S. cernua*, *Othocallis siberica*)

Intro: 1796. Herkomst: Zuidoost-Europa, de Kaukasus, Klein-Azië en het zuidoosten van Azië. De helderblauwe, knikkende, ster- tot klokvormige bloempjes worden op ieder bloemblaadje gemarkeerd door een donkerblauwe middennerf. De meest bekende *Scilla*, zeer geschikt voor verwilderling.


Bestelnr. 1031 25 st. 3.50
100 st. 12.50



Scilla siberica 'Alba'

Een witbloeiend sterhyacintje met overigens dezelfde eigenschappen als *S. siberica*. Inheems in de bossen en de weiden in de Kaukasus, de Krim en Noord-Iran.


Bestelnr. 1033 10 st. 2.75
25 st. 6.50
100 st. 25.00



Scilla siberica 'Enem'

Oorspronkelijk aangetroffen door Viktor Korolev in het Krasnodar District, in het zuiden van Rusland, nabij de plaats Enem. Deze *Scilla* groeit daar in de schaduw in een gemengd loofbos. Onderscheidend van de soort doordat deze nog blauwer is en geheel geen wit in de bloem heeft. Zeer vroeg bloeiend, vaak al in de laatste week van januari.

Bestelnr. 9512 p.st. 2.95
3 st. 8.25



Scilla taurica

(Synoniem: *S. bifolia taurica*)

Een krachtig groeiend en rijk bloeiend soort. De aangeboden partij is ooit van één bol geteeld. Deze *Scilla* is gevonden door Reinhardt Suckov van de toenmalige Oostduitse Academie van Wetenschappen op het schiereiland Krim in Flaumeichenwald. Er komen tot wel twintig bloemen aan een steeltje van 20 cm hoog. Franz Speta uit Linz, de *Scilla*-specialist, noemt dit de mooiste uit deze groep.

Bestelnr. 1035

p.st. 3.75

3 st. 11.25



STERNBERGIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER AMARYLLIDACEAE

Dit geslacht werd vernoemd naar graaf Kaspar Moritz van Sternberg (1761-1831). De auteur van "Revisio Saxifragarum" (1810). De bloemen vertonen visueel overeenkomst met die van krokus, maar er zijn essentiële verschillen. De voornaamste: *Sternbergia* heeft zes meeldraden, de krokus drie.

Waarschijnlijk behoren ze tot de planten die in de Bijbel bedoeld worden als 'de leliën des velds'. Voor een zonnige standplaats op doorlatende bodem waar 's zomers in de rustperiode voldoende warmte is.



Sternbergia fischeriana




Een voorjaarsbloeiende *Sternbergia*, inheems op stenige hellingen in o.a. Iran, de Kopet Dag tot de Kaukasus, Turkije en Syrië. Het aanbod is verzameld uit de meest noordelijke populatie in Armenië. De gele bloemen hebben slanke bloemblaadjes waardoor zij op sterretjes lijken. Het platte, enigszins in de lengterichting gedraaide blad is zeegroen. Voor de bloemaanleg heeft dit gewasje veel zomerwarmte en droogte nodig.

Bestelnr. 6983

p.st. 7.95

3 st. 22.50




Sternbergia lutea

Herfstbloeierend. Inheems in grote delen van het Mediterrane gebied. De donkergroene, glanzende bladeren met een grijsachtige middennerf verschijnen direct voor of tijdens de bloei. Schitterende stervormige goudgele bloemen met een doorsnede van 3 tot 5 cm. Rijk bloeiend. Gedurende de zomermaanden verlangen ze een droog en warm plekje.




Bestelnr. 2138

5 st. 3.25
10 st. 6.00



TECOPHILAEA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER TECOPHILAEACEAE



Tecophilaea cyanocrocus

Bestelnr. 1042

p.st. 3.50
3 st. 9.75

Nederlandse naam: Chileense krokus, ook wel: gentiaan krokus. De naam van dit super fraaie geslacht danken we aan de dochter van de Italiaanse plantkundige Luigi Colla (1766-1848) uit Turijn, die de buitenissige naam "Tecofila" bij haar geboorte kreeg toebedacht. Er is ook sprake van een vernooming naar de Italiaanse botanisch kunstenaar Tecophila Billottii. Intro: eind 19e eeuw. Een geurende ca. 10 cm hoge voorjaarsbloeier. Herkomst: Chili, voornamelijk relatief hoog in de Andes op 2.000 meter hoogte. Redelijk winterhard.



Tecophilaea cyanocrocus 'Leichtlinii'

Bestelnr. 1051

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Tecophilaea cyanocrocus 'Violacea'

Bestelnr. 1053

p.st. 3.95
3 st. 11.25

Trillium is afgeleid van het Latijnse woord tri (drie). Dit omdat zowel het blad als ook de bloem uit drie delen bestaat. Herkomst: Sibirië, Korea, Japan en China. Een enkele species wordt aangetroffen in het westelijk deel van de Himalaya, maar het merendeel komt voor in grote delen van Noordoost-Amerika. *Trillium* is herkenbaar aan de kale bloemstelen, drie bladeren die een krans vormen, drie opvallende bloembladeren en drie schutbladeren. Het ondergrondse gedeelte bestaat uit een verdikte wortelstok met zijdelings geplaatste ogen (nieuwe uitlopers). De wortelstokken variëren behoorlijk in grootte, afhankelijk van de species. Het is mogelijk dat deze het eerste jaar na aanplant latent blijft. De standplaats dient vochtig en koel te zijn, een beschaduwde plekje, bijvoorbeeld als onderbegroeiing.



Trillium catesbaei

(Synoniemen: *T. catesbyi* en *T. stylosum*)


Herkomst: Noord-Carolina tot Georgia en Alabama. De bronskleurige bladeren zijn ovaal en kort gesteeld. Het gracieuze knikkende witte bloempje, is vaak voorzien van een roze zweem. Het komt voor dat deze helemaal roze is. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.



Bestelnr. 8223

p.st. 4.50

3 st. 12.75




Trillium chloropetalum var. giganteum

Californische reuzen-paddentrillium. De aangeboden variabele variëteit is inheems in het gebied San Francisco Bay Area, en dan specifiek in het noordelijke deel. Het onderscheid zich van de soort door het ontbreken van geel pigment in de bloemblaadjes. De voorkomende kleuren zijn wit, roze, helder roodpaars en alle tussenliggende tinten. Als de bloemen geuren, geuren zij naar rozen. Het blad is groen of purper gemarmerd. Behoort tot de subgenus *Phyllantherum*, waarbij de bloemen opgaand en stengelloos zijn.

Bestelnr. 6170

p.st. 16.50

3 st. 48.00




Trillium cuneatum

Nederlandse naam: Padden-trillium. Herkomst: het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het is een wat forsere plant met aantrekkelijk gevlekt blad. De 5 tot 10 cm grote maroonkleurige bloem wordt omgeven door enigszins gespreide groene kroonbladeren met een purperen waas. Behoort tot de subgenus *Phyllantherum*, waarbij de bloemen opgaand en stengelloos zijn.



Bestelnr. 8225

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Trillium erectum


(Synoniemen: *T. foetidum*, *T. obovatum* en *T. rhomboidum*)

Intro: 1759. Herkomst: oostelijk Noord-Amerika. De groene, steelloze bladeren zijn omgekeerd eirond van vorm. De licht knikkende donker kastanjebruine bloem staat tot 10 cm boven het blad en heeft een doorsnede van zo'n 8 cm. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.



Bestelnr. 8227

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Trillium flexipes


(Synoniemen: *T. declinatum*, *T. gleasonii*)

De 'Bent Trillium' of 'Drooping Trillium' komt voornamelijk voor in het middenwesten van de Verenigde Staten. De enigszins variabele species met knikkende witte bloemen wordt aangetroffen op een vochtige kalkstenen bodem. Karakteristiek voor dit, in de tuin makkelijk te houden soort, is de rozengeur die de plant tijdens de bloei verspreidt. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.



Bestelnr. 9513

p.st. 5.50
3 st. 15.00




Trillium grandiflorum

Intro: 1799. Herkomst: oostelijk Noord-Amerika waar ze massaal worden aangetroffen in bossen tussen kreupelhout op een kalkzandstenen bodem. De groene bladeren zijn veelal omgekeerd eirond, soms omgekeerd lancetvormig. De grote zuiver witte bloemen verbloeien naar zachtroze. De bekendste trillium. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.

Bestelnr. 8231

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Trillium grandiflorum 'Snowbunting'

(Synoniem: *T. grandiflorum forma flore pleno*)

Een zeldzame gevuldbloemige vorm van *T. grandiflorum*. Langzaam groeiend, helaas duur. Er zijn meerdere klonen in omloop, de één nog mooier dan de ander. Dit is wel een hele mooie! Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.

Bestelnr. 8233

p.st. 33.50
3 st. 97.50




Trillium luteum

Herkomst: Kentucky, Missouri, Alabama en Arkansas. De lichtbruin gevlekte bladeren zijn breed en lopen spits toe. De lichtgele, soms groengele naar citroen geurende bloemen bereiken een doorsnede tot 9 cm, de groene schutbladeren zijn iets korter. Behoort tot de subgenus *Phyllanthrum*, waarbij de bloemen opgaand en stengelloos zijn.

Bestelnr. 9056

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Trillium vaseyi

Herkomst: het zuidoosten van de Verenigde Staten. Een robuuste plant met de grootste bloemen van alle trilliums, tot 10 cm in doorsnede. De kastanjebruine bloem en het grote blad worden gedragen door een forse stengel van 50 cm hoog. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.



Bestelnr. 9298

p.st. 9.95
3 st. 27.00



TRITELEIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Een geslacht nauw verwant aan *Brodiaea* en *Dichelostemma*. Vernoemd naar James Brodie (1744-1824) een Schotse tuinbouwkundige. Het geslacht bestaat uit meer dan dertig species en wordt veelal aangeboden als *Brodiaea*. *Triteleia* verdraagt de volle zon, maar ook lichte schaduw. De grond soort mag variëren van zand tot leem, maar dient wel goed vocht doorlatend en rijk aan voeding te zijn. Perfecte planten voor verwildering. Prachtige, langdurig houdbare snijbloemen.



Triteleia hyacinthina


(Synoniemen: *Brodiaea hyacinthina* en *B. lactea*)

Intro: 1835. Herkomst: Brits-Columbia, Idaho en Californië (U.S.A.). De bloemschermen zijn gevuld met tientallen melkwitte trechtervormige en opgaande bloemen. De sterke doch soepele bloemstelen worden zo'n 50 cm hoog. Bloeit langdurig in juni-juli.



Bestelnr. 1045

25 st. 2.75
100 st. 10.00




Triteleia ixioides 'Starlight'

Begin jaren negentig is deze *Triteleia* geselecteerd uit *T. ixioides* var. *scabra*, die van oorsprong in Californië (U.S.A.) voorkomt. Een groot bloemscherm bestaande uit tientallen crèmegele bloemen met 'n donkergele streep in het midden van elk bloemblaadje. Prachtig in combinatie met roodbladige vaste planten. Een lange bloeiperiode, van mei tot in juni. Snijbloem.

Bestelnr. 1047

10 st. 2.50

25 st. 6.00



Triteleia laxa 'Foxy'


©2015

Een in 2005 geregistreerde sport van *T. 'Rudy'*. Witte bloemen met een smalle blauwvioletten middennerf. Een leuke toevoeging aan het assortiment. Prima snijbloem.

Bestelnr. 6984

10 st. 3.50

25 st. 8.50



Triteleia 'Twilight'


©2015

Een veelbloemig scherm, met circa 40 violetblauwe bloemen, voorzien van een violette middennerf. Het geheel doet denken aan een fijnere uitgave van een *Agapanthus*. Het blad is enigszins blauwachtig donkergroen, 1,5 cm breed en ligtig. Prima snijbloem.

Bestelnr. 6985

10 st. 3.00

25 st. 7.00



Tulbaghia is vernoemd naar de vroegere Nederlandse Gouverneur in Kaap de Goede Hoop: Ryk Tulbach (overleden 1771). *Tulbaghia* is nauw verwant aan *Allium*. Het is een klein geslacht bestaande uit zo'n zesentwintig species met als thuishaven: Zuid-Afrika. De inheemse bevolking gebruikt de wortelstok van deze plant als smeersel tegen reumatiek, of als aftreksel dat op het voorhoofd wordt gewreven en verlichting bij hoofdpijn zou geven. Goed gedraineerde grond is vereist, anders goed te houden als potplant. Tegenwoordig veelal toegepast als keukenkruid: Kaapse knoflook, wilde knoffel, zowel het blad, de bloemknop en de bloemen zijn eetbaar.



Tulbaghia montana



Een wildvormpje voorkomend hoger in de bergen, in het bijzonder aan de zuidoost-zijde van de Drakensberg. Uit het polletje glanzend midden-groen blad verschijnen vanaf april de bloemsteeltjes met de violetgrijze bloempjes, langs de randjes wit, met een helder oranje corona. Overdag geurend. Voor in een pot als kuipplant.



Bestelnr. 6986

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Tulbaghia violacea

(Synoniem: *T. cepacea*)


Intro: 1838. Massaal voorkomend in het Tsitsikamma oerwoud, gelegen aan de oostkant van de Kaapprovincie. De donkergroene en smalle bladeren vormen een rozet. Aan de top van de bloemsteel vormen zich meerdere trossen met stervormige lilaroze bloempjes. Ze vragen een zonnige standplaats en bloeien langdurig vanaf eind mei. Redelijk winterhard. Een prima snijbloem.



Bestelnr. 1062

3 st. 4.95

5 st. 8.00



Tulbaghia violacea var. maritima


Een ondersoort die in alle delen grover is. Mauve-roze bloemen bestaande uit korte brede bloemblaadjes die elkaar enigszins overlappen, waardoor een mooie ronde bloemvorm ontstaat. Bloeiend gedurende de hele zomer.



Bestelnr. 1066

3 st. 3.75

5 st. 6.00



Tulbaghia 'Enya'


Ontstaan uit *T. capensis* x *T. violacea* uit handen van J. Duijs, Otterlo. *Tulbaghia* soorten kruisen goed met elkaar. Hieruit groeien door het combineren van de verschillende eigenschappen verrassende nieuwe kleuren. 'Enya' bloeit rijk met grotere paarse bloemen, die ten tijde van de bloei iets lichter verkleuren.



Bestelnr. 9516

p.st. 3.50

3 st. 9.75



TULIPA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER LILIACEAE

Het oorsprongsgebied van *Tulipa* loopt door landen als Turkije, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan. Voor een groot deel zijn dat landen met veel bergen zoals het Ala Tau-gebergte, dat doorloopt tot in China waar het Tien Shan heet. Door het verdwijnen van het IJzeren Gordijn is het voor onderzoekers uit het westen nu mogelijk om de tulpen in hun oorsprongsgebieden te bestuderen en te onderzoeken. Er zijn mogelijk al 150 verschillende soorten of species aangetroffen, voorkomend onder verschillende omstandigheden. Zo zijn er species groeiend op berghellingen, op rotsige bodem, maar ook in zware klei tot een halve meter diep. Wat ze veelal gemeen hebben is: 's zomers gloeiende hitte en 's winters veel sneeuw. De eerste tulp in Nederland kwam in het bezit van de Amsterdamse apotheker Wallich Ziewiertz, vermoedelijk omstreeks 1570, doch geheel zeker is dat niet.




Tulipa acuminata

(Synoniemen: *T. turcica*, *T. cornuta* en *T. stenopetala*)

Intro: 16e eeuw. In 1813 voor het eerst beschreven toen M. Vahl deze opnam in een plantenlijst van de Botanische tuin in Kopenhagen. Eigenlijk is het een hybride die een species-naam draagt. Ook bekend als de 'gehoornde tulp'. De lange en curieus gevormde bloemblaadjes zijn rood met geel, vaak met een groene gloed aan de buitenzijde. De helmknoppen zijn bruin.


Bestelnr. 1100 3 st. 4.95
5 st. 8.00



Tulipa aucheriana

Geïntroduceerd door H. Elwes in 1880, maar al in 1838 ontdekt door Pierre Aucher-Eloy. Herkomst: Iran en Syrië. De twee tot vijf grijsgroene bladeren zijn ca. 15 cm lang en gegolfd. Eén tot drie roze bloemen met gepunte bloemblaadjes en een geelbruin hart. De buitenzijde van de bloemblaadjes hebben een geelbruine blos. Wanneer de bloemen geopend zijn, tonen zij een duidelijke stervorm. Heerlijk geurend.


Bestelnr. 1102 p.st. 2.95
3 st. 8.25



Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'

Intro: 1971. De oorspronkelijke *T. bakeri* is inheems op Kreta. De krachtige cultivar heeft ronde bloemblaadjes, rozelila met een groot rond geel hart aan de binnenzijde. De buitenste blaadjes zijn pastelkleurig mauve. Ongecompliceerd, een prima tuintulpje.

Bestelnr. 9733 10 st. 2.50
25 st. 6.00




Tulipa batalinii

Intro: 1889. Herkomst: Centraal-Azië, het Pamir-Alai gebergte. Vernoemd naar Dr. Batalin, de directeur van de Botanische tuin in Sint Petersburg die het omstreeks 1888 naar Kew zond. De bloemkleur is zacht citroengeel met een bruin hart. Naarmate de bloei vordert, wordt het tulpje bijna wit. Het is een nog sporadisch aangeboden rareiteit.

Bestelnr. 1104

3 st. 4.50

5 st. 7.00



Tulipa batalinii 'Bright Gem'


(Synoniem: *T. linifolia* (Batalinii Group) 'Bright Gem')

Intro: 1952. W.R. Dykes kruiste *T. batalinii* x *T. maxmowiczii*, daaruit is o.a. 'Bright Gem' ontstaan. Dit succesvolle tulpje toont zwavelgele charmante bloemen met aan de buitenzijde een oranje blos. Zodra het zonnetje schijnt, vouwen de bloemen geheel open. Grijsgroen gegolfd blad. Heel leuk voor in potten.

Bestelnr. 8635

10 st. 2.50

25 st. 6.00



Tulipa batalinii 'Red Gem'


(Synoniem: *T. linifolia* (Batalinii Group) 'Red Gem')

Intro: 1985. De buitenzijde van de bloemen is vermiljoenrood met een roze glans. De binnenzijde is scharlaken met een zwart hart en een gele gloed. De meeldraden zijn chroomgeel. Is met succes toegepast om te laten verwilderen in gras.

Bestelnr. 8637

10 st. 3.50

25 st. 8.00



Tulipa batalinii -zaaimengsel-

Een schitterende partij, uit zaad gekweekt, (vermoedelijk *T. montana* x *T. linifolia*) waarin de mooiste tinten uit de Batalinii-groep voorkomen. Van zachtgeel tot diep oranje, met tussenliggende nuances zoals abrikoos en perzik. Om te smullen. Uiteindelijk verkleuren alle tinten in de uitbloei naar roomwit. Perfect voor verwildering op een zonnige plek.


Bestelnr. 1172 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00



Tulipa biflora

Intro: 1776. Herkomst: van Zuidoost-Europa tot aan het gebied rond de Kaspische Zee en de Kaukasus. Een variabele species. De twee, in verhouding tot de totale plantenbouw, vrij grote bladeren zijn verfraaid met een rood randje. Het slechts 12 cm hoge bloemsteeltje draagt een drietal heerlijk geurende bloempjes, wit met een groot geel hart.


Bestelnr. 1106 **10 st. 2.50**
25 st. 6.00



Tulipa bifloriformis

Voor het eerst beschreven in 1935. Herkomst: Centraal-Azië, met name het Tien Shan-gebergte, op kalkhellingen op 1900 meter hoogte. Een variabele species, nauw verwant aan *T. turkestanica*. De roomwitte bloemen geuren licht naar honing. De buitenzijde heeft een waas van violet, de basis is roomgeel. Ook in de helmknoppen zit variatie, meestal violet, soms geel.


Bestelnr. 8639 **5 st. 4.50**
10 st. 8.50



Tulipa clusiana

Intro: 1802. Lady Tulip, Candy Tulip of Snoepgoed-tulp. Herkomst: Noordoost-Afghanistan en de Kashmir, op sommige plaatsen verwilderd, Zuid-Frankrijk en Griekse eilanden. In Europa zijn zij verspreid door in de kluiten van geïmporteerde druivenstruiken mee te liften. De drie tot vijf bladeren zijn grijsgroen en duidelijk gegolfd. De gepunte bloemblaadjes zijn aan de buitenkant rood en aan de binnenzijde wit. De basis is donker karmijnrood en de meeldraden paars. Bij zonnig weer zijn de geopende bloemen stervormig; dan valt de ongelooflijke kleurencombinatie extra op.


Bestelnr. 1162 5 st. 4.50
 10 st. 8.50



Tulipa clusiana 'Cynthia'

In 1959 door Van Tubergen geïntroduceerd, ontstaan door het kruizen van de gele en witte vormen van *T. clusiana*. De roomgele bloemen hebben aan de buitenkant van de bloemblaadjes een rode was met een groen randje. Ook de helmknoppen zijn groen. Award of Garden Merit in 1999. Een nieuwe toepassing voor de *Tulipa* is aanplanten in het gras. Hier zijn inmiddels goede resultaten mee behaald.


Bestelnr. 8251 10 st. 2.75
 25 st. 6.50



Tulipa clusiana var. chrysantha 'Tubergen's Gem'

Intro: 1969. Deze hogere selectie behaalde vele getuigschriften o.a. op de Floriade Amsterdam 1972. De buitenste drie bloemblaadjes zijn karmijnrood, de binnenste drie bloemblaadjes zijn zwavelgeel gekleurd. De binnenzijde van de bloem is goudgeel met gele helmknoppen. Ook deze *Tulipa* is geschikt voor verwildering in het gras.

Bestelnr. 8253 10 st. 2.75
 25 st. 6.50




Tulipa clusiana var. stellata

Intro: 1827. Herkomst: o.a. het noorden van Afghanistan en Pakistan. De bloemen missen de karakteristieke zwarte keel zoals de soort dat wel heeft. De witte bloemen tonen aan de buitenzijde een rozerode blos en over het geheel zit een roze gloed. De bloemstengel is langer, 30-35 cm.



Bestelnr. 9308 10 st. 3.00
25 st. 7.00




Tulipa cretica 'Archanes'

Uit een collectie in het wild verzamelde *Tulipa cretica* zijn na jaren lang selecteren drie mooie introducties ontstaan die vernoemd zijn naar steden op Kreta. Wij bieden er twee aan. 'Archanes' is rijkbloeiend met op de buitenste bloemblaadjes een zilverroze blos, lichter wordend naar de rand. De binnenzijde van de bloem is nagenoeg wit met een geel hartje. Twee tot drie glanzend groene speervormige bladeren.



Bestelnr. 9987 p.st. 2.95
3 st. 8.25




Tulipa cretica 'Heraklion'



Ook een fantastische selectie uit *Tulipa cretica* die voorkomt in de bergen van Kreta, rond Kisamos, Lapsili, de berg Ida, Kaap Malacca, Sitra en Akrotiri, in de buurt van struikgewas. Tot drie bloempjes aan een enkel steeltje, wit met een roze blos die verloopt tot een gele basis. Op de achterkant van de buitenste bloemblaadjes zitten fuchsia-roze vleugjes waardoor er een vrolijk tweekleurig effect ontstaat. Twee tot drie glanzend groene speervormige bladeren.



Bestelnr. 9988 p.st. 2.95
3 st. 8.25



Tulipa grengeolensis


Deze beschermde tulp is alleen bekend in een klein gebied Valais, in het zuiden van Zwitserland, nabij de Rhone. In 1946 voor het eerst aangetroffen in een veld rogge. De bloemsteel, omgeven door opvallend gegolfd blad, draagt een zachtgele bloem voorzien van een rode rand. In de bloem aan de basis, bevindt zich een zwarte vlek.



Bestelnr. 9517

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Tulipa hageri


Intro: 1874. Herkomst: Griekenland, Kreta en de omgeving van Izmir (Turkije). Vernoemd naar Friedrich Hager door Theodor von Heldreich, die beiden het tulpje introduceerden. De klokvormige bloemen hebben een kleur die het midden houdt tussen koperkleurig en scharlaken met op de buitenste bloemblaadjes een duidelijk zichtbare olijfgroene gloed. Het hart is zwart met een geel randje.



Bestelnr. 1116

10 st. 4.50

25 st. 10.50



Tulipa hageri 'Splendens'


Intro: 1945. De bloemkleur is koperbrons met een scharlaken gloed aan de buitenzijde, weinig of geen groen in de bloem. Dit schaarse, meerbloemige tulpje heeft drie tot vijf klokvormige bloemen op een 20-25 cm hoog steeltje. De bloem opent zich al enkele centimeters boven de grond.



Bestelnr. 1180

5 st. 4.00






10 st. 7.50



Tulipa heweri

Inheems in Noord-Afghanistan, verzameld door Professor Tom Hewer en Grey Wilson in 1969. Via Wageningen, L.W.D. van Raamsdonk, in de handel gekomen. Een zeer verleidelijk tulpje met glimmende gele bloemen die voorzien zijn van een rode vlam op de buitenste bloemblaadjes. In het wild variabel voorkomend. Meestal twee tot drie bloemen per steeltje.

Bestelnr. 1184 3 st. 3.75
5 st. 6.00






15  4-5  10  6-8  1. 



Tulipa humilis

Herkomst: Noord- en Noordwest-Iran (Elburz gebergte) en Kurdistan. Intro: 1844. Slechts 10-12 cm hoog met een variabele bloemkleur van mauve tot violet en een grote gele basis. De bloemen zijn bekervormig, maar openen zich tot een ster in de zon.

Bestelnr. 1166 10 st. 2.75
25 st. 6.50

10-12  4  5  5  5 








Tulipa humilis 'China Coral'

 2015

Een van de vele selecties die gemaakt zijn uit goed groeiende wildvormen uit Oost-Turkije. Hier betreft het een koraalroze vorm met een groot warmgeel hart. Geurend.

Bestelnr. 6987 p.st. 2.95
3 st. 8.25

10-15  4  5  5  1. 




Tulipa humilis 'Eastern Star'

In 1975 door Visser Czn. geïntroduceerd. Magentaroze bloemen met een bronsgroene vlam op de buitenste bloemblaadjes. Het hartje is kanariegeel. In het jaar van introductie ontving het oosterse sterretje direct een Getuigschrift van de Proeftuin K.A.V.B.

Bestelnr. 9735

10 st. 2.75

25 st. 6.50




Tulipa humilis 'Lilliput'

Intro: 1987 (Visser Czn.). Een meerbloemig 'dwergje' van circa 10 cm hoog met kardinaalrode, mooi gevormde bloemetjes voorzien van een paarszwart hartje.

Bestelnr. 1114

10 st. 2.75

25 st. 6.50




Tulipa humilis 'Magenta Queen'

Intro: 1975, uit handen van W. Kooiman. De vroegste cultivar van *T. humilis*. De buitenste bloemblaadjes zijn lilapaars met een varengroene vlam, de binnenste bloemblaadjes zijn lilapaars. De binnenkant van de bloem is lilapaars met een gele basis en groengele meeldraden. Het langwerpige, ietwat brede blad is grijsgroen.

Bestelnr. 8257

3 st. 4.50


5 st. 7.00



Tulipa humilis 'Persian Pearl'

Geïntroduceerd in 1975 door Grullemans en via W. Lemmers bij Visser Czn. terechtgekomen die het tulpje op naam stelde. De kelkblaadjes zijn aan de buitenkant magentaroze met een groene gloed, aan de binnenzijde cyclamenpurper. Het hart is boterbloemgeel.

Bestelnr. 8641 **10 st. 3.00**
 25 st. 7.00




Tulipa humilis var. pulchella 'Alba Caerulea Oculata'

(Synoniem *T. violacea* var. *pallida*)

Intro: ca. 1989, verzameld in het noordwesten van Iran. Dit bijzonder fraaie tulpje zal vanaf begin april zonder meer een eyecatcher zijn. Zodra de elegante, witte bloemen zich openen, tonen zij een staalblauw hart. Award of Merit in 1989 van de R.H.S.

Bestelnr. 1120 **3 st. 4.50**
 5 st. 7.00




Tulipa iliensis

(Synoniemen: *T. dykesiana* en *T. hoeltzeri*)

Intro: 1879. Herkomst: Tien Shan (Centraal-Azië) en China waar ze voorkomen in het Dzungaria-Kashgar gebied op rots- en grashellingen. Nauw verwant aan *T. altaica*. De bloemkleur is citroengeel met op de buitenste bloemblaadjes violette tinten. De helmknoppen zijn geel.

Bestelnr. 1122 **5 st. 4.00**
 10 st. 7.50



Tulipa ingens

Herkomst: Centraal-Azië (Pamir-Alai, Zeravshan). Verzameld door Paul Graeber in 1901. Opmerkelijk is de ca. 40 cm hoge roodachtig gekleurde bloemsteel. De komvormige en zeer grote scharlaken bloemen glanzen. 'Ingens' betekend: enorm.

Aan de binnenzijde, nabij de basis, treffen we lange zwarte vlekken aan; overigens is dit ook aan de buitenkant duidelijk waarneembaar. De bladeren zijn 'plat' en lintvormig.

Bestelnr. 1124

10 st. 3.95

25 st. 9.50



Tulipa kaufmanniana 'Ice Stick'

De wildvorm komt voor in het Tien Shan-gebergte op gras- en rotschellingen. 'Ice Stick' is door de Botanische Tuin in Tashkent geselecteerd uit het wild. Via Janis Ruksans en J.S. Pennings in Nederland geïntroduceerd en in 2002 geregistreerd. Valt op door zijn vroege bloei. De witte bloemen hebben aan de buitenzijde van de bloemblaadjes een purperrode blos.

Bestelnr. 9519

10 st. 3.75

25 st. 8.75




Tulipa kolpakowskiana

Herkomst: In de heuvels tegen het Tien Shan-gebergte aan, Kazachstan in het Altai-gebergte en over de grens in het noordwesten van China. De één, soms drie gele bloempjes met spits toelappende bloemblaadjes zijn aan de buitenkant voorzien van rozerode vlekjes, het geheel is omgeven door een waas van groen. De helmknopjes zijn geel. De bladeren zijn gegolfd en aan het einde gepunt.

Bestelnr. 1126

10 st. 2.75


25 st. 6.50



Tulipa linifolia

Herkomst: Tadzjikistan hoog in de bergen, zeer variabel maar wel allen rood. De smalle, gegolfde, grijsgroene bladeren hebben rode randjes en vormen een rozet. Het schitterende scharlakenrode bloempje, met spitse bloemblaadjes, verkleurt iets lichter naar de rand en is voorzien van een paarszwart hart met grijsgroene helmknoppen. Wanneer de bloemen geopend zijn, lijken ze op een omgeslagen paraplu.


Bestelnr. 1192 25 st. 3.50
 100 st. 13.00



Tulipa montana

T. wilsoniana door Hoog genoemd. *T. montana* was toen ten onrechte gegeven aan een vorm van *T. oculus-solis*, *T. stapfii* of *T. systola*. *T. montana* kent vele verschillende kleuren en vormen en komt voor in de Kopet-Dag, Turkmenistan en in het Elbrus en Zagros-gebergte in Iran. Het aanbod is een perfecte rode tulp. Door John Lindley in 1827 geïntroduceerd. De bloemkleur is donker vermiljoen. De buitenste bloemblaadjes zijn omhuld met 'n paarse gloed. Het hartje is zwart.


Bestelnr. 1148 10 st. 3.75
 25 st. 9.00



Tulipa neustruevae

Eugenii Georgiovna Pobedimova (1898-1973) beschreef dit tulpje in 1949. In de vijftiger-zestiger jaren in Nederland geïntroduceerd en is gevonden in een klein gebied rond de Kugart-rivier nabij Jalalabad, Kirgizië. Het soortje is licht variabel in het wild, maar herkenbaar aan de licht naar binnen buigende topjes van de bloemblaadjes. Gele bloempjes met op de buitenzijde een paarse bloes.

Bestelnr. 9520 10 st. 2.75
 25 st. 6.50



Tulipa orphanidea 'Flava'


Dit meerbloemige tulpje heeft gele bloemen en rode topjes met op de buitenste bloemblaadjes een zweem van groen en oranje. Het hart is bronskleurig evenals de helmknoppen. Vindplaats van de variabele species is met name West-Turkije, Griekenland en Bulgarije. 'Flava' is een cultuurvorm die in 1970 een Award of Merit ontving.



Bestelnr. 1134

5 st. 3.50

10 st. 6.50



Tulipa orphanidea x T. bakeri

2015


Een prachtige kruising waarbij de bloemen aanvankelijk helemaal groen zijn. Als zij zich openen is duidelijk de puntige bloemvorm van *T. orphanidea* herkenbaar en kleuren zij naar een warme tint barnsteengeel met een schitterend donker koperbruin hart. Grijsgroen smal loof, rood gerand.



Bestelnr. 6988

p.st. 2.95

3 st. 8.25



Tulipa 'Peppermintstick'

2015


Een op het Snoepgoedtulpje gelijkende cultivar uit 1998. Ceriserode bloemen met een witte rand. De binnenzijde van de bloem is ivoorwit, aan de bovenzijde kersrood en het hart is violet. Een prima look-alike, die betrouwbaar verwildert.



Bestelnr. 6989

10 st. 3.50

25 st. 8.00




Tulipa polychroma

(Synoniem: *T. biflora* var. *grandiflora*)

Intro: 1885. Herkomst: Noord-Iran en het noordwesten van Afghanistan. Een meerbloemig slechts 10-15 cm hoog tulpje. Wanneer het zonnetje erop schijnt, is het net een bos 'sterretjes'. De bloemkleur is wit met wat violet op de buitenste bloemblaadjes. Zowel de basis als de helmknoppen zijn geel en al dit fraais is te bewonderen vanaf maart-april.

Bestelnr. 1138

10 st. 4.00
25 st. 9.50




Tulipa saxatilis

Al in het begin van de 17e eeuw was er sprake van *T. saxatilis*. Destijds onder de naam 'The Tulip of Candie'. (Candie of Candia is de oude naam voor Kreta). Geherintroduceerd in 1870 door George Maw. Herkomst: Kreta. Zes tot twaalf groene bladeren vormen een rozet. De tot drie komvormige en geurende zacht lilaroze bloemen met een geel hart en paarse meeldraden bloeien in april.

Bestelnr. 1152

25 st. 4.00
100 st. 15.00




Tulipa schrenkii

(Synoniem: *T. suaveolens*?)

Intro: 1881. Herkomst: Midden- en westen van Rusland, in gebieden langs de rivieren de Don en de Wolga. Aldaar voorkomend in alle denkbare tinten. Bijzonder is dat de in cultuur genomen kloon nauw verwant is aan de bekende tulp: 'Duc van Tol Red and Yellow', die als kruisingouder zelf ook voor vele nazaten zorgde. De hoogte is miniem, zo'n 15-20 cm. De spits toelopende bloemblaadjes vormen een vrij grote bloem, rood met een fraaie oranjegele rand. Geurend.

Bestelnr. 1140

5 st. 4.95
10 st. 9.50



Tulipa sogdiana


Geïntroduceerd door de Russische botanicus Alexander Bunge in 1851. Herkomst: Centraal-Azië, voornamelijk in Karakum, Amurdar'Ya en Kyzylkum, groeiend op zanderige, stenige bodem. Als de woestijn ontwaakt uit zijn grauwe winterslaap en de eerste regen is gevallen, ontluiken de duizenden kleine crèmeroze bloempjes met hun gele hartjes van *T. sogdiana*.



Bestelnr. 1142

10 st. 4.95

25 st. 11.50



Tulipa sprengeri

2015


Intro: 1894. Vindplaats het Pontisch-gebergte in de buurt van Amasya in Turkije. Dit is de laatstbloeiende van alle *Tulipa* species, eind mei, begin juni. De slanke, helder roodoranje bloem steekt een stuk uit boven het lange smalle glanzend groene blad. De achterkant van de buitenste bloemblaadjes is geelbruin met olijfgroen en groen. Moeilijk te telen omdat de bollen zichzelf diep de grond in trekken, maar vermeerdert zich wel goed door zaad.



Bestelnr. 8259

p.st. 7.95

3 st. 22.50



Tulipa stapfii


Herkomst: West-Iran en Noord-Irak. Vernoemd naar Otto O. Stapf (1857-1933), een botanicus die zijn leven lang het geslacht *Tulipa* bestudeerde. Donker karmozijnscharlaken, bekervormige bloemen met een donkerviolette vlek in het hart. Die vlek is soms voorzien van een gele bies. Het blad is wasachtig met een gegolfde rand. Nauw verwant aan *T. systola*, soms ook als synoniem gezien.



Bestelnr. 1197

3 st. 3.75

5 st. 6.00




Tulipa sylvestris

(Synoniemen: *T. florentina*, *T. repens*,
T. tchitounyi en *T. thirkeana*)

Nederlandse naam: bostulp. Door Carl Linnaeus in 1753 voor het eerst beschreven. Herkomst: Iran, Noord-Afrika en Europa, ook in Nederland, maar waarschijnlijk verwilderd, stinzenplant. Eén, soms twee geurende heldergele 6 tot 8 cm lange bloem(en) met op de buitenste bloemblaadjes een groene gloed. De meeldraden van dit 30-40 cm hoge tulpje zijn geel. AGM in 2008.


Bestelnr. 1144	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Tulipa tarda

Intro: 1933 daarvoor jarenlang met de naam *T. dasystemon* door het leven gegaan. Herkomst: Tien Shan. De vier tot zeven kronkelige en glanzende bladeren vormen een rozet. De tot zes (gemiddeld twee à drie), stervormige bloempjes staan zo dicht open, dat het lijkt alsof ze een trosje vormen. De bloemkleur is wit met een groot geel hart, terwijl de basis aan de buitenzijde bruinachtig paars is. AGM in 1993.

Bestelnr. 1156	25 st.	3.50
	100 st.	13.00




Biologisch geteeld:

Bestelnr. 6990	10 st.	3.00
Bolomvang: 12	25 st.	7.00

Tulipa tetraphylla

Herkomst: Oost-Tien Shan en China (Dzungaria). Dit 15-20 cm hoge tulpje is nauw verwant aan *T. kolpakowskiana*, maar de bloemen zijn enigszins kleiner, geel van kleur met aan de buitenzijde purperen vlekjes. In 1875 beschreven door Eduard Regel. De naam doet vermoeden dat de *Tulipa* slechts vier blaadjes heeft, maar het kunnen er ook zeven zijn.


Bestelnr. 1158	5 st.	4.00
	10 st.	7.50



Tulipa 'Tiny Timo'

Een aantal jaar geleden werden kruisingen van *T. hageri* x *T. aucheriana* verricht door het Centrum voor Plantveredeling en Reproductie Onderzoek. Daaruit is onder andere dit vrolijke tulpje ontstaan, vernoemd naar Timo, onze bijna zeven jaar oude zoon. Een schitterend laag rood tulpje, waarvan het blauwe hart met een witte zweem verweven is.


Bestelnr. 1182 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00



Tulipa turkestanica

Intro: 1875. Herkomst: Centraal-Azië, Turkestan en Noordwest-China. Eén der vroegstbloeiende species. De bladeren zijn grijsgroen van kleur en het 20 cm hoge bloemsteelje is behaard. De wel twaalf spits toelopende witte bloempjes met ovale kroonbladeren zijn voorzien van een schitterend oranjegeel hart. Op de buitenste bloemblaadjes ligt een grijszwarte glans. Na de bloei verschijnen de prachtige zaaddozen. AGM 1993.


Bestelnr. 1160 **25 st. 3.00**
100 st. 11.50



Tulipa 'Velvet Lily'

T. eichleri x *T. acuminata* (?). Een spectaculaire vondst met een robuuste groeiwijze, terwijl het grillige van *T. acuminata* duidelijk aanwezig is. Helderrode bloemen met een zwart hart en gele vlekken op een 30 cm hoge bloemsteel.

Bestelnr. 8261 **5 st. 3.00**
10 st. 5.50
25 st. 13.00



Tulipa vvedenskyi

Vernoemd naar de Russische botanicus en taxonoom A.I. Vvedensky. Herkomst: Kuramingebergte, Zuidelijke Tien Shan, tussen Oezbekistan en Noord-Tadzjikistan. Tulpen die nog niet bloeien smaken zoet. Lokaal worden de tulpen door kinderen opgesnoept. Het blad is opvallend zeegroen gekleurd. De grote licht scharlaken tot oranje bloemen, die eind mei hun pracht tonen, hebben een geelbruin hart en paarse helmknoppen.

Bestelnr. 1110 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50




Tulipa whittallii

(Synoniem: *T. orphanidea* var. *whittallii*)

Intro: 1929. Herkomst: West-Turkije. Vernoemd naar Edward Whittall die een kwekerij exploiteerde in de buurt van Izmir. De naam werd al in 1920 gebruikt, maar is pas gepubliceerd in 1940. Van dit in april bloeiende tulpje zijn de binnenste bloemblaadjes helder oranje met naar de basis een donkere gloed, de buitenste bloemblaadjes zijn bruingeel met 'n groene gloed; de helmknoppen zijn bijna zwart. AGM in 1999.

Bestelnr. 1146 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50



Vinasse-kali

Een aanvullende bemesting met Vinasse-kali, tijdens en/of direct na de bloei van de bol- en knolgewassen geeft een betere ontwikkeling van het gewas in het volgende jaar.

Dosering : 50 gram per m².

Inhoud : 800 gram.

Bestelnr. 4701 **p.st. 6.95**



Alle ECOstyle-producten passen binnen de filosofie van natuurlijk tuinieren. Een veilig idee en een bewuste keuze om met respect om te gaan met milieu, mens en dier.




LELIEBLOEMIGE TULPEN



'Ballerina'

1980



Leliebloemige tulpen laten zich perfect combineren met vaste planten. Hun elegante bloemen met puntige bloembladen vormen een sierlijk schouwspel.

Bestelnr. 8309

10 st.

3.50

25 st.

8.25



'Moonlight Girl'

2004


Bestelnr. 8901

10 st.

4.00

25 st.

9.50



'White Triumphator'

1942


Bestelnr. 1373

10 st.

4.00

25 st.

9.50



'Ballade'

1953

Bestelnr. 8649

10 st.

3.50

25 st.

8.25

LELIEBLOEMIGE TULPEN (vervolg)




'Merlot'
2008

Bestelnr. 9998	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



'Red Shine'
1955

Bestelnr. 6182	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



'Flashback'
2000

Bestelnr. 6173	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



'Fly Away'
1999

Bestelnr. 9738	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



'Marilyn'
1976

2015

Bestelnr. 6990	10 st.	3.50
	25 st.	8.25

MEER TULPEN OP WWW.NIJSSENBULBS.NL

DUBBELE LATE TULPEN



'Angélique'
1959

Bestelnr. 1351 10 st. 4.00
 25 st. 9.50




'Mount Tacoma'
<1924

Bestelnr. 1355 10 st. 4.00
 25 st. 9.50



'Black Hero'
1984


Bestelnr. 8301 10 st. 4.50
 25 st. 10.75



Pioenbloemige tulpen hebben enorme bloemkronen met een overvloed aan bloembladen. Deze groep kwam pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw in de mode. Fantastisch op de vaas, statige bloemen in de border.


'Carnaval de Nice'

DUBBELE LATE TULPEN (vervolg)




Bestelnr. 9530

10 st.	4.00
25 st.	9.50



Bestelnr. 1921

10 st.	4.00
25 st.	9.50



Bestelnr. 6174

10 st.	4.50
25 st.	10.75




Bestelnr. 6175

10 st.	4.00
25 st.	9.50

DUBBELE VROEGE TULPEN

'Gerard Dou'
1960



De meeste Dubbele Vroege Tulpen zijn voornamelijk voortgekomen uit de stevige Murillo uit 1860. De bloemen zijn breder dan dat ze hoog zijn, met een volle bos bloembladen waardoor zij een uitbundig karakter hebben. Prima te gebruiken in potten en goed te combineren met voorjaarsbloeiers zoals vergeet-mij-niet en violen.

Bestelnr. 9994 10 st. 4.00
 25 st. 9.50

'Jan Steen'
1943



Bestelnr. 9993 10 st. 4.00
 25 st. 9.50

'Aga Kahn'
1942



Bestelnr. 6078 10 st. 4.00
 25 st. 9.50

'Paul Rubens'
1942



Bestelnr. 6084 10 st. 4.00
 25 st. 9.50

VOLOP AANBOD VAN HISTORISCHE CULTIVARS OP:

DUBBELE VROEGE TULPEN (vervolg)

'René Menard'

1952



Bestelnr. 6085

10 st.	4.00
25 st.	9.50

'Tailleux'

1960



Bestelnr. 6087

10 st.	4.00
25 st.	9.50

Premium Murillo Mix




Bestelnr. 9991

10 st.	4.00
25 st.	9.50

VIRIDIFLORA TULPEN



'China Town'
1988



Een in 1981 ingestelde groep waartoe tulpen met groene bloemen of groene tekeningen behoren. Al in 1613 werden door illustrators de groene tekeningen op de bloembladen opgemerkt. Vanwege het subtiele groen laat deze groep tulpen zich perfect combineren met uitbundig bloeiende vaste planten.

Bestelnr. 8303 10 st. 4.50
 25 st. 10.75



'Flaming
Springgreen'
1999

Bestelnr. 9528 10 st. 5.95
 25 st. 14.50



'Springgreen'
1969

Bestelnr. 1363 10 st. 3.50
 25 st. 8.25




'Greenstar'
2009

Bestelnr. 9740 10 st. 4.50
 25 st. 10.75

Alle aangeboden tulpen worden per 100 stuks nog voordeliger aangeboden op www.nijssenbulbs.nl

PARKIET TULPEN



Parkiet Tulpen zijn bekend sinds 1665. De bizarre bloemvormen met hun grillig gedraaide bloemblaadjes zijn ontstaan als spontane mutaties. Omdat de bloemen zelf zo uitbundig zijn, is het wellicht mooi wanneer ze iets verder uit elkaar worden geplant met fijnbladige bladplanten ertussen.



'Blue Parrot'
1937

Bestelnr. 9997	10 st.	4.50
	25 st.	10.75



'Green Wave'
1984



Bestelnr. 1367	10 st.	4.50
	25 st.	10.75



'Estella Rijnveld'
1954

Bestelnr. 8909	10 st.	4.50
	25 st.	9.50



'Black Parrot'
1937

Bestelnr. 1361	10 st.	4.50
	25 st.	10.75



'Vovos'
2015




Bestelnr. 6087	5 st.	9.50
Bolomvang 10	10 st.	17.50

GEFRANJERDE TULPEN




'Signature'



Een relatief nieuwe groep, in 1981 ingesteld. De bloemen hebben sierlijke gefranjerde bloembladen. Soms lijkt het alsof de bloem besprenkeld is met ijskristallen.

Bestelnr. 6179 10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Red Hat'

2007



Bestelnr. 6178 10 st. 3.50
25 st. 8.25




'Vincent
van Gogh'

2011



Bestelnr. 6180 10 st. 4.50
25 st. 10.75




'Green Jay'

2010




Bestelnr. 9739 10 st. 4.75
25 st. 11.25

FOSTERIANA TULPEN



Interessant vanwege de vroege bloei en de daarbij behorende lengte van de bloemsteel. De beste resultaten voor de meerjaren bloei zijn wel behaald met deze groep.




'Orange Emperor'

1962



Bestelnr. 9998	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



'Sweetheart'

1976



Bestelnr. 9999	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



'Exotic Emperor'

2001



Bestelnr. 8321	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



'Purissima'

1943



Bestelnr. 9348	10 st.	3.00
	25 st.	7.00




'Flaming Purissima'

1999




Bestelnr. 9346	10 st.	3.50
	25 st.	8.25

ENKELE LATE-, TRIUMF- EN DARWIN TULPEN




'Beauty of Spring'

2004



Bestelnr. 6991

10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Blackjack'

2008



Bestelnr. 6992

10 st. 4.00
25 st. 9.50



'Candy Prince'

2001



Bestelnr. 6993

10 st. 4.00
25 st. 9.50



'Lalibela'

1999



Bestelnr. 6995

10 st. 3.50
25 st. 8.25




'Havran'

1998



Bestelnr. 6994

10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Silver Dollar'

1984



Bestelnr. 6996

10 st. 4.00
25 st. 9.50

De eenvoud zelve! De klassieke bloemvorm, zoals we een tulp kennen en zouden tekenen.



Uit ervaringen en diverse proeven is gebleken dat dit soort geschikt is om meerdere jaren te bloeien zonder dat deze na de bloei opge-rooid dient te worden. Voorwaarden zijn o.a. dat het loof volledig kan afsterven en de bol op een drogere bodem kan overzomeren. Over het algemeen lukt dat goed tussen de beplanting in de border. Een aanvullende bemesting direct na de bloei is zeker aan te bevelen.

ENKELE LATE-, TRIUMF- EN DARWIN TULPEN (vervolg)



Bestelnr. 8305 10 st. 4.50
 25 st. 10.75



Bestelnr. 1917 10 st. 3.00
 25 st. 7.00



Bestelnr. 9743 10 st. 3.50
 25 st. 8.25



Bestelnr. 9741 10 st. 3.00
 25 st. 7.00



Bestelnr. 9356 10 st. 3.00
 25 st. 7.00



Bestelnr. 6210 10 st. 3.00
 25 st. 7.00



Bestelnr. 1383 10 st. 4.00
 25 st. 9.50



Bestelnr. 9527 10 st. 3.50
 25 st. 8.25

Vaste Planten



Een nog steeds groeiend assortiment met de beste nieuwkomers, vele klassiekers en favorieten. Jaarrond te bestellen, of bestel ze eenvoudig mee met de bloembollen in de herfst.

Bijvoorbeeld:

Centaurea montana 'Black Sprite'

Een bijzondere bergkorenbloem met opvallende, curieus gevormde zwarte bloemen. Prima winterhard, op een zonnige standplaats en doorlatende grond.

Bestelnr. 400770 p.st. **4.00**

Clematis



Clematissen zijn fantastische klimplanten met een enorme variatie in kleuren, bloemvormen en toepassingsmogelijkheden. In Nederland zijn twee soorten inheems, Clematis vitalba, de bosrank en Clematis viticella, de Italiaanse clematis. Uit het enorme aanbod hebben wij ongeveer tachtig soorten gekozen. In dit assortiment zijn veel nieuwigheden opgenomen, maar ook enige klassiekers ontbreken niet.

Bijvoorbeeld:

Clematis 'Princess Kate'

Sterke zomerbloeiër uit de Texensis Groep.

Bestelnr. 610045 p.st. **11.50**

Biologisch gekweekte rozen



Uit de collectie 100 % biologisch gekweekte rozen van Rozenkwekerij De Bierkreek uit Zeeland, is dit aanbod samengesteld waarbij de gezondheid van de planten als belangrijkste uitgangspunt is gehanteerd. Natuurlijk hebben geur, doorbloeï en schoonheid ook een grote invloed op de keuze gehad. **Zo is de lijst van 84 ontstaan.**

Rozen die zich zonder bestrijdingsmiddelen ontwikkelen tot mooie gezonde planten. Biologisch gekweekte rozen zijn sterker, hebben meer weerstand en zijn niet opgejaagd met kunstmest, waardoor ze beter vertakt zijn en een sterker wortelstelsel hebben.

Bijvoorbeeld:

Klimroos 'Ghislaine Feuerwerk'

Mooie, gezonde, lage, herbloeiende rambler met leuke botteltjes.

Bestelnr. 600070 p.st. **16.95**

Tuingereedschap van topkwaliteit



De Tuinheeren voorzien ons van tuingereedschap waarvan je meteen voelt en ziet hoe goed het gemaakt is. Bijvoorbeeld:

Ergonomische snoeischaar Bahco PX

Minder spierpijn, minder vermoeiend en meer comfort. Gesmeed, Zweeds stalen mes voor een maximale snoeicapaciteit van 20 mm.

Bahco PX-M, rechtshandig **Bestelnr. 4715** **49.00**

Bahco PX-ML, linkshandig **Bestelnr. 4717** **49.00**

ECOstyle[™]

Van nature bewust!

Breng de natuur in uw tuin met ECOstyle-producten!

Al 45 jaar is ECOstyle het merk voor natuurlijk tuinieren in Nederland. Met een breed pakket aan ecologisch verantwoorde producten verrijkt ECOstyle uw tuin tot een kleurrijk en levendig stukje natuur. De producten van ECOstyle ondersteunen de natuurlijke kringloop in de tuin voor een rijk en gezond bodemleven. Daarnaast stimuleert een gezond bodemleven de natuur in uw tuin. Een kleurrijke, levendige tuin is het resultaat!

ECOstyle, van nature bewust!



volg ons op twitter
@ECOstyleTuin









www.ecostyle.nl

consument@ecostyle.nl



LEGENDA





Verklaring van de gebruikte symbolen:

-  (Her)introductie in 2015.
-  Nijssen Bulbs Keurmerk
Duurzaam geteeld,
met respect voor het milieu.
-  Gemiddelde hoogte in cm.
-  De bloei valt in deze periode,
opgave in maanden.
-  Geadviseerde plantafstand in cm.
-  Gemiddelde plantdiepte in cm.
Waarde geeft de diepte aan
van de onderkant van de bol.
-  Herfstbloeiër.
-  Bolomvang in cm.
De maat is de omtrek van de bol
direct na het rooien. Door vocht-
verlies kunnen de bollen krimpen
naarmate de tijd in de herfst
vordert. De grootte wordt gemeten
met een bollenmaat:



Wanneer er grootte I. wordt aangegeven dan ontvangt u de voor dit seizoen grootst leverbare bollen, die onder normale omstandigheden tot bloei komen.

Voorkeurplaatsing:

-  Voor een zonnige standplaats.
-  Voor een licht beschaduwde standplaats.
-  Voor in de halfschaduw.
-  Verdraagt volledige schaduw.

