

Bol- en Knolgewassen

Een Nieuwe Oogst

Peter C. Nijssen

Bijzondere bol- en knolgewassen

Sportparklaan 25a
2103 VR HEEMSTEDÉ

Tel.: 023 - 5471056

Fax: 023 - 5282208

Correspondentie-adres:

Postbus 653
2100 AR HEEMSTEDÉ

www.pc-nijssen.nl

info@pc-nijssen.nl



Catalogus 2013

ONS AANBOD GROEIT VERDER OP HET WEB

Vaste Planten



Een assortiment van ruim 300 soorten vaste planten, waarbij als uitgangspunten voor het aanbod zijn geweest:

- * De beste nieuwkomers
- * soorten die niet in een tuin mogen ontbreken
- * klassiekers
- * of onze favorieten!

Bloembollen voor in huis



Mooie Amaryllis, heerlijk geurende geprepareerde hyacinten en narcissen voor in huis.

Waaronder de 'Chinese Sacred Lily', de narcis die in delen van China met Nieuwjaar als traditie onder andere wordt gebruikt in decoraties.

Tuingereedschap van topkwaliteit



De Tuinheeren voorzien ons van tuingereedschap van topkwaliteit. Zij selecteren tuingereedschap waarvan je meteen voelt en ziet hoe goed het gemaakt is. Gereedschap waarmee je met plezier de tuin in gaat. Producten waar de vakman zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt.

Biologisch organische meststoffen



Uw tuin is natuur, dit is een belangrijk onderdeel van de filosofie van Ecostyle. Natuurlijk tuinieren met de bewuste keuze om met respect om te gaan met milieu, mens en dier.

Heemstede, augustus 2013

Catalogus 2013

De nieuwe catalogus staat bol van nieuwigheden, meer dan 100 soorten zijn (op)nieuw opgenomen in het assortiment.

Voorjaar 2013

Het voorjaar van 2013 gaat de boeken in als een van de koudste in de geschiedenis van de weermetingen. Werkend met een natuurproduct is het onvermijdelijk om dit onopgemerkt voorbij te laten gaan. De sneeuwklodjes achtervolgden ons tot ver in maart en we hebben nog nooit zoveel krokussen in de Keukenhof gezien. Uiteindelijk herstelt de natuur zich altijd maar de gevolgen zijn tot op heden te merken op de bloembollenkwekerijen.



Ons aanbod groeit

Sinds enige jaren bieden we op www.pcnijssen.nl een toonaangevende collectie Historische Bol- en Knolgewassen aan, alsmede een enorme keuze in zelden aangeboden narcissen. Afgelopen voorjaar is daar nu ook een bescheiden assortiment van 300 soorten vaste planten aan toegevoegd. De plannen zijn er om dit komend jaar uit te breiden tot ruim 1000 soorten. U kunt het huidige aanbod met uw bloembollen mee bestellen.

15 november 2013

Voor deze datum zien wij uw gewaardeerde bestelling graag tegemoet. U kunt uw bestelling ook op het tuincentrum in Heemstede afhalen. Eventueel nemen wij het met plezier voor u mee naar een van de ondergenoemde tuinevenementen. Of u laat het pakket gewoon bij u thuisbezorgen voor slechts een kleine bijdrage in de verzendkosten, die wij volledig voor ons rekening nemen bij een bestelling vanaf € 125,00 geleverd op een adres in Nederland.

Veel lees- en bestelplezier!
Gert-Pieter & Ineke Nijssen



En wij verwachten
in augustus nog
een broertje!

Lune, Timo en Hugo Nijssen

Op de volgende evenementen zijn wij aanwezig met een representatieve collectie bijzondere bol-en knolgewassen.

14 en 15 september 2013 Hex Gardens festival of Plants, Kasteel Hex, België

11, 12, 13 oktober 2013 De Tuindagen van Beervelde, België

Allium geniet een grote mate van welverdiende populariteit, de grote diversiteit in bloemvorm, grootte kleur en toepassing is ongekend. Een stroom aan nieuwe cultivars is niet te stuiten. Het geslacht *Allium* omvat waarschijnlijk al meer dan 1000 species en cultivars en komt verspreid voor over het Noordelijk Halfrond, Klein- en Midden-Azië, alsook de landen rond het Middellandse Zeegebied en het westen van Noord-Amerika zijn belangrijke groeiplaatsen.

In Nederland kennen wij ook enige verwilderde soorten zoals daslook, moeslook en slangenlook.

Vele soorten, zowel de oorspronkelijke - alsook de gecultiveerde - alliums hebben ondergronds een bol, die afhankelijk van de soort een omtrek kan bereiken van zo'n 3 cm tot wel 40 cm. Andere soorten, waaronder enige kruiden en groenten, hebben ondergronds een verdikte wortel, ook wel 'schacht' genoemd. De kleinbollige alliums, maar ook de alliums die een verdikte wortel vormen, zijn zeer geschikt voor verwildering. De grofbollige alliums kunnen meerdere jaren in de grond blijven.

Hoelang is afhankelijk van de grondsoort. Op een doorlatende zandgrond blijven de sieruien het langst goed, hoewel de bloemen in de loop van de jaren kleiner worden. Als u niet meer tevreden bent over de grootte van de bloemen, kunnen de bollen na de bloei gerooid worden. De bewaartemperatuur ligt rond de 23-25 graden. In november kunnen ze weer worden geplant, liefst op een ander plekje in verband met mogelijk aanwezige ziektekiemen.




Allium altissimum

Intro: 1884. *A. altissimum* treffen we nog aan in Centraal-Azië, het noordoosten van Iran, maar ook in het noordwesten van Afghanistan. Een spectaculaire allium die zijn niet al te grote, 10-12 cm in doorsnede paarse bolvormige bloemen op stevige tot 2 meter hoge stelen draagt. Fantastisch tussen hoge siergrassen waarbij de bloemen tussen het loof van het gras een verrassende combinatie vormen.



Bestelnr. 8003

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Allium 'Ambassador'


Overtuigd winnaar van de Alliumkeuring bij de K.A.V.B. in 2013. Een schitterende selectie van Kwekerij A. Langedijk uit Zwaagdijk. De beste nieuwkomer van de laatste jaren. De kruisingsouders zijn *Allium stipitatum* x *Allium giganteum*.

Een indrukwekkende 100 cm hoge allium waarvan de grote bolvormige bloem de dichtheid heeft van *Allium giganteum* en een mooie egale paarsvioletten kleur heeft. Door die dichtheid is een zeer lange bloei te verwachten. Prima snijbloem. Het forse glanzende blad is lang aantrekkelijk.

Bestelnr. 096

p.st. 3.50

3 st. 9.75



Allium amethystinum 'Red Mohican' 2013


Een nieuwe bordeauxrode allium waarbij zich ten tijde van de bloei een forse kuif ontwikkelt waaruit witte bloempjes ontluiken. Tot aan het moment van bloeien is de bloemsteel gebogen, pas voor de bloei strekt de steel zich uit.

A. amethystinum is inheems op rotsgronden in het oosten en midden van de mediterrane gebieden.

Bestelnr. 9901

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Allium ampeloprasum


(Synoniem: *A. halleri*)

Ampeloprasum betekent: in wijngaarden groeiende looksoort. Intro: 1753. Herkomst: Zuid-Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië tot in de Kaukasus. De lengte van de bloemstelen is variabel, van 50 cm tot 100 cm. Het bloemscherm bestaat uit vele witte, soms roze bloemetjes. De wildvormen zijn in Zuid-Europa een ware delicatesse, waar ze rauw worden gegeten. Onder de naam 'Pingpong' maakt deze sierui de laatste jaren een opmars in de snijbloemproductie.

Bestelnr. 105

5 st. 4.50


10 st. 8.00



Allium ampeloprasum var. babingtonii

Een rariteit die voorkomt langs de westkust van Ierland. Mogelijk een overblijfsel uit oude culturen van kloosters en vestingen. De vele broedbolletjes die zich als groene druppels tussen de lichtroze bloemen bevinden, hebben de bijzondere eigenschap zelf ook weer broedbolletjes aan te kunnen maken. Decoratief en zwierig op de achtergrond in een border, maar ook als snij- en droogbloem. Vernoemd naar de Britse botanicus C.C. Babington.

Bestelnr. 9426 **p.st. 3.95**
3 st. 11.25




Allium amplexans 'Graceful Beauty'

(Synoniemen: *A. attenuifolium*, *A. occidentale* en *A. monospermum*)

Intro: 1857. *A. amplexans* is een zeer makkelijk groeiende species uit Noord-Amerika. De tot 40 cm hoge bloemstelen worden door twee tot vier bladeren omhuld, hetgeen voordat de bloei in april aanvangt, afsterft. De kogelvormige bloemtrossen bestaan uit talrijke witte bloemen, die nadat ze bestoven zijn, flinterdun worden. Het aanbod is van een mooie uniforme selectie.

Bestelnr. 098 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50




Allium angulosum

(Synoniem: *A. acutangulum*)

Intro: 1753. Herkomst: grote delen van Midden- en Oost-Europa en Siberië. De stevige ca. 40 cm hoge bloemsteel is duidelijk kantig (angulosum betekent: kantig). Het half kogelvormige bloemscherm bestaat uit tientallen zachtliila bloemetjes. De drie tot zes glanzende bladeren blijven ook gedurende de bloei een lange tijd groen.

Bestelnr. 9312 **3 st. 3.75**
5 st. 6.00




Allium angulosum 'Sara'

2013

Uit de variabele soort *A. angulosum* heeft Piet de Jong deze rijk bloeiende vorm met lilapaarse bloemen geselecteerd. Vanwege het frisse lichtgrijze blad dat gedurende de hele zomer aantrekkelijk blijft en zijn compactere groeiwijze, is de allium ook prima voor potbeplanting te gebruiken.



Bestelnr. 9427	3 st.	4.95
	5 st.	7.50




Allium atropurpureum

Herkomst: de Balkan. De in 1800 geïntroduceerde allium heeft een bloemkleur die in de natuur weinig voorkomt, namelijk donker purperrood (atropurpureus). De dicht bijeen geplaatste stervormige bloempjes vormen een half cirkelvormig scherm met een doorsnede van zo'n 5-8 cm. Tijdens de uitbloei neemt het bloemscherm een pluimbal-achtige vorm aan. Lang houdbare snijbloem met een aangename geur. Mooi in combinatie met groengele bloemen zoals *Alchemilla*.



Bestelnr. 109	5 st.	3.50
	10 st.	6.50




Allium backhousianum

Spectaculaire, hoge witte allium samen met *A. aflatunense*, *Aquilegia* en *Trollius* aangetroffen in het Fergana-gebergte, op een relatief vochtige bodem. Talrijke 1,5 cm lange groenigwitte bloempjes vormen samen een compacte bolvormige bloeiwijze. De echte schoonheid komt pas na de bloei tot uiting. De glimmend groene zaaddozen vormen een stevige, compacte bol die lang zijn sierwaarde behoudt.




Bestelnr. 9428	p.st.	4.50
	3 st.	12.75



Allium 'Beau Regard'

Een hybride, ontstaan door het kruisen van *A. macleanii* en *A. christophii*, dat in 1959 verricht werd door J.R. Bijl van Duyvenbode. Dit zijn dezelfde kruisingsouders als die van *A. 'Globemaster'*. Deze nakomeling geeft bijzonder stevige 90-100 cm hoge stelen. De asterviolette bloem behoort tot een van de grotere alliums, de bloem kan een grootte bereiken een van wel 25 cm in doorsnede.

Bestelnr. 111 p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium caeruleum

(Synoniem: *A. azureum*)

Intro: 1773. Hemelsblauwe stervormige bloempjes die een stevige bolvormige bloeiwijze vormen met een doorsnede van zo'n 4 cm. Een 40 cm hoge snijbloem, die half juni kleur gaat tonen.

Beschrijvingen dateren van 1830. Herkomst: Oost-Europa, ten noorden van de Kaspische-Zee alwaar ze voorkomen in steppen en zoutmoerassen. Geschikt voor verwildering. Bij opkomst zien de bladeren eruit als grassprietjes, die vrijwel voor de bloei zijn verdwenen.

Bestelnr. 113 25 st. 4.50
100 st. 17.00



Allium caesium


(Synoniem: *A. urceolatum*)

Intro: 1830. Herkomst: Turkestan-gebergte bij Zaamin in Oezbekistan. De bloem lijkt een beetje op *A. caeruleum* maar is groter, terwijl de plant lager blijft en iets vroeger bloeit.

De bloemkleur varieert van licht- tot donkerblauw met een donkere middennerf.

Het geheel is voorzien van een groenige gloed. Een relatief makkelijk groeiend soort.

Bestelnr. 115 3 st. 3.75
5 st. 6.00




Allium callimischon subsp. callimischon

Intro: 1835. Herkomst: Noord-Griekenland (Peloponnesus). Een najaarsbloeiende species met witte bloemen voorzien van een duidelijk waarneembare roodbruine nerf. De bladdelen bevatten de nieuwe bloeiwijze die vanaf eind augustus ontluikt.



Bestelnr. 117

3 st. 6.75
5 st. 11.00




Allium 'Cameleon'

In 2000 ontving de heer W. de Goede materiaal van Wayne Roderick, destijds werkzaam bij de botanische tuin van de Universiteit van Californië. De zachtroze bloemen, die tijdens de bloei diverse kleurstadia doorlopen worden gedragen door 20 cm hoge bloemstelen. Het donzige blad is harig aan de zijkant. Overigens wordt getwijfeld of de plant van origine Amerikaans is. Verwildert goed.



Bestelnr. 9133

10 st. 3.00
25 st. 7.00




Allium carinatum subsp. pulchellum

Intro: 1810. Herkomst: Zuidoost-Europa en West-Azië. De oorspronkelijke vorm *A. cirrhosum* (één van de synoniemen) heeft een bloeiwijze die behalve bloemetjes ook broedbolletjes heeft. De bloemknop blijft lange tijd 'verstopt' aan het eind van de bloemsteel. Wanneer de knop openspat ontluiken schitterende paarse klokvormige op fragiele steeltjes bungelende bloemen, die een bijna bolvormig geheel tonen. Na uitbloei richten de dan bijna verdroogde klokjes zich op en verdwijnen de schutbladeren.



Bestelnr. 121

10 st. 4.95
25 st. 12.00



Allium carinatum subsp. pulchellum 'Album'


Intro: 1969. Een zuiver witte vorm, ook in de zomer bloeiend. Heeft evenals de parse species een Award of Garden Merit van de Royal Horticultural Society ontvangen.

Leuk snijbloempje. Bijzonder geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 123

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Allium carolinianum

2013

(Synoniemen: *A. blandum*, *A. polyphyllum*, *A. obtusifolium* en *A. thomsonii*)


In 1804 beschreef mr. De Candolle deze allium met de naam: carolinianum in de veronderstelling dat deze species daadwerkelijk uit Carolina afkomstig zou zijn. Onterecht, want dit uitje is dezelfde als die in de Himalaya aangetroffen *A. blandum*.

Het aanbod betreft een selectiepartij waarbij de sterke bloemsteel een kogelvormige bloeiwijze van zo'n 3 cm in doorsnee draagt, die dicht bezet is met cilindervormige donkerroze, heerlijk geurende, bloemetjes.

Bestelnr. 127

3 st. 3.75

5 st. 6.00



Allium cepa var. viviparum


(Synoniem: *A. proliferum*)

Nederlandse naam: Egyptische ui of boomui. Elk broedbolletje dat vrijwel het hele jaar kan worden geplant, ontwikkelt zich spoedig tot een bizarre plant. We treffen de peervormige bolletjes aan in de bladoksels en in de 'bloedelen'; ze moeten regelmatig worden geplukt. Zowel de stengel als de bolletjes zijn te gebruiken als keukenkruid bij visgerechten en stoofschotels.

Bestelnr. 8469

5 st. 5.25

10 st. 10.00




Allium cernuum

(Synoniem: *A. recurvatum*)

Intro: 1800. Kunstig gedraaide ca. 25 cm lange bloemstelen worden omgeven door lange, smalle bladeren. Het bloemscherm, 5 cm in doorsnede, bestaat uit donkerpaarse bolvormige, knikkende bloemen met uitstekende meeldraden. Een echte bijenplant. Tijdens de uitbloei worden de bloemtopjes teruggevouwen (recurvatus betekent teruggekromd). Een allium met een lange bloeitijd, van eind mei tot in augustus. Herkomst: het Alleghany gebergte in Wyoming en ook plaatselijk in Canada en Mexico. Ook geschikt voor een wat vochtigere standplaats.


Bestelnr. 129 10 st. 4.95
25 st. 12.00



Allium cernuum -White Max-

De hoge vorm uit de V.S. bloeit langdurig met witte bloemen voorzien van een roze zweem. De grote bloemschermen verschijnen vanaf eind mei. Vormt al snel een stevige pol waarbij de bloemstelen sierlijk gebogen boven het loof verschijnen. Gedijt ook prima op een iets vochtigere standplaats.


Bestelnr. 9433 3 st. 4.95
5 st. 7.50



Allium chloranthum

In eerste instantie lijkt het of we hier te maken hebben met *A. flavum*. Echter, het sierlijke bloemscherm van *A. chloranthum* is dichter, de talrijke bloemen zijn groengeel van kleur en ook de bloeitijd is ruim een maand eerder. Mooie selecties en kruisingen met *A. convallarioides* zijn in ontwikkeling. Oorspronkelijk afkomstig uit de provincie Gaziantep in Turkije. Makkelijk groeiend op een doorlatende bodem.

Bestelnr. 076 3 st. 7.50
5 st. 12.00




Allium christophii

(eigenlijk: *A. cristophii*, Synoniem: *A. albopilosum*)

Intro: 1884. De bolvormige bloeiwijze heeft een diameter van wel 20 cm. Deze bevindt zich aan het einde van een krachtige tot 50 cm hoge bloemsteel die wordt omgeven door bandvormige behaarde bladeren. De bloem bestaat uit wel honderd glanzende violette bloemetjes, met 'n unieke metaalachtige glans, waarvan de topjes elkaar nauwelijks raken. Het geheel lijkt door een kunstenaarshand te zijn verweven. Uitermate geschikt als droogbloem. Herkomst: noordwesten van Iran en het Russische deel van Centraal-Azië.


Bestelnr. 131 **10 st. 4.50**
25 st. 10.50



Allium convallarioides -Pink form-

Allium convallarioides komt voor in Iran, Irak en delen van de Kaukasus tot in Centraal-Azië. Een luchtig bolvormig bloemscherm, met individuele op Lelietjes-der-dalen lijkende bloemetjes, ontluikt uit een met vliesje omsloten bloemknop. De bloemen hebben een duidelijk zichtbare nerf zowel op de buitenkant als op de binnenkant. De vier tot vijf smalle blaadjes zijn korter dan het 40 tot 60 cm hoge bloemsteeltje. Meestal wordt de witbloeiende vorm aangetroffen, het aanbod bestaat uit de mooie roze vorm.

Bestelnr. 9660 **p.st. 3.50**
3 st. 9.75




Allium cowanii

A. cowanii is nauw verwant aan *A. neapolitanum*.

De bloemsteel is duidelijk driekantig. De sneeuwwitte bloemkransen bestaan uit tientallen stervormige kortgesteelde bloemetjes met scherp contrasterende groene helmknopjes. Bij opkomst komt de bloemsteel bijna kurkentrekkervormig omhoog om vlak voor de bloei vrijwel recht te groeien. Eén en al verwarring rondom de naamgeving.

Wat blijkt, *A. cowanii* bestaat niet! Volgens Dilys Davis verliet *A. neapolitanum* Europa als een Italiaan en is als Zuid-Amerikaan geïntroduceerd door de Peruviaanse relatie Cowan.

Bestelnr. 133 **25 st. 2.50**
100 st. 9.00




Allium crenulatum

(Synoniemen: *A. vancouverense*,
A. watsonii en *A. cascadiense*)

Intro: 1899. Deze leuke kleine allium heeft twee sikkelvormige bladeren die tot in de bloeitijd groen blijven. De bloemen zijn wit met een donkerroze middenstreepje. De bloemsteel is aan twee kanten plat en is aan de randen getand (crenulatus betekent: gekarteld, getand). Komt het best tot zijn recht in doorlatende grond op een zonnige standplaats. Herkomst: van het Cascade-gebergte in Washington tot aan Vancouver-Island in Canada.

Bestelnr. 119 3 st. 4.95
5 st. 7.50




Allium crenulatum -Pink form-

Een roze mutant die misschien ook wel aangetroffen zou kunnen zijn door de jaarlijks duizenden toeristen die de Hurrican Ridge in de Olympic Mountains bezoeken. Daar zal *A. crenulatum* niet over het hoofd gezien kunnen worden.

Negen maanden per jaar ligt er op de allium sneeuw, die sneeuw zorgt voor de droogte in de winter en voldoende vocht in de groeiperiode.

Bestelnr. 9661 p.st. 3.50
3 st. 9.75




Allium cyathophorum var. farreri

(Synoniem: *A. farreri*)

Toefjes smalle ca. 20 cm lange blaadjes omvatten de driekantige bloemsteeltjes. Het knikkende bloemscherm bestaat uit een twintigtal violetrode klokvormige bloemetjes met zeer smalle bloemblaadjes. Een leuke allium die zich erg makkelijk uitzaait. Herkomst: West-China (Kansu). Intro: 1914.

Bestelnr. 139 5 st. 3.75
10 st. 7.00



Allium cyaneum

(Synoniem: *A. purdomii*)


Intro: 1875. Voor het eerst aangetroffen door de Russische botanicus Przewalski in de provincie Kansu (West-China) en werd door Reginald Farrer verspreid.

In 1914 werd William Purdom op een expeditie begeleid door Farrer. In hetzelfde gebied troffen ze wederom een *A. cyaneum* gelijkende vorm aan.

Voor de moeite werd toen het synoniem naar Purdom vernoemd. Een fantastische miniatuur die bij opkomst op een graspolletje lijkt.

In juli verschijnen de blauwe klokvormige bloempjes. Ideaal voor in de rotstuin of voor in een trog.

Bestelnr. 8477 3 st. 7.50
5 st. 12.00




Allium decipiens

Dit is één van de vele species uit Centraal-Azië die ook in China wordt aangetroffen. Aan de tot 60 cm hoge stelen ontwikkelen zich bolvormige bloeiwijzen bestaande uit glanzend zacht lilaroze stervormige bloempjes. Het aantrekkelijke glanzende blad blijft laag bij de grond.

Uniek is dat de *A. decipiens*, een hoge sierui, geschikt is voor de schaduwborder.

Bestelnr. 9137 p.st. 2.95
3 st. 8.25



Allium 'Eros'

Intro: 2006. Een selectie uit *A. unifolium*, die eerst bekend was als *A. unifolium* 'Chris Dwarf'.

De tot 10 cm grote bloemschermen bestaan uit wel meer dan vijftig blauwroze, stervormige bloemetjes op 35 cm hoge stevige bloemstelen. Uit iedere bol verschijnen meerdere bloemstelen, dit alles zorgt voor een rijk bloeiend geheel, waarbij het blad gedurende de bloei aantrekkelijk blijft.

Bestelnr. 9663 10 st. 4.50
25 st. 10.50




Allium falcifolium

(Synoniemen: *A. falcifolium* var. *demissum*,
A. falcifolium var. *breweri* en *A. breweri*)

Intro: 1882. Herkomst: het westen van de Verenigde Staten. Het bloemscherm bestaat uit tot wel 30 klokvormige purperroze bloemetjes waarvan de bloemblaadjes smal zijn. De tamelijk vlezige bladeren blijven gedurende een lange tijd groen. Ze gedijen bij voorkeur op een niet te droge bodem.


Bestelnr. 143 **10 st. 3.50**
25 st. 8.25



Allium fistulosum

Reeds in 1753 wordt deze stengelui, ook wel grove bieslook, beschreven. Tientallen bloemetjes vormen een kogelronde bloeiwijze met een witgele kleur. Deze kleur ontstaat door het overheersen van de geelachtige helmknoppen. De buisvormige (fistulosus) bladeren zijn vlezig. De plant is toepasbaar in de border, kruiden- en moestuin. Oorspronkelijk kwam deze ui voor in het Verre Oosten. In China werd het onderste gedeelte van de bloemsteel geblancheerd. Volgens zeggen zouden in het wild geen exemplaren meer voorkomen.


Bestelnr. 8007 **5 st. 3.75**
10 st. 7.00



Allium 'Firmament'

Van beide ouders hebben ze alleen de goede eigenschappen meegekregen: van *A. atropurpureum* de intens donker purperen kleur en van *A. christophii* de schitterende verweven stervormige bloemetjes met dat vleugje metalliek. Het half bolvormige bloemscherm heeft een diameter van 10-12 cm. De forse bloemsteel is 80 cm hoog. Een perfecte en geurende snijbloem, en laat zich in de border goed combineren met bijvoorbeeld grijsbladige planten.

Bestelnr. 145 **3 st. 4.95**
5 st. 7.50




Allium flavum

(Synoniem: *A. webbii*)

Intro: 1753. Een species die verspreid voorkomt van Zuid-Europa tot aan het zuiden van Rusland, maar niet op het Iberische schiereiland. Ze groeit op droge, stenige plaatsen van zeeniveau tot op 2500 meter hoogte. Cilindervormige, blauwgroene bladeren omvatten de ongeveer 30-40 cm hoge stengel. Het fraai knikkende bloemscherm bestaat uit vele goudgele bloemetjes, die naarmate de uitbloei vordert, omhoog komen. Heerlijk fris geurend. Bruikbaar als snij- en droogbloem. Verwildert goed.


Bestelnr. 147	5 st.	3.00
	10 st.	5.50



Allium flavum subsp. tauricum

Ookwel *Allium tauricum* Rchb en komt oorspronkelijk van de Krim. De meest betoverende kleuren komen voor in deze partij, prachtige pasteltinten, brons, oranje, limoengeel, al dan niet bemeeld, het is werkelijk subliem. De kleuren tonen op elk moment van de dag en bij elke andere lichtval weer verschillend. Heerlijk fris geurend. Bruikbaar als snij- en droogbloem. Verwildert goed.

Bestelnr. 8009	p.st.	2.95
	3 st.	8.25




Allium giganteum

(Synoniem: *A. procerum*)

Eén der grootste en opvallendste alliums met oersterke tot 175 cm hoge bloemstelen. De blauwgroene glanzende en riemvormige bladeren zijn ca. 8 cm breed en tot 30 cm lang. De gladde bloemsteel torst een zeldzaam mooie, zuiver bolvormige bloeiwijze met meer dan 100 individuele blauwachtig violette bloemetjes. Sinds 1883 komt *A. giganteum* in cultuur voor. Herkomst: o.a. Noordoost-Iran, Noordwest-Afghanistan.

Bestelnr. 149	p.st.	2.95
	3 st.	8.25



Allium 'Gladiator'

Deze hybride is ontstaan uit een kruising van *A. aflatunense* auct. x *A. macleanii* en werd in 1981 door de heer W. Hey geregistreerd. De tot 120 cm hoge bloemsteel draagt een compacte bolvormige bloeiwijze, gevuld met vele paarsroze stervormige bloemen. Grijsgroen liggend blad.

Een prima houdbare snijbloem, welke op grote schaal zodanig geteeld wordt.

Bestelnr. 151	3 st.	6.00
	5 st.	9.50




Allium 'Globemaster'

In 1959 werd, door de heer J. Bijl, *A. macleanii* gekruist met *A. christophii*. (Dus niet: *A. stipitatum* x *A. giganteum*, zoals wordt beweerd). Uit de zaailingen die ontstonden, werden *A. 'Beau Regard'* en *A. 'Globemaster'* geselecteerd. Laatstgenoemde viel op door de zeer grote glanzende bladeren en buitengewoon grote asterviolet gekleurde bloem (doorsnede tot 25 cm).

De bloeitijd is vanaf begin juni en houdt langdurig aan. Super snijbloem!


Bestelnr. 153	p.st.	4.50
	3 st.	12.75



Allium x 'Globus'

Een hybride, waarvan de ouders volgens Janis Ruksans *A. karataviense* en *A. stipitatum* zijn. Het is een zeer attractieve plant. De bladeren blijven lang groen. De zachtroze bloem met 'n blauwe gloed is bolvormig en heeft een diameter van ca. 10 cm. Vanwege zijn hoogte, een allium met een zeer bruikbare lengte voor halverwege in de border. Leuke snijbloem!






Bestelnr. 155	5 st.	3.50
	10 st.	6.50



Allium huber-morathii

Winnaar van de BolleNoord-KAVB bokaal 2011. Alleen voorkomend op een plekje in het Pontisch gebergte, in de buurt van Ankara, Turkije. Nauw verwant aan *A. carinatum* var. *pulchellum*, duidelijk verschillend zijn de kleinere bloempjes die in groten getale in het bloemscherm zitten en de vroegere bloeitijd. De bloemen zijn lieflijk zachtroze en verschijnen in juni-juli. Voor een zonnig plekje op doorlatende grond, of in een potje.

Bestelnr. 9139 **p.st. 2.95**
3 st. 8.25






15-20  6-7  5  5  1. 



Allium 'Jackpot'

Een stevige, grootbloemige allium. Opvallend is het gezonde glanzende groene blad tijdens de bloei. Uit de enorme ronde glanzende bloemknop ontluikt een bolvormige, compacte bloeiwijze met violetblauwe stervormige glimmende bloemetjes. Een allium die garant staat voor een langdurige bloei of vaasleven.

Bestelnr. 8239 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00

100-120  5-6  30  15  12 



Allium jesdianum 'Akbulak'

Een geselecteerde wildvorm van *A. jesdianum* uit de nabijheid van Akbulak, een plaats in Kyrgystan. De 70-90 cm hoge bloemsteel is aan de onderkant zeer donker en geribd. De kleur, van de tot 12 cm in doorsnede bloem, is lila met mooie witte meeldraden en purperen helmknopjes.

Bestelnr. 8011 **10 st. 4.95**
25 st. 11.25


70-90  5-6  20  12-15  10 



Allium jesdianum 'Purple King'

De laatstbloeiende *A. jesdianum*. In 1983 onder de naam *A. rosenbachianum* vanuit de botanische tuin in Moskou bij Janis Ruksans terecht gekomen. Totdat de naam 'Purple King' werd gegeven, ging deze allium als de 'Moskou-plant' door het leven. De geribde bloemsteel waarvan de onderkant van de steel donker is gekleurd, draagt een compact donkerpaars bloemscherm met een doorsnede van 8 tot 10 cm. Beste snijbloem.


Bestelnr. 179 **10 st. 4.95**
25 st. 11.25



Allium karataviense

In 1875 werd de 'puinlook' voor het eerst beschreven. Op de oorspronkelijke vindplaatsen in het Pamir-Alai gebergte en Turkestan (het Kara-Tau gebergte), worden ze tussen los puin van kalksteen op zonnige plaatsen aangetroffen. De glanzende, ellipsvormige blauwgrijze bladeren, gewoonlijk twee per bol, zijn aan de onderzijde paars gekleurd. De 12 cm grote, bolvormige bloeiwijze bestaat uit lichtroze stervormige bloempjes, die naarmate de bloei vordert naar achteren buigen. Een prima allium voor op een pot.


Bestelnr. 181 **5 st. 3.00**
10 st. 5.50



Allium karataviense 'Ivory Queen'

Een schitterende Nederlandse, zuiver witte selectie uit *A. karataviense*. De lichtgroene zaaddozen zijn minstens zo decoratief als de bloemen zelf. Prachtig in combinatie met grijsbladige planten zoals *Salvia argentea* en *Stachys byzantina*.

Bestelnr. 183 **5 st. 3.50**
10 st. 6.50




Allium komarowii

Een weinig aangeboden allium met een compacte halfronde intens violetpaarse bloeiwijze, voorzien van honderden stervormige bloemetjes met violette meeldraden op een 30 tot 40 cm hoge steel. Niet alleen bijzonder is dat het blad net zo mooi is als dat bij *A. karataviense*, maar ook dat de bloemen geuren naar chocolade.

Herkomst: Tadzjikistan, het Serawschan-gebergte. Vernoemd naar Vladimir Leontiewitch Komarow, een Russische plantkundige.


Bestelnr. 185 p.st. 4.95
3 st. 13.50



Allium ledebourianum

Inheems op een van de hoogste punten van het Altai-gebergte in Siberië, Mt. Belukha, op 4500 meter hoogte. Het groeit daar onder erbarmelijke omstandigheden in de bergweiden. De bolvormige bloeiwijzen bestaan uit lilaroze bekervormige bloemen. Het blauwgrijze blad is hol. Zowel de bloemen, het blad en de ondergrondse delen worden gegeten.


Bestelnr. 187 5 st. 5.50
10 st. 9.50



Allium lenkoranicum

Op 23 april 1987 aangetroffen in Azerbeidzjan en wel in het Talish-gebergte nabij Lerik op een hoogte van 1860 meter. Het bloemscherm ontwikkelt zich langzaam uit een heel lang schutblad en is zeer transparant met bloemsteeltjes van ongelijke lengte. De smalle bloemblaadjes zijn beige met een rossige gloed en een donkere middennerf.


Bestelnr. 189 3 st. 6.00
5 st. 9.50



Allium litvinovii

Arnis Seisums verzamelde deze in Sari-Chilek, in het zuidoosten van het Chatkal-gebergte in Oezbekistan. De ongewoon blauwe bloemen zijn violetblauw gestreept en vormen een compact bloemscherm op een steeltje van 40 cm hoogte. Vermeedert zich prima en heeft zich in de laatste jaren bewezen als een betrouwbare aanwinst.

Bestelnr. 8481 p.st. 4.50
3 st. 12.75




Allium macleanii

(Synoniem: *A. elatum*)



Het was kolonel Maclean die in 1853 de eerste bollen uit de omgeving van de Afghaanse hoofdstad Kabul meebracht. De compacte bolvormige bloeiwijze, 10-12 cm in doorsnede, bestaat uit vele lilaroze stervormige bloempjes met puntige bloemblaadjes, elk met een donkerpaars nerfje. Het geheel doet denken aan een kleinere vorm van *A. giganteum*. Prima snijbloem.

Bestelnr. 9902 3 st. 4.95
5 st. 7.50




Allium macranthum

(Synoniemen: *A. oviflorum* en *A. simethis*)

De eerste beschrijving dateert uit 1874. (macro staat voor groot en anthos betekent: bloem). Ze werden in 1872 in Sikkim verzameld door Henry John Elwes (1846-1922). Het verspreidingsgebied strekt zich uit van de Himalaya naar het zuidwesten van China. De 25 tot 40 cm hoge driekantige bloemstelen dragen een 5 cm breed bloemscherm met vijf tot twaalf klokvormige purperode bijeengepakte bloempjes. Ze voelen zich thuis op een wat vochtige grondsoort met een goede afwatering.

Bestelnr. 191 3 st. 7.50
5 st. 12.00



Allium 'Miami'

2013


Aanvankelijk ging de mooie introductie als *A. 'Bolero'* door het leven. Een allium met stevige stelen, waarbij één der ouders *A. atropurpureum* is. Waarschijnlijk is de andere ouder *A. schubertii*. Het halfronde, aan de onderkant afgeplatte bloemscherm bestaat uit glanzende stervormige purperrode bloemetjes. Gedurende de bloei wordt de bloeiwijze losser en lijken de eigenschappen van *A. schubertii* zichtbaar te worden.



Bestelnr. 9131

10 st. 4.50

25 st. 10.50



Allium moly 'Jeannine'


Een forsere vorm met mooie bladeren en kaarsrechte bloemstelen. Geeft vrijwel altijd twee bloemstelen per bol. De bloemschermen bestaan uit goudgele bloempjes en verschijnen zeker twee weken eerder dan die van *A. moly*. Dit soortje, in 1978 verzameld in de Spaanse Pyreneeën, werd vernoemd naar de vrouw van wijlen Michael Hoog. Brian Halliwell heeft ze naar Engeland meegebracht.



Bestelnr. 197

25 st. 2.50

100 st. 9.00



Allium 'Mount Everest'

Intro: 1993. Een beste grootbloemige witte allium. De bolvormige bloeiwijze staat stevig op de 100 cm hoge bloemsteel. Een zeer gevraagde cultivar door kwekers die deze topper als bloem op de bloemenveiling aanvoeren. Schitterend te combineren met vaste planten in de border, bijvoorbeeld onze combinatie op de Kwekerijdagen te Bingerden met *Nepeta faassenii* 'Six Hill's Giant'.



Bestelnr. 201

3 st. 6.00


5 st. 9.50



Allium nevskianum

Vernoemd naar de Russische botanicus Sergej Arsenjevic Nevski (1908-1938). Een langzaam populairder wordende species voorzien van vele rozerode bloemetjes die voor een bolvormige bloeiwijze zorgen. De bloemsteel bevindt zich tussen twee brede blauwgroene bladeren, iets op *A. karataviense* gelijkend, maar veel spectaculairder. Herkomst: Tadzjikistan nabij Chinoro, Varsob gorge, waar ze groeien op hellingen voorzien van steengruis.

Bestelnr. 207	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Allium nigrum


(Synoniemen: *A. multibulosum*,
A. monspessulanum en *A. magicum*)

Intro: 1762. Zwart (= niger) zijn de talrijke broedbolletjes die in de wilde bloemvorm worden aangetroffen. De tot 80 cm hoge bloemsteel draagt een half bolvormig bloemscherm met een doorsnee van 10 cm. Tientallen witte bloemetjes met een nauwelijks waarneembare grijze gloed bevinden zich aan 6-8 cm lange groene bloemsteeltjes. Glanzende op de grond liggende bladeren.

Het is een geurende en houdbare snijbloem.

Herkomst: Middellandse Zeegebied.

Bestelnr. 209	10 st.	3.75
	25 st.	9.00




Allium nigrum 'Pink Jewel'

(Synoniem: *A. auctum*?)

Een echte aanwinst, een roze, hoge allium. Het half bolvormige (15 cm in doorsnede) bloemscherm wordt gedragen door stevige 80 cm hoge donkere stelen. Het aanbod is licht variabel in hoogte, maar dat is niet storend. Mooi in combinatie met *A. schubertii*.

Bestelnr. 9441	3 st.	4.50
	5 st.	7.00



Allium nutans 'Caroline'




Een zilveren medaille van de KVBC winnende selectie uit handen van P. de Jong. Vroeg in het voorjaar ontwikkelen zich de gedraaide lichtgrijze, 30 cm lange bladeren die tot diep in de herfst aanblijven. De bloemstelen hebben in knop een knikkend hoofdje, maar bij de aanvang van de bloei, eind juni, richten zij zich naar boven en ontluiken de lilaroze bloemen.



Bestelnr. 9438

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Allium nutans 'Isabelle'




Eveneens een selectie uit de in Siberië voorkomende *A. nutans*. Isabelle is minder fors, het bijzondere is de roomwitte soms iets roze-achtige bloemkleur. De bolvormige bloeiwijze, die volop bezocht wordt door bijen en vlinders, wordt gedragen door een 50-60 cm lange bloemsteel. Ook hier is het blad gedurende het groeiseizoen aantrekkelijk.



Bestelnr. 9440

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Allium obliquum


Intro: 1753. Herkomst: het aangeboden betreft nazaten van de oorspronkelijk in het Sajan bergte, in Siberië aangetroffen exemplaren. Overige vindplaatsen: Centraal-Azië en het zuidoosten van voormalig Rusland. De lange witte meeldraden met gele helmknopjes 'spatten' uit de zachtgele bloempjes. Het geheel wordt omgeven door een zachtgroene waas. De bloemstelen zijn bebladerd. Langdurige bloei en goed toepasbaar in de border vanwege de plantopbouw.



Bestelnr. 211

3 st. 6.00

5 st. 9.50




Allium oreophilum

(Synoniemen: *A. ostrowskianum* en *A. platystemon*)

Intro: 1831. Oreophilus: van bergen houdend. Een waardevolle species, bij uitstek geschikt voor de rotstuin, maar ook voor verwildering. De bladeren vormen een rozet. De bloemsteel is veelal niet hoger dan 15 cm. De half bolvormige bloeiwijze wordt gevormd door een twintigtal sierlijke purperrode stervormige bloemetjes. Ieder bloemblaadje heeft een contrasterende donkere middennerf. Herkomst: Kaukasus, Iran, Pakistan, Afghanistan en delen van Turkije.

Bestelnr. 213	25 st.	2.50
	100 st.	9.00




Allium oschaninii

(Synoniem: *A. cepa* var. *sylvestre*)

Deze goed groeiende ui afkomstig uit de bergen ten zuiden van de Fergana-vallei in Oezbekistan is nauw verwant aan de hedendaagse keukenui (*Allium cepa*). De witte bloemen verschijnen in de zomer aan holle bloemstelen die tot een meter hoog zijn. Aan de bloemsteel verschijnt op zo'n 30 cm van de grond een opgeblazen deel van de stengel. Na de bloei drogen ze mooi op en zijn eventueel bruikbaar in droogboeketten.


Bestelnr. 199	p.st.	3.50
	3 st.	9.75



Allium paradoxum var. normale

Boslook. De aangeboden partij is oorspronkelijk verzameld door Janis Ruksans in Azerbeidzjan, Talish-gebergte, groeiend in de schaduw van een rotskloof bij een waterval onder een dichte laag mos, in mei 1987, op een hoogte van 1700 meter. Uit de zeer kleine bolletjes, nauwelijks van een huidje voorzien, ontwaren we in maart een enkel gebogen glanzend blad. De bloeiwijze bestaat uit tien tot vijftien helderwitte klokvormige bloempjes, die tijdens de bloei geen zichtbare meeldraden tonen. De bloemsteel is driekantig. De zaden scheiden een oliehoudende stof af die mieren lokt.


Bestelnr. 215	3 st.	6.75
	5 st.	11.00



Allium 'Pinball Wizard'

Evenals A. 'Globemaster' en A. 'Beau Regard' komt deze voortreffelijke ui uit de kruisingsouders: *Allium macleanii* x *Allium christophii*. De naam Pinball Wizard is afkomstig uit de rockopera "Tommy" van The Who uit de jaren zestig. De ontelbare donkerviolette bloemetjes maken tezamen een grote dicht bezette bloem met een doorsnede van 15 cm. Het geheel wordt gedragen door een stevige steel van 85 cm. Het blad blijft gedurende de bloei mooi.


Bestelnr. 205 **p.st. 3.95**
3 st. 11.25



Allium plummerae

Inheems in Arizona en Mexico, lokaal de 'Tanners Canyon Onion' genoemd. Een zeer goede species met wit tot zachtroze, wasachtige, relatief grote bloempjes. De bloempjes kijken in het bloemscherm naar boven. De drie tot zes stevige lancetvormige bladeren zijn groen. Makkelijk en lang bloeiend.

Bestelnr. 9442 **p.st. 3.95**
3 st. 11.25



Allium 'Powder Puff'



Nieuw, ontstaan uit *A. nevskianum* x *A. servaschanicum*. In de vorm van een poederkwast ontluiken de aanvankelijk glanzende violetpaarse bloemen met opvallend uitstekende witte meeldraden. Uiteindelijk vormen de talrijke stervormige bloemen een bijna ronde bloeiwijze. Het smalle blad is matgroen en blijft laag bij de grond. Zeer bruikbare introductie, voornamelijk vanwege zijn hoogte. Combineer eens met vrouwenmantel.






Bestelnr. 9903 **3 st. 6.00**
5 st. 9.50



Allium pskemense

In de Pskem-vallei is dit een beschermde plant. Aldaar wordt deze ui intensief gebruikt voor voeding. Als u van pittig houdt, kunt u het blad vernnipperen in salades. In het voorjaar ontluiken de dikke cilindervormige bladeren als grote vingers uit de grond. Aan de holle bloemstelen verschijnen in de tweede helft van de zomer compacte witte bolvormige bloemschermen. Spectaculair.

Bestelnr. 8491	3 st.	7.95
	5 st.	12.50






80-100  7-8  20  12-15  l. 



Allium 'Purple Rain'

Mooie transparante bloemen in een diepe tint paars waarover een metaalachtige gloed zit. Een perfecte, luchtige, op vuurwerk gelijkende bloeiwijze, die ook doet denken aan *A. christophii*. De kwaliteit en houdbaarheid van de allium als snijbloem is perfect. Verwildert goed.

Bestelnr. 8025	10 st.	4.50
	25 st.	10.00






90-100  5-6  15  12-15  12 



Allium 'Purple Surprise'

In 1984 werd door de heer W. Hey deze selectie geregistreerd. Een nog intensere bloemkleur, een tint dieper dan *A. 'Purple Sensation'*. De bolvormige bloeiwijze bereikt een hoogte van 80 cm. Prima snijbloem en vanwege zijn bloeitijd ook prima te combineren met late tulpen.

Bestelnr. 9289	5 st.	4.95
	10 st.	9.50

80  5-6  15  12-15  16 




Allium 'Purple Sensation'

(Synoniem: *A. hollandicum* 'Purple Sensation')

Een selectiepartij in 1963 geregistreerd door de heer Jan Bijl. De bloemkleur is dieppaars. Zeker vanwege deze kleur is het een zeer gewaardeerde snijbloem. De aangeboden partij is van kloon geteeld. Dit houdt in dat alle nakomelingen door vegetatieve vermeerdering uit een (streng geselecteerde) plant zijn ontstaan, dat duidelijk te zien is aan de uniformiteit van bloemkleur en hoogte. Het beste alternatief voor *Allium hollandicum* (*A. aflatunense*).


Bestelnr. 217 **10 st. 4.50**
 25 st. 10.00



Allium ramosum

Herkomst: Centraal-Azië tot en met Siberië. Heerlijk naar sringen geurend en langdurig bloeiend tijdens de zomermaanden. De bloemsteel heeft een lengte van zo'n 40-50 cm en wordt omgeven door smalle lineaire bladeren. Het bloemscherm bestaat uit 2 cm grote stervormige witte bloemen, aan de buitenzijde van ieder bloemblaadje verfraaid met een zeer opvallende roodbruine nerf.

Bestelnr. 221 **3 st. 4.50**
 5 st. 7.00




Allium rosenbachianum subsp. rosenbachianum



De zogenaamde True Species, verzameld door Arnis Seisums in Tadzjikistan. Een luchtige bloeiwijze, tot 15 cm in doorsnede, waarbij de witte meeldraden opvallend uitsteken uit de paarse stervormige bloemen. Het blad bevindt zich onderaan de bloemsteel en is glanzend groen.

Bestelnr. 9755 **3 st. 7.50**
 5 st. 12.00




Allium rosenbachianum 'Early Emperor'

2013

De aangeboden partij is ontstaan door selectiewerk van de kwekerij A. Langedijk en onderscheidt zich door zijn vroege bloei. Ideaal te combineren met tweejarige zoals *Hesperis* en *Lunaria*.

Een krachtig geribde bloemsteel van zo'n 60 cm lengte draagt een bolvormige bloeiwijze met een diameter van wel 15 cm, die bestaat uit een honderdtal stervormige paarse bloemetjes.

Bestelnr. 219	3 st.	6.75
	5 st.	11.00




Allium roseum var. roseum

(Synoniemen: *A. amoenum*, *A. carneum* en *A. incarnatum*)

Intro: 1753. Er bestaan aanwijzingen dat in 1697 melding gemaakt wordt van dit bolgewas.

En eigenlijk logisch wanneer men weet dat de wildvorm voorkomt in landen rond het Middellandse Zeegebied, landen met een oude beschaving. Ook in Noord-Afrika en delen van Turkije komen ze massaal voor. De half bolvormige bloeiwijze bestaat uit tientallen klokvormige satijnroze bloempjes. De smalle bladeren zijn licht behaard. Goed houdbaar snijbloempje.

Bestelnr. 223	25 st.	2.50
	100 st.	9.00




Allium 'Round 'n Purple'

Een in 1997 door Th. Warmerdam geregistreerde cultivar. De dichte, grote, zacht violetpaarse bolvormige bloeiwijze is aan de onderzijde iets afgeplat. Het grote glanzende groene blad blijft gedurende de bloei lang aantrekkelijk.

Deze krachtige allium is in kwaliteit vergelijkbaar met *A. 'Globemaster'*, maar zachter van kleur.

Bestelnr. 9153	p.st.	3.50
	3 st.	9.75




Allium sativum var. ophioscorodon

(Synoniem: *A. controversum*)

Knoflook (*Allium sativum*) wordt al in 1601 beschreven in Clusius' "Rariorum Plantarum Historia". De sierwaarde zit 'm in de spiraalvormige bloemstengel. De unieke vorm verdwijnt pas dan wanneer de merkwaardig gebogen, op een reigersbek gelijkende bloem zich opent.

De eigenlijk niet zo interessante bloem is bolvormig en bestaat uit vele buisvormige opeen gepropte witte bloemetjes. De Nederlandse naam luidt: esculaap-ui. Bolgrootte: 'n teentje.

Bestelnr. 225 **5 st. 4.95**
10 st. 9.50




Allium scabriflorum

2013

Een Turkse species die aanvankelijk, tot z'n identificatie, als 'Little Blue Head Beauty' door het leven ging. Een late, zomerbloeiende allium met kleine, compacte, licht hemelsblauwe bloemen.


Bestelnr. 9906 **p.st. 16.50**
3 st. 48.00



Allium schubertii

Intro: 1896. Herkomst: in het oostelijke gedeelte van het Middellandse-Zeegebied tot in Centraal-Azië. Een werkelijke beauty. De krachtige ca. 40 cm hoge bloemstelen torsen een imposant bolvormig bloemenscherm met een diameter van maar liefst 30 cm bestaand uit ca. 200 lichtroze bloempjes. De tweeslachtige bloemetjes zijn ca. 4 cm lang, terwijl de mannelijke bloempjes een steellengte van 20 cm bereiken. Grillig en zeer curieus. Als snijbloem, maar nog meer als droogbloem van uitzonderlijke waarde.






Bestelnr. 227 **3 st. 4.50**
5 st. 7.00



Allium scorodoprasum 'Bizar'

Geïntroduceerd op de Internationale Kwekerijdagen te Bingerden 2010. Een selectie uit de wilde *Allium scorodoprasum*. Curieus gevormde 'bloemen', bestaande uit een wirwar van broedbolletjes en vergroeide stengeltjes. De stelen hebben een gezonde lengte, 100-120 cm, waardoor de bloemen zich prima lenen voor de vaas.

Bestelnr. 9157 **10 st. 4.00**
25 st. 9.00

100-120  6-7  10  6-8  1. 








Allium senescens 'Meise'

 2013

De Europese en Aziatische *A. senescens* bestaan uit vele species en subspecies, lang niet allemaal gedetermineerd. P. de Jong vond deze rijk bloeiende selectie rond 1980 op een kwekerij in de Nationale Plantentuin van België in Meise. Ze valt op door het lichtgrijze blad en vroege bloei, al vanaf begin juni. Evenals bij *A. nutans* dragen de stevige stelen aanvankelijk een 5 cm groot knikkend bloemscherm. Tijdens de bloei staat het echter recht en toont de plant zijn lilapaarse bloemen.

Bestelnr. 9443 **3 st. 4.95**
5 st. 7.50

50-60  6-7  10  6-8  1. 








Allium senescens 'Lisa Blue'

 2013

Uit de zaailingen van *Allium senescens* var. *glaucum* werd onder andere een plant met mooi grijsblauw loof geselecteerd. 'Lisa Blue' is een compacte plant met kort blad dat al vroeg in het voorjaar verschijnt en het hele seizoen fris blijft.

Laat zich prima combineren met eenjarige planten in een bloembak. Lilapaarse bloemen. Ze behoren tot de ondersoort montanum.

Bestelnr. 9444 **3 st. 4.95**
5 st. 7.50

20-30  7-8  10  6-8  1. 




Allium senescens var. montanum

Het verspreidingsgebied loopt van de Oekraïne tot aan Noord-Portugal. De snelgroeïende plant is 's zomers overladen met zacht lilaze half bolvormige bloeiwijzen. De tientallen bloemetjes hebben opvallende uitstekende meeldraden. Het smalle, lineaire blad is grijsgroen en blijft gedurende het groeiseizoen mooi.



Bestelnr. 9161	5 st.	4.00
	10 st.	7.50




Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon

Intro: 1753. Nederlandse benaming: kogel- of kalklook, vanwege de totale plantbouw ook wel trommelstokken (drumsticks) genoemd.

De holvormige bladeren omvatten ca. eenderde van de bloemsteel. De ca. 5 cm grote bolvormige en compacte bloeiwijze bestaat uit tientallen kleine klokvormige roodpaarse bloemetjes met uitstekende meeldraden. Herkomst: Middellandse Zeegebied tot in de Kaukasus, de Belgische Ardennen en in de buurt van Bristol. Prima snij- en droogbloem.


Bestelnr. 231	25 st.	2.50
	50 st.	4.50
	100 st.	8.50



Allium 'Spider'

Intro: 2009. Een nakomeling uit *A. schubertii* x *A. atropurpureum*, maar nu overwegen de uiterlijke kenmerken van *A. schubertii*. Duidelijk vernieuwend, de spiky bloeiwijze in een intensere bloemkleur. Interessant is ook de goed bruikbare lengte, de Spider wordt gedragen door 60 cm hoge stelen, hierdoor komen de bloemen mooi boven lage beplanting uit.

Bestelnr. 9163	3 st.	4.50
	5 st.	7.00




Allium 'Statos'

In 2005 door J.M. van Berkel geïntroduceerd. Er is wat fout gegaan bij de tenaamstelling. Het zou eigenlijk Stratos moeten zijn, vernoemd naar een Griekse werknemer van een bollenkweker in Hillegom.

Een wat los ogende niet geheel ronde bloeiwijze met lilapurperen bloemen. Niet alleen aantrekkelijk vanwege de gezonde lengte, maar ook vanwege het bloeitijdstip: vroeg in mei. Krachtige glanzend groene stelen.

Bestelnr. 9165	3 st.	4.95
	5 st.	7.50




Allium 'Summer Drummer'

Een topper, door W. Mellema in 2006 geïntroduceerd. Een zeer late en hoge allium die fantastisch combineert met bijvoorbeeld siergrassen.

Zeer interessant vanwege de kleur, purperrood en de bloeitijd, juli-augustus. In het uitbloei stadium zijn de witte meeldraden duidelijk zichtbaar.

De compacte bloeiwijze, doet denken aan een grote *A. sphaerocephalon*.

Bestelnr. 8495	3 st.	7.50
	5 st.	12.00




Allium suwerowii



Inmiddels zeldzaam geworden door veelvuldig gebruik als voedsel, smaakt naar knoflook, en gebruik als medicijn op de oorspronkelijke vindplaatsen in Centraal-Azië. De smalle bladeren omvatten de 70-80 cm hoge bloemsteel die een rozelila compact bijna rond bloemscherm draagt. De bloeiwijze bestaat uit vele stervormige bloemen die dezelfde kleur meeldraden hebben. Doorlatende bodem.

Bestelnr. 9904	p.st.	3.50
	3 st.	9.75




Allium triquetrum

Intro: 1789. Driekantige look. Krullende van groeven voorziene bladeren omvatten een zeer opvallende driekantige (triqueter) bloemsteel die, afhankelijk van de standplaats, 25-40 cm hoog wordt.

Het iets knikkende en opmerkelijk helderwitte bloemscherm bestaat uit tientallen buis- tot klokvormige bloemetjes met op ieder bloemblaadje een groen streepje.

Herkomst: Middellandse Zeegebied, maar kennelijk ook in het noorden van Engeland. Verwildert.

Bestelnr. 240	10 st.	2.50
	25 st.	6.00




Allium tuberosum

(Synoniem: *A. uliginosum*)

Intro: 1825. Bekend onder de namen Chinese bieslook en knoflook-bieslook. Door de eeuwen heen werden in China, Japan en van Zuidoost-Azië tot in India de bladeren van deze ui als ingrediënt bij salades gebruikt. De bladeren zijn smal en aan één zijde afgeplat. De ca. 50 cm hoge bloemstelen zijn voorzien van een wit bloemscherm dat uit vele stervormige bloempjes bestaat. De keel van de bloemen is groen, ieder bloemblaadje heeft een groene nerf.

Bestelnr. 242	5 st.	3.75
	10 st.	7.00



Allium unifolium


(Synoniem: *A. grandisceptrum*)

Vaak wordt deze in 1863 beschreven allium verward met *A. murrayanum*. Smalle bladeren, waarvan de grootste enigszins sikkelvormig aandoen, omsluiten de ca. 30 cm hoge bloemsteel.

Het bloemscherm bestaat uit nogal grote klokvormige satijnroze bloemetjes. Het nieuwe bolletje groeit met een korte stengel (stolon) aan de buitenzijde van de knol van het vorige jaar.

Herkomst: Californië en Oregon (U.S.A.). Ideaal om te laten verwilderen tussen grijsbladige- en/of blauwbloeiende vaste planten.


Bestelnr. 244	25 st.	2.50
	100 st.	9.00



Allium ursinum subsp. ursinum

Intro: 1753. Nederlandse naam: daslook. Deze woekerende allium komt voor in grote delen van het Noordelijk Halfrond. In Nederland zijn ze op enkele plaatsen verwilderd, maar beschermd. (Stinzenplant). De ovale bladeren doen denken aan die van het Lelietje-der-Dalen. De bloemsteel is duidelijk driekantig. Het half bolvormige bloemscherm bestaat uit witte stervormige bloemetjes. Het blad is eetbaar en werkt cholesterol verlagend. Ook de ondergrondse delen zijn eetbaar. De plant verspreidt een intense uiengeur.

Bestelnr. 246 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50




Allium victorialis

(Synoniemen: *A. microdictyum*,
A. ochotense en *A. latissimum*)

Intro: 1753. Victorialis betekent: overwinnen, zegevieren. De botanische naam van deze species werd ontleend aan de Europese mythologie ten tijde van de middeleeuwen. Verspreid voorkomend over Zuid-Europa, en noordelijk Azië. De kogelvormige witte bloeiwijze heeft een diameter van 3 tot 5 cm. Het blad lijkt op dat van het Lelietje-der-dalen. De planten werden zowel vers als gezouten gegeten.


Bestelnr. 248 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00



Allium 'Violet Beauty'

In 1979 werd deze cultivar geregistreerd door J.J.M. Twaalfhoven. De glanzende bloem doet denken aan *Allium christophii*, wellicht was het één der kruisingsouders. De bloemkleur is violetachtig met op ieder kelkblaadje een groenig streepje. Lang houdbare snijbloem. Zeker een aanrader, door het verfijnde karakter goed toepasbaar vooraan in de border.

Bestelnr. 252 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00



Allium 'White Giant'

Een extra hoge allium waarvan de sneeuwwitte bollen op stevige 150 cm forse stelen staan. Het blad is opvallend stevig, naar boven gericht en donkergroen van kleur, op het moment van bloei afstervend.


Een speels effect wordt bereikt door A. 'White Giant' samen met A. 'Mount Everest' te planten.



Bestelnr. 8501

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Allium zebdanense

(Synoniemen: *A. chionanthum* en *A. candolleianum*)


Dit in 1859 beschreven sieruitje vertoont enige gelijkenis met de eerder beschreven *A. cowanii* maar dan wel als een vroegbloeiende en verfijnde uitgave. De bladeren zijn zeer smal en aan het uiteinde gekruld. Het bloemscherm bestaat uit 8-10 stervormige witte bloemetjes. Op de drie buitenste bloemblaadjes is een fijn groen nerfje zichtbaar. Prima soortje voor verwilderding. Herkomst: Libanon.



Bestelnr. 255

25 st. 3.50

100 st. 13.00



ANEMONE

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER RANUNCULACEAE

Nederlandse benaming: anemoon of windbloem. **Herkomst:** van Zuidoost-Europa tot en met Centraal-Azië. Carolus Clusius introduceerde ruim 400 jaar geleden dit gewas in Nederland. Anemonen zijn vooral geliefd om hun contrasterende, felle kleuren. Er zijn wel 70 soorten bekend. Volgens een Griekse sage: De tranen die Aphrodite om de stervende Adonis weende, rolden op de aarde en veranderden in anemonen.





ANEMONE BLANDA

Anemone blanda 'Twinkeling Eyes' 2013

Bestelnr. 6010

10 st.

4.95

25 st.

12.00

Van voor 1700 dateren de eerste beschrijvingen van deze in Zuidoost-Europa, Cyprus, de Kaukasus en West-Turkije voorkomende species. Door kruisingen en veel selectiewerk zijn de tegenwoordig aangeboden cultivars ontstaan. Oosterse anemoontjes zijn prima te gebruiken voor verwildering. Maar ook leuk in potten te combineren met bijvoorbeeld vergeet-mij-niet en viooltjes. Het aangeboden mengsel is een unieke mix die ontstaan is uit kruising van de grootbloemige 'White Splendour' x 'Radar' met het mooie witte hart.



Anemone blanda 'Blue Shades'

Bestelnr. 274

25 st.

2.50

100 st.

9.00



Anemone blanda 'Radar'

Bestelnr. 278

3 st.

7.50

5 st.

12.00



Anemone blanda 'White Splendour'


Bestelnr. 280

25 st.

5.00

100 st.

19.00





ANEMONE CORONARIA

Anemone coronaria -bicolor type-

Bestelnr. 8047

25 st.

4.50

100 st.

17.00

In Griekse weilanden worden de grootbloemige, kleurige anemonen nog volop aangetroffen. Het zijn prima snijbloemen en laten zich ook goed combineren met andere bolgewassen, zoals de laatste jaren veelal op de Keukenhof wordt toegepast. De anemonen bloeien langer als de uitgebloeide bloemen er met steel en al worden uitgedraaid.



Anemone coronaria 'Bride'

Bestelnr. 8049

25 st.

3.50

100 st.

12.50



Anemone coronaria 'Mr. Fokker'

Bestelnr. 8053

25 st.

3.50

100 st.

12.50



Anemone coronaria 'De Caen'


Bestelnr. 8503

25 st.

3.50

100 st.


12.50



Anemone nemorosa

Bosanemooon (nemorosus staat voor: in het bos groeiend). Een snelgroeende bodembedekkende wortelstokvormende plant die een zeer groot verspreidingsgebied kent (van Lapland tot en met de laars van Italië, maar ook in Azië en Noord-Amerika). De bosanemooon was al in de 16e eeuw bekend. De bloemkleur is wit met aan de buitenkant van de bloembladeren een blos van lila-achtig roze. Een bladrozet ontwikkelt zich na de bloei.

Bestelnr. 292	25 st.	4.00
	100 st.	15.00




Anemone nemorosa 'Alba Plena'

(Synoniemen: *A. n. 'Pleniflora'* en *A. n. alboplena*)

Intro: 1771. Een gevuldbloemige witte vorm van *A. nemorosa*. De bloempjes zijn iets kleiner dan die van *A. nemorosa 'Vestal'* en wat onregelmatiger van vorm. We bieden een mooie selectie aan.


Bestelnr. 294	5 st.	4.50
	10 st.	8.50



Anemone nemorosa 'Blue Eyes'

Een halfgevlude witbloeiende bosanemooon. Naarmate de bloei vordert, zo halverwege de bloei, verschijnt een prachtig blauw hartje in de bloem. Pas echt mooi wordt het, als de knolletjes een paar jaar vast staan.


Bestelnr. 9169	p.st.	6.95
	3 st.	19.50



Anemone nemorosa 'Dee Day'

Een zelden aangeboden zeer mooie variëteit die volgens wijlen Kath Dryden verzameld is nabij een kroeg in Armentières in 1945. De middelgrote, diep blauwe bloemen worden door relatief hoge bloemsteeltjes gedragen.

Bestelnr. 9665 p.st. 4.50
3 st. 12.75




Anemone nemorosa 'Gerry'



Helderblauwe, relatief grote bloemen waarover zich een zilvergrijze gloed bevindt. De bloemen worden gedragen door korte bloemsteeltjes.

Bestelnr. 9907 3 st. 7.50
5 st. 12.00




Anemone nemorosa 'Green Fingers'



Uit het hart van de witte bloem ontstaan groene vergroeiingen, de 'groene vingertjes'. De bloemblaadjes zijn wijder dan bij andere species. Oorspronkelijk uit Ierland afkomstig.

Bestelnr. 9171 p.st. 3.50
3 st. 9.75




Anemone nemorosa 'Hilda'

Een onvoorstelbaar rijk bloeiende witte vorm met meer bloemblaadjes, soms het dubbele aantal, dan normaal. 'Hilda' is ooit in het wild aangetroffen in Denemarken, in de buurt van Slagelse, Seeland door Dean Ulrich Toubol.

Bestelnr. 8505

5 st. 4.00
10 st. 7.50




Anemone nemorosa 'Ice and Fire'

Een aantrekkelijke nieuwkomer in het assortiment waarvan de witte bloemen snel een dieproze zweem over de bloem krijgen. Uiteindelijk wordt de gehele bloem dieproze, met uitzondering van de randjes van de bloemblaadjes, die blijven wit of heel licht roze. De bloemen zitten in meerdere bloeistadia aan de plant waardoor een kleurig geheel ontstaat.

Bestelnr. 9908

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Anemone nemorosa 'Lucia'

Intro: 1978. Verzameld in Spanje, Picos de Europa, Puerto de San Glorio. Aanvankelijk is de bloem wit, maar verkleurt al snel naar dieproze. De bladslippen zijn breed, dat wil zeggen: niet fijn vertakt. Het blad is bij opkomst bruin, later wordt het groen.

Bestelnr. 268

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Anemone nemorosa 'Lychette'


Vrij grote open witte bloemen met een zweempje van lichtblauw. Opvallend bij deze variëteit zijn het donker getinte blad en de maroonrode stengeltjes.



Bestelnr. 8507

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Monstrosa'


Een protserig anemoontje. De witte bloemen zijn omsloten door een kraag van vergroeide lichter groene bloemblaadjes. Vaak ontstaat er een blauwige gloed in de bloem die vanuit het hart van donker naar licht kleurt. Leuk.



Bestelnr. 9909

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Parlez Vous'


Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd dit anemoontje in Frankrijk verzameld door Frank Waley. Later verspreidde hij het vanuit zijn tuin in Sevenoaks, Kent. Zachtblauwe grote bloemen met opvallende meeldraden.



Bestelnr. 8509

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Robinsoniana'

(Synoniem: *A. nemorosa* 'Caerulea')

Werd in ca. 1870 geïntroduceerd door de heer William Robinson, een invloedrijk Victoriaanse hovenier en journalist die deze anemoon aantrof in de Botanische Tuin van Oxford, vanwaar deze uit Ierland was terechtgekomen.


Bloemkleur: lichtblauw, aan de buitenzijde grijsig.



Bestelnr. 300

5 st. 4.95

10 st. 9.50



Anemone nemorosa 'Royal Blue'


Koninklijk blauwe bloemen, het diepste blauw van alle cultivars, mooi afstekend bij het donkere diep ingesneden loof. Verdiende in 1915 een Award of Merit. De gehele plantopbouw is verfijnd en gracieus.



Bestelnr. 302

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Anemone nemorosa 'Vestal'


Geïntroduceerd door de Duitse botanicus Maximilian Leichtlin (1831-1910). Verreweg de mooiste witte gevuldbloemige *A. nemorosa*. De bloemen zijn groter dan die van *A. nemorosa* 'Alba Plena' en de stand van de bloemblaadjes is fraaier. (Bijna 'Camelia-achtig').



Bestelnr. 304

5 st. 6.00

10 st. 11.00



Anemone ranunculoides subsp. ranunculoides


Intro: 1596. Een bijzonder attractieve anemoon die, met uitzondering van het Middellandse Zeegebied, in vrijwel geheel Europa voorkomt. Deze anemoon vertoont in habitus enige gelijkenis met *A. nemorosa*. De mooie donkergele bloemen bestaan uit 5-8 breed eivormige bloemblaadjes, aan de achterzijde voorzien van haartjes. Voor een beschaduwde plek.



Bestelnr. 310

10 st. 3.50

25 st. 8.00



ANOMATHECA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE


Anomatheca viridis

Dit oorspronkelijke in Zuid-Afrika voorkomende geslacht is nauw verwant aan het geslacht *Freesia*. Vernoemd naar de botanicus Baron Philippe de la Perouse (1741-1818). Smalle lichtgroene zwaardvormige en opstaande bladeren vormen een platte waaier. Het bloemtrosje bestaat uit vier tot soms tien trechtvormige groengele bloempjes. Na de bloei ontstaan eivormige peulen die bij het opengaan rode zaadjes tonen. Winterhard, ook leuk voor in potten.

Bestelnr. 317

3 st. 3.75

5 st. 6.00



ARISAEMA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ARACEAE


De naam werd ontleend aan de Griekse woorden 'aron' (arum of aronskelk) en 'haima' hetgeen bloedrood betekent en zinspeelt op de meestal rode bessen die de van wortelstok voorziene plant in het najaar sieren. Er zijn vele tientallen species bekend. De meeste vinden we in Azië, een enkeling in tropisch Afrika, terwijl de hier onder andere aangeboden *A. triphyllum* voorkomt in het oosten van de Verenigde Staten en het zuiden van Canada. Het geslacht *Arisaema* bestaat uit vele fascinerende planten die, ofschoon ze op exoten lijken, op lichtbeschaduwde plekjes in een humusrijke omgeving eenvoudig zijn te kweken. In het voorjaar is er meer aanbod van *Arisaema*. Komt u daarvoor gerust eens langs op het tuincentrum in Heemstede.



Arisaema ciliatum var. liubaense

In september 1991 verzameld nabij Liuba in Sichuan, China. Aanvankelijk werd gedacht aan *A. consanguineum*, later bleek dit een vorm van *A. ciliatum* te zijn. De auteurs Guy & Liliane Gusman van het boek 'The Genus Arisaema' plaatsten een foto van deze *Arisaema* op de kaft, zo mooi. De bloeischede is purper met groene en witte lengtestrepen. De bladeren vormen een paraplu die zich boven de bloemen bevindt. De rode bessen verschijnen na de bloei.

Bestelnr. 9667 p.st. 11.50
3 st. 33.00



Arisaema robustum

2013


(Synoniem o.a.: *A. amurense* subsp. *robustum*)

Intro: 1859. Herkomst: het oosten van Siberië, op het eiland Primorskiy Kraj in de rivier Amur, China, Japan en Korea. Houdt van een beboste omgeving met wat lichte schaduw. De gerekte en gepunte bloeischede is groen met in de lengte witte strepen. De bloeikolf is groen, soms met een vleugje paars.

In een volwassen stadium is het blad driezijdig met twee zijdelingse gedeelten, hetgeen de indruk wekt dat ieder blad uit vijf blaadjes zou bestaan. In de herfst ontstaan opvallende oranje bessen.

Volledig winterhard.


Bestelnr. 8061 p.st. 9.50
3 st. 27.00



Arisaema triphyllum

Intro: 1843. Bekend onder de naam: 'Jack in the Pulpit', 'Jan op de preekstoel'. De plant kent vele synoniemen. Het schutblad is groen met witte strepen, soms purper. De bloemkolf is purperbruin. Gedijt bij voorkeur op een humusrijke, niet te droge bodem en is prima winterhard. De hoogte is variabel tussen de 30 en 80 cm.

Bestelnr. 319 3 st. 7.50
5 st. 12.00



ARISARUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ARISTOLOCHIACEAE

Arisarum proboscideum




Muizenstaartje. Inheems in Zuid-Italië en Zuidwest-Spanje, waar deze groeit in bossen op beschaduwde plaatsen. De tweekleurige bloeischedes komen in mei boven het blad uit. De witte bloemen zijn aan de bovenkant roodbruin gekleurd, waarbij het topje van de bloem uitgroeit tot een muizenstaartje van wel 15 cm lang.

Winterhard.

Bestelnr. 9179

p.st. 4.75
3 st. 13.50




Arisarum vulgare



De gekapperde kalfsvoet is een plant uit de aronskelk-familie die voorkomt in het mediterrane gebied en Portugal, veelal groeiend op rotsachtige plaatsen of in wijngaarden. Het pijlvormige blad verschijnt in de herfst en maakt de plant doordoor wat vorstgevoelig. Het schutblad is aan de basis tot een bruinrood gestreepte buis vergroeid en aan de bovenkant capuchonvormig naar voren gekromd. Aan de onderkant van de bloeikolf zitten vier tot zes vrouwelijke bloemen, daarboven zitten circa twintig mannelijke bloemen en aan het uiteinde zit een bloemloos, groen gedeelte. De vruchten zijn groenachtige bessen.

Bestelnr. 9910

p.st. 4.75
3 st. 13.50



ARUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ARACEAE

Nederlandse naam: Aronskelk. Deze oorspronkelijke bosplanten zijn vooral bekend om de fraaie bessen in het najaar. Er zijn een vijftiengigtal species bekend van Europa tot Centraal-Azië. Aronskelken zijn eenhuizig: de mannelijke bloemen bevinden zich in het bovenste gedeelte van de kolf, de vrouwelijke bloempjes, voorzien van een 'eenvoudig' vruchtgebinsel, in het onderste deel.




Arum hygrophyllum

2013

Een elegante en eigenlijk niet zo'n kieskeurige *Arum*, als het blad dat voor de winter opkomt maar tegen strenge vorst beschermt wordt. Bij vorstschade hersteld het blad zich na de winter overigens wel. In het voorjaar ontluikt een gracieuze groenwitte, purpergerande bloemschede tot een gelijke hoogte als het loof. In 1860 geïntroduceerd, inheems in Syrië.

Bestelnr. 9911

p.st. 7.95
3 st. 22.50




Arum italicum

(Synoniemen: *A. albispathum*, *A. italicum* subsp. *albispathum*, *A. modcense* en *A. numidicum*)

Intro: 1693. Italiaanse Aronskelk. Herkomst: Canarische eilanden, Cyprus, Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje en Engeland. Komt verwilderd voor in Zuid-Limburg. De spits toelopende bladeren hebben een duidelijke witte nervatuur. De 'bloemen' treffen we aan op de heldergele kolf die door een lichtgele schede, gedeeltelijk, wordt omsloten. In de nazomer verschijnen orangerode bessen. Op het kanaaleiland Guernsey werden ze ooit massaal gekweekt vanwege het voedzame zetmeel.

Bestelnr. 321

5 st. 3.25
10 st. 6.00




Arum italicum subsp. albispathum

Herkomst: het schiereiland Krim en de Kaukasus. Het aanbod is afkomstig van materiaal dat oorspronkelijk is verzameld in het noorden van de Kaukasus. De bloemschede is sneeuwwit, afgezet met een prachtig contrasterend purperen randje. Het spits toelopende blad is groen. In het najaar verschijnen de orangerode bessen. Deze aronskelk heeft permanent een licht vochtige bodem nodig.

Bestelnr. 8517

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Bellevalia crassa




Een zeldzaamheid uit Turkije waar deze tot op heden slechts op twee plaatsen, bakkend in de zon op steile puinhellingen, gevonden is. Zowel in bloei als in zaad een schoonheid. De korte, compacte bloemtros verschijnt tussen twee brede, relatief korte bladeren. De bovenste bloempjes, steriel, zijn wit met een purperen blos, de fertiele bloempjes zijn groenigwit.



Bestelnr. 9912

p.st. 25.00
3 st. 72.00



Bellevalia pycnantha


(Synoniemen: *Muscari paradoxum* en *Muscari pycnantha*)

Intro: 1835. Herkomst: Oost-Turkije, Noordwest-Iran en Noord-Irak waar zij in vochtige weides groeien. Zeer opvallende donkerblauwe bijna zwarte bloemkleur. Leent zich uitstekend voor verwildering en komt ook goed tot zijn recht in potten, bijvoorbeeld in combinatie met andere voorjaarsbloeiers.



Bestelnr. 337

10 st. 2.50
25 st. 6.00



Bellevalia pycnantha 'Green Pearl'


Intro: 2001.

Een selectie met zachtgroene bloemtrossen die bij het ontluiken van de knoppen naar crèmewit kleuren. Goed bruikbare, subtiele tint. Geschikt voor verwildering.



Bestelnr. 9669

10 st. 4.50
25 st. 10.50




Bellevalia romana

(Synoniem: *Hyacinthus romanus*)

Herkomst: het zuidwesten van Frankrijk en het mediterrane gebied van Frankrijk tot Turkije. De klokvormige bloemetjes staan verspreid langs een 15 cm hoog bloemsteeltje. De bloemkleur is 'gebroken' wit met een vleugje groen aan de buitenzijde, de topjes van de bloempjes zijn blauw getipt. Opvallend zijn de blauwzwarte helmknoppen. Ze houden van een goed doorlatende grond.

Bestelnr. 339 10 st. 2.50
25 st. 6.00



BIARUM


BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ARACEAE

Biarum marmarisense

(Synoniem: *B. davisii subsp. marmarisense*)

Herkomst: Zuidwest Turkije. De 7 tot 9 cm grote bloemscade verschijnt zonder blad in september-oktober. Het blad ontwikkelt zich na de bloei. De stengelloze rariteit kan het best in een pot in een kasje gekweekt worden. Zanderige bodem, volle zon. De bloem geurt zoet.

Bestelnr. 2108 p.st. 4.95
3 st. 13.50




BULBOCODIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER COLCHICACEAE

Bulbocodium vernum

Nederlandse naam: 'de rode krokus'. Is bekend sinds 1629. Komt voor in de Pyreneeën, de Alpen, de Balkan en de Kaukasus. *Bulbocodium* is nauw verwant aan *Colchicum*. De bladeren die zich vlak voor of tijdens de bloei ontwikkelen, bereiken na de uitbloei een lengte van 15-20 cm en sterven in de vroege zomer af. De bloemen die in januari tevoorschijn komen, zijn zachtlila. Ze verlangen een goed gedraineerde grondsoort.


Bestelnr. 2101 5 st. 3.50
10 st. 6.75





CALOCHORTUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER LILIACEAE



Calochortus superbus

Bestelnr. 364

10 st.

3.50

25 st.

8.25

De naam *Calochortus* komt uit het Grieks. Kalos (mooi of sierlijk) en chortos (gras). Dit staat voor de grasachtige bladeren. Er zijn een zestigtal species en de laatste jaren steeds meer gecultiveerde vormen bekend. De species worden aangetroffen in grote delen van Californië (Noord-Amerika). Dat het aantal species groot is moge blijken uit de vele 'plaatselijke' bijnamen, o.a.: 'Fairy Lantern', 'Globe Lily', 'Butterfly Tulip', 'Star Tulip', 'Cat's Ears' en 'Mariposa Tulip'. De naam waaronder wij de *Calochortus* in Nederland kennen, is: Vlindertulp. De bolletjes zijn eetbaar. Na de bloei deelt de bol zich; daarom zou het kunnen gebeuren dat ze het jaar erop volgend, weinig of geen bloemen geeft. Plant de *Calochortus* niet te vroeg in de herfst op een doorlatende grond.



Calochortus 'Burgundy'

Bestelnr. 9451

10 st.

3.50

25 st.

8.25



Calochortus 'Golden Orb'

Bestelnr. 362

10 st.

3.50

25 st.

8.25



Calochortus 'Symphony'

Bestelnr. 8069

10 st.

3.50

25 st.

8.25



Calochortus 'Violet Queen'

Bestelnr. 368

10 st.

3.50

25 st.

8.25

Camassia is een van de bijzondere bolgewassen die uitstekend tot zijn recht komt in een border, maar ook is aan te bevelen voor begroeiing onder heesters. De herkomst van de meeste *camassia's* ligt in Noord-Amerika waar de bollen tot deze eeuw als voedsel dienden voor de Indianen, waaraan de naam *Camassia* (naar Quamash of Camass) werd ontleend. Naast een voedselrijke zandgrond gedijt *Camassia* ook op een zwaardere kleigrond, zolang de grond in de winter maar niet te nat blijft.




Camassia cusickii

Intro: 1888. Herkomst: noordoost-Oregon (U.S.A.). Krachtige bloemstelen ontwikkelen zich uit een grote, peervormige bol. De buitenste bloemblaadjes van de onregelmatig gevormde bloemen zijn hemelsblauw. De meeldraden zijn korter dan de bloem en de witte helmraden die aanvankelijk recht zijn, kronkelen naarmate de bloem rijper wordt. De gegolfde bladeren zijn aan de bovenkant blauwgroen, aan de onderzijde zachtgroen.



Bestelnr. 370	5 st.	4.00
	10 st.	7.50




Camassia leichtlinii 'Alba'

De herkomst van de oorspronkelijke *C. leichtlinii* ligt in Brits-Columbia tot Washington, U.S.A. Vernoemd naar Maximilian Leichtlin (1831-1890) een tuinbouwdeskundige uit Duitsland. De 60-80 cm lange bloemstelen zijn dicht bezet met grote stervormige, roomkleurige bloemen, voorzien van een blauwachtige gloed en violetachtig blauwe meeldraden.



Bestelnr. 374	5 st.	4.00
	10 st.	7.50




Camassia leichtlinii 'Caerulea'

Statige, blauwe bloemtrossen, bezet met grote stervormige donkerblauwe bloemen, worden gedragen door stevige rechte bloemstelen. *Camassia* laat zich perfect combineren in de border met vaste planten. De donkergroene, decoratieve, lineaire bladeren omvatten de bloemsteel rondom en wijzen schuin omhoog.



Bestelnr. 376 **5 st. 4.00**
 10 st. 7.50




Camassia leichtlinii 'Sacajawea'

De roomkleurige bloemen worden bij deze nieuwkomer begeleid door delicaat bont blad. Het smalle blad heeft een roomkleurig randje. Vernoemd naar het Indiaanse meisje Sacajawea die als vrouw van de tolk en gids van de Frans-Canadese handelaar Charbonneau betrokken was bij de Expeditie van Lewis en Clark (1804-1806). Door hen te voeden met Camassiabollen werden zij van de hongersnood gered.



Bestelnr. 9913 **5 st. 4.95**
 10 st. 9.50




Camassia leichtlinii 'Semiplena'

Een steriele halfgevulde vorm. De roomkleurige bloemen met ietsje groen bevinden zich aan 60-80 cm hoge bloemstelen. Doordat de bloemen steriel zijn, bloeien zij nog langer. Prima en opvallende snijbloem.



Bestelnr. 378 **3 st. 4.50**
 5 st. 7.00



Camassia quamash


(Synoniem: o.a. *C. esculenta*)

Afkomstig uit Californië, en oostwaarts tot Montana en Utah. De 6 tot 8 lijnvormige bladeren zijn blauwgroen en de tot 35 cm lange bloemstelen dragen 10 tot 30 stervormige zacht violette bloempjes met een zweem van blauw. Zeer geschikt voor verwildering in een bloemenweide.



Bestelnr. 380

25 st. 3.50
100 st. 12.50



CHIONODOXA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Uit het Grieks: chion (sneeuw) en doxa (glorie, roem). Vandaar de Nederlandse naam: sneeuwroem. Een vroegbloeiend bolgewasje, het merendeel afkomstig uit Kreta en Turkije. De sneeuwroem is bijzonder geschikt voor verwildering, bijvoorbeeld als onderbegroeiing van heesters. Ze zijn nauw verwant aan het geslacht *Scilla*.



Chionodoxa 'Blue Giant'


Een selectie uit 1997. Wellicht de mooiste *Chionodoxa*, schitterende grote, aan de buitenzijde korenbloem-blauwe bloemen met een sprekend ivoorwit hart.

De binnenzijde van de bloemblaadjes is moors- tot paarsblauw. Bloeit lang, zes tot acht weken. In 2010 ontving 'Blue Giant' een jubileumgetuigschrift van de K.A.V.B.



Bestelnr. 387

10 st. 3.25
25 st. 7.50



Chionodoxa luciliae


(Synoniem: *Chionodoxa gigantea*)

Intro: 1878. In de Taurus verzameld door de Zwitserse botanicus Pierre-Edmond Boissier (1810-1885), die deze sneeuwroem vernoemde naar zijn jong gestorven echtgenote Lucile. Bloemsteeltjes met één of twee lavendelblauwe bloempjes met een wit hartje.



Bestelnr. 391

25 st. 2.50
100 st. 9.00



Chionodoxa luciliae 'Alba'


(Synoniem: *C. gigantea* 'Alba')

Geselecteerd door Barr & Sons in 1885. Bloemkleur: helderwit. Goed te gebruiken om bijvoorbeeld te mengen met de blauwe *C. luciliae* en dan uit te strooien om te laten verwilderen.



Bestelnr. 393

25 st. 3.50
100 st. 12.50




Chionodoxa luciliae 'Rose Queen'

Al in 2008 geregistreerd, uit handen van R. Huijg, Breezand. Een nieuwe goed onderscheidende roze selectie.



Bestelnr. 9914

25 st. 3.50
100 st. 12.50




Chionodoxa luciliae 'Violet Beauty'

Als aanvulling op het sortiment sneeuwroem, een mooie grootbloemige vorm met licht blauwvioletten bloemen. Rijkelijk bloeiend in maart-april. Leuk voor in potten gecombineerd met *Viola cornuta*.



Bestelnr. 8071 25 st. 3.50
 100 st. 12.50




Chionodoxa 'Pink Giant'

Een grootbloemige zachtroze selectie uit de jaren veertig in de vorige eeuw. De stervormige bloemen met de witte ogen kijken bij zonnig weer wijd geopend naar boven. Ook in deze tint een heerlijke voorjaarsbode die evenals *C. 'Blue Giant'* in 2010 een jubileumgetuigenschrift van de K.A.V.B. mocht ontvangen.



Bestelnr. 389 25 st. 3.50
 100 st. 12.50




Chionodoxa sardensis

(Naar von Sardus). Herkomst: West-Turkije. Werd in 1883 geïntroduceerd door Barr & Sons. Elk bloemsteeltje heeft wel tien gentiaanblauwe bloempjes, waarbij het witte oogje nauwelijks waarneembaar is.



Bestelnr. 395 25 st. 3.50
 100 st. 12.50



Chionodoxa siehei


(Synoniemen: *Scilla siehei*, foutief *C. forbesii* en *C. luciliae*)

Intro: 1880. Herkomst: West-Turkije. De 15-20 cm hoge bloemsteeltjes zijn aan het uiteinde voorzien van vier tot tien blauwe bloempjes met een groot wit hart. Werd in voorgaande jaren aangeboden onder de naam *C. forbesii*, maar die naam is volgens Brian Mathew foutief.



Bestelnr. 385

25 st. 2.50
100 st. 9.00



CHIONOSCILLA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE


Chionoscilla allenii

De enige vertegenwoordiger van het geslacht *Chionoscilla*, ontstaan uit een samenzijn van *Chionodoxa siehei* en *Scilla bifolia*. Vernoemd naar de ontdekker James Allen, die ze aantrof in zijn tuin in Sheton Mallet, Engeland, eind 19^e eeuw. De bloemen, waarvan de bloembuis kort is, zijn helderblauw met een wat lichter hartje.



Bestelnr. 9452

3 st. 7.50
5 st. 12.00



COLCHICUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER COLCHICACEAE

De Nederlandse benaming 'herfsttijloos' dankt de *Colchicum* aan het veelal verschijnen van de bloemen in de herfst, gevolgd door de bladeren en de vruchten in het voorjaar en voorzomer. Het voor- en najaarsbloeiende knolgewas houdt van een licht beschaduwde plaats, bijvoorbeeld als onderbeplanting van bladverliezende heesters op een wat vochtige maar goed doorlatende grond. De naam *Colchicum* is afgeleid van één der oorspronkelijke vindplaatsen, namelijk de streek Colchis in Klein-Azië, de streek waar de mythologische gifmengster Medea woonde. Ook worden ze aangetroffen in Iran, Turkestan en in grote delen van Europa. Het is al eeuwen bekend dat de herfsttijloos o.a. het alkaloïde colchicine bevat dat in de medische wetenschap gebruikt wordt. *Colchicum* (en dan vooral de grotere maten) is geschikt voor het binnenshuis in bloei brengen. Wat voorheen onder *Merendera* werd aangeboden, treft u nu bij *Colchicum* aan.


Colchicum autumnale

(Synoniemen: *C. autumnale* var. *minus* en *C. autumnale* var. *minor*)

Intro: 1561. (Cultuurvormen ontstaan na 1753). Een species die in grote delen van Europa wordt aangetroffen, met uitzondering van het zuiden en zuidwesten. In Nederland worden ze nog aangetroffen in Zuid-Limburg en in het rivierengebied langs de Maas en de Gelderse IJssel. De stinzenplant is op de oorspronkelijke vindplaatsen meestal vermengd met de witte vorm en heeft meerdere lilaroze tinten.

In Engeland noemt men ze: Naked-Ladies.

Bestelnr. 2104	3 st.	7.95
	5 st.	12.50




Colchicum autumnale 'Alboplenum'

Een gevuldbloemige witte vorm van *C. autumnale* met een vleugje roze op de hartblaadjes. In 1872 ontving deze *Colchicum* al een getuigschrift Eerste Klasse van de Royal Horticultural Society. Uit één bol ontluiken meerdere bloemstelen, hetgeen een lange bloei genereert.



Bestelnr. 2106	p.st.	3.95
	3 st.	11.25




Colchicum bivonae 'Apollo'

Een robuuste cultivar die bij vele kruisingen, waaruit meerdere grootbloemige hybriden zijn ontstaan, gebruikt is als ouder. Grote bekervormige, geurende magenta-purperen bloemen met een wit hart, verschijnen met z'n zessen aan een steel, gebruikelijk twee stelen per bol! *Colchicum bivonae* is inheems in het Mediterrane gebied, Corsica tot West-Turkije.



Bestelnr. 2186	p.st.	3.50
	3 st.	9.75



Colchicum byzantinum


(Synoniemen: *C. autumnale* var. *majus* en *C. autumnale* var. *major*)

Deze, waarschijnlijke hybride van *C. cilicicum*, werd in 1597 voor het eerst waargenomen in Klein-Azië. Het brede, sterk geribde blad verschijnt nooit eerder dan in het voorjaar. Uit de opvallend grote knol ontluiken een twintigtal purperroze bloemen. Eén der beste voor kamercultuur om droog te laten bloeien, maar dan wel direct na de bloei de tuin in.



Bestelnr. 2111

3 st. 6.00
5 st. 9.50



Colchicum cupanii var. pulverulentum

2013


C. cupanii is vernoemd naar de Italiaanse botanicus Francesco Cupani (1657-1710). Wijd verspreid voorkomend in Griekenland, Sicilië, Sardinië, Zuid-Frankrijk en Algerije. De aangeboden vorm komt met name voor in Tunesië en onderscheidt zich van de soort door de golvende bladrandjes en minutieuze beharing op het blad.

De tot elf zachtroze bloemen per knol verschijnen vanaf oktober.



Bestelnr. 9107

p.st. 8.50
3 st. 24.00




Colchicum 'Flamenco Dance'

Ontstaan uit *Colchicum 'Dick Trotter'* x *Colchicum speciosum 'Ordu'* en in 2010 geregistreerd. Vlamvend paarse, slanke, strak opgaande bloemen met een groene hals. Een aanvulling op het assortiment, uit handen van Bondarenko.



Bestelnr. 9653

p.st. 13.50
3 st. 39.00




Colchicum hungaricum 'Velevit Star'

Dit is een robuuste vorm van *Colchicum hungaricum*, afkomstig uit het Dalmatisch kustgebergte. Bloeit rijker dan de meeste gekweekte vormen en verdraagt slechte weersomstandigheden goed. Schitterend zijn de blauwe helmknoppen.

Bestelnr. 2115

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Colchicum kesselringii


(Synoniemen: *C. crociflorum*, *C. albertii* en *C. regelii*)

Intro: 1880. Herkomst: Turkestan en het noordoosten van Afghanistan, vaak samen groeiend met *C. luteum*. Een variabele species waardoor er inmiddels meerdere kloonpartijen aangeboden worden door specialisten uit Litouwen en Letland.

De bloemblaadjes zijn aan de binnenzijde wit. Aan de buitenzijde zijn ze in het midden voorzien van paarse strepen.

Bestelnr. 2121

p.st. 16.50
3 st. 48.00




Colchicum luteum 'Vahsh'

C. luteum is de enige bekende gele *Colchicum* die vanaf februari bloeit. De aangeboden kloon is verzameld in Tadzjikistan door L. Bondarenko. Mogelijk is dit de grootste en de rijkst bloeiende species. De drie tot vier goudgele bloemen worden veelal door een bruinpurperen bloembuis omvat. Het blad verschijnt vrijwel gelijktijdig met de bloemen.

Bestelnr. 2198

p.st. 13.50
3 st. 39.00



Colchicum x 'Lysimachus'




Geselecteerd uit een partij *C. autumnale* die verzameld was op de berg Falakros (bij de stad Drama) in Noord-Griekenland. Waarschijnlijk een hybride met *C. haynaldii*. Krachtig groeiend en rijk bloeiend met lilaroze bloemen, aan de binnenzijde een duidelijk waarneembare witte baan. Vernoemd naar de brute koning die in de geschiedenis in het gebied rondom de vindplaats heeft huisgehouden.



Bestelnr. 9430

p.st. 4.95
3 st. 14.25



Colchicum munzurense




Een voorjaarsbloeiende wildvorm uit Turkije, voor het eerst beschreven in 1999. Uitbundig bloeiend en verbazingwekkend makkelijk vermeerderend. Kleine licht violette bloemen, zwartpaarse meeldraden en een donkere keel.



Bestelnr. 9916

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Colchicum neapolitanum



C. neapolitanum wordt zowel aangetroffen in delen van Zuid-Frankrijk als in Italië. Het aanbod werd gevonden door Miek Hoog in de Provence, dept. Var, in gemengd eiken-beukenbos met jeneverbes in een dikke oude bladlaag, vooral op vochtige plaatsen waar het koel blijft. Het is een kleinbloemige species, nauw verwant aan *C. autumnale*, maar onderscheidt zich door de stand van de meeldraden in de lilaroze bloemen; die staan hier allemaal op één niveau, terwijl dat bij de meeste *Colchicum* op twee hoogtes gebruikelijk is.

Bestelnr. 9917

p.st. 7.50
3 st. 21.00



Colchicum pannonicum


Herkomst: Hongarije, Roemenië. Deze *Colchicum* is eveneens nauw verwant aan *C. autumnale* en wordt door sommige experts zodanig als een ondersoort van *C. autumnale* gezien. Ook al zijn de bloemen slanker en verfijnder. Tevens treft u aanbod aan onder de cultivarsnaam *C. 'Nancy Lindsey'*. De bloemkleur is levendig paarsviolet met een wit streepje op ieder bloemblaadje.



Bestelnr. 2218

3 st. 7.50

5 st. 11.00



Colchicum speciosum 'Album'


Geïntroduceerd door de Backhouse Nursery of York. Vanaf 1900 meerdere malen onderscheiden. Misschien wel de mooiste witte *Colchicum* die er is. Stevige drinkbekervormige witte bloemen met een zachtgroene 'keel'. De bladeren zijn onbehaard.



Bestelnr. 2129

3 st. 7.95

5 st. 12.50



Colchicum szovitsii 'Snowwhite'


Uit de verschillende vormen van *C. szovitsii*, destijds ontdekt in Nakhichevan, Azerbeidzjan, onderscheidde deze selectie zich met de meest zuiver witte bloemen. De talrijke slanke bloemen verschijnen twee weken later dan de andere klonen. Heel erg mooi.



Bestelnr. 2224

p.st. 9.50

3 st. 27.00



Volgens een Oudgrieks woordenboek betekent korys of korythos: hoofdbedekking, helm of stormkap. Hiervan is wellicht het Latijnse korydalis (ge kroonde leeuwerik) afgeleid. De sporen van de bloemen tonen gelijkenis met de kuif van 'n leeuwerik. Het geslacht *Corydalis* omvat honderden fraaie tot zeer fraaie species en de hieruit ontstane cultivars. Alle species, die zich bijzonder lenen voor beplanting onder heesters en bomen, houden van een (half)beschaduwde plek.

Grofweg kunnen we *Corydalis* in twee groepen verdelen:

1: species welke in beboste (B) terreinen voorkomen (vaak afkomstig uit Siberië en het Verre-Oosten). Deze houden van een humusrijke grond die niet mag uitdrogen.

2: species (S) welke op open vlaktes groeien (dus zonder enige bescherming). Deze species vragen in de zomermaanden een droge standplaats.



Corydalis angustifolia 'Talish Dawn'




C. angustifolia komt voor in bosrijke gebieden in Iran, in de Kaukasus en in Turkije. Het aanbod bestaat uit een zachtroze rijk bloeiende vorm die verzameld is in het Talish-gebergte in het zuiden van Azerbeidzjan. "Champagne", riep Arnis toen hij de plant aantrof onder een doornige rozenstruik. Vroeg bloeiend. (B)



Bestelnr. 9919

p.st. 6.50
3 st. 18.00



Corydalis bulbosa


(Synoniem: *Corydalis cava*)

De Nederlandse naam luidt: holwortel. Dit heeft betrekking op het onderaardse gedeelte, dat voor een groot gedeelte hol is. Herkomst: Eurazië. De tot twintig roze of witte gespoorde bloemen vormen een tros en bloeien in het vroege voorjaar. De plant houdt van een wat bosachtige grond. Vroeger was het een veel voorkomende stinzenplant. (B)



Bestelnr. 400


5 st. 4.75
10 st. 9.00



Corydalis buschii

De nu aangeboden 'wortelstokjes' werden ooit aangetroffen in de omgeving van Vladivostok (Siberië). Het is een species met purperrode bloemen. Een leuk verschijnsel van de species is, dat wanneer de wortelstokjes te diep of te ondiep geplant zouden worden, binnen een seizoen een nieuw wortelstelsel op de juiste diepte wordt aangemaakt. Het schijnt ook onmogelijk te zijn, wanneer de plant zich goed gesetteld heeft, deze weer volledig te verwijderen. (B)


Bestelnr. 402	5 st.	4.50
	10 st.	8.50



Corydalis decipiens

Waarschijnlijk een geografische variatie van *C. solida* met opmerkelijk hogere bloemstelen. De bloemkleur is purperroze. Herkomst: van Turkije tot in Scandinavië. (B)


Bestelnr. 404	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



Corydalis densiflora

Inheems in het mediterrane gebied, verwant aan *C. solida*. Een oude kloon die leidt tot in 1904, naar Max Leichtlin van Baden-Baden. De tot twintig helderroze bloemen staan in compacte trosjes boven het mooie, blauwgroene, ingesneden blad. (B)

Bestelnr. 9227	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Corydalis fumariifolia

2013


Een zeer vroeg bloeiende *Corydalis* met helder hemelsblauwe bloemen. Omdat de plant zich zo vroeg ontwikkelt, is het verstandig om de opvallend grijzig witte knolletjes onder heesters te planten. Komt wijd verspreid voor, o.a. in het oosten van Rusland en in het oosten van Noord-Korea, het aangeboden is van Sachalin. (B)



Bestelnr. 9920

p.st. 16.50

3 st. 48.00



Corydalis nudicaulis


Herkomst: Tadzjikistan, Pamir-Alai-bergketen, op rotshellingen tussen de sneeuw. Vanwege de bijzondere bloemkleur: wit met contrasterend bruin, ook wel de 'Koffie-met-melk-corydalis' genoemd. De losjes ogende bloemen kunnen iets variabel zijn, het aanbod komt van een partijje dat opgekweekt is uit zaad. Het ingesneden blad is groengrijs. (B)



Bestelnr. 9191

p.st. 13.50

3 st. 39.00



Corydalis ruksansii


Deze *Corydalis* is door Janis Ruksans in 1991 gevonden in de nabijheid van de rivier Shing in het gebergte Seravschan in Tadzjikistan. In eerste instantie werd gedacht aan *C. glaucescens*. Later werd door Magnus Liden, van de Botanische tuin in Göteborg de naam *C. ruksansii* gegeven. De zeer mooie witte bloemen hebben een blauwe streep in hun sporen. (S)



Bestelnr. 410

p.st. 11.50


3 st. 33.00



Corydalis schanginii subsp. ainae 'Berkara'

Henrik Zetterlund schreef over deze plant: 'You can never forget it if you get a chance to see it'. Doordat Janis enig corydalisloof herkende onder een stekelig rozenstruikje trotseerde hij zelfs de schorpioenen om de knolletjes te pakken te krijgen. Dit speelde zich af in de Berkara-kloof op 26 april 1977. De bloemkleur is fraai, namelijk: geel met een roze spoor en een paarse met chocoladebruine 'neus'. (S)

Bestelnr. 420 p.st. 11.50
3 st. 33.00




Corydalis schanginii subsp. schanginii

(Synoniem: *C. longifolia*)

Waarschijnlijk heeft deze *Corydalis* het grootste verspreidingsgebied van alle Centraal-Aziatische species. Dit aanbod zijn nazaten van planten die in 1975 in Kirgizië nabij Bishek op 1800-2000 m. hoogte werden verzameld. Toen dit wondertje in 1833 werd gevonden, gebruikte men de naam *C. longiflora*. De lange bloemtros bestaat uit witte bloemen, is roze gespoord met paarse 'lippen'. Zeer winterhard. (S)


Bestelnr. 418 p.st. 8.50
3 st. 24.00



Corydalis solida subsp. incisa

De voornaamste vindplaatsen zijn Bulgarije en Noordoost-Griekenland. De diep ingesneden (incisa) bladeren glinsteren op zonnige dagen en de iets variabele wit tot zachtpaarse bloemen verspreiden een heerlijke geur. Een forsere species dan *C. solida*. (B)

Bestelnr. 9193 10 st. 3.50
25 st. 8.25




Corydalis solida subsp. solida

(Synoniemen: *C. densiflora* (?), *C. halleri*, *C. tenella* en *Fumaria bulbosa* var. *solida*)

Nederlandse namen: voorjaarshelmbloem en vogeltje op de kruik. Herkomst: Libanon, West-Azië en grote delen van Europa. In Nederland langs de grote rivieren, rond oude buitenplaatsen en nog hier en daar in Zuid-Limburg. Een bijzonder kenmerk van dit bolgewas is de gootvormende schub aan het begin van de bloemsteel. De bloemen vormen een tros en zijn veelal lila van kleur. Het tere ingesneden blad heeft een frisgroene kleur. (B)


Bestelnr. 422 **10 st. 3.50**
 25 st. 8.25



Corydalis solida subsp. solida 'Beth Evans'

Zacht helderroze bloemen met een wit vlekje op de sporen dat duidelijker zichtbaar wordt naarmate de bloeitijd verstrijkt. Het blad is grover dan bij de andere variëteiten. Betrouwbaar. (B)

Bestelnr. 426 **10 st. 3.50**
 25 st. 8.25




Corydalis solida subsp. solida 'Early Bird'



Wijlen heer Huisman selecteerde dit vroege vogeltje omdat deze tegelijk met zijn sneeuwklorkjescollectie stond te bloeien. Een voor die tijd opvallende rozerode kleur die ook leuk combineert met vroege *Scilla*. (B)

Bestelnr. 9921 **p.st. 5.95**
 3 st. 16.50




Corydalis solida subsp. solida 'G.P. Baker'

Vernoemd naar de plantenliefhebber George Baker die deze intens rode corydalis rond 1935 introduceerde. Nog steeds de meest gevraagde en populaire 'rode' *Corydalis*, schitterend tussen het loof van uitlopende varens. (B)

Bestelnr. 428

5 st. 3.50
10 st. 6.50




Corydalis solida subsp. solida 'Harkov'



Een prachtige vorm van *C. solida* aangetroffen in de Oekraïne. Blauwviolette gespoorde bloemen in robuuste bloemtrossen. Aan het eind van de gespoorde bloem is een wit 'keeltje' zichtbaar. (B)

Bestelnr. 8079

3 st. 7.95
5 st. 12.50




Corydalis solida subsp. solida 'Hot Lips'



Een wat opzichtig vogeltje-op-de-kruk uit Letland. De brede ceriserode rand op de bloemblaadjes omsluiten een smal wit streepje aan de binnenzijde van de bloem. Met wat fantasie lijken het dik gestifte lippen. (B)

Bestelnr. 9922

p.st. 9.50
3 st. 27.00




Corydalis solida **subsp. solida 'Louise Elisabeth'**

2013

Een van de meest ongewone selecties met echt driekleurige bloemen. De sporen zijn licht purperroze naar het topje wit verkleurend. De bovenkant van de bloem is bijna zuiver wit met een vleugje roze, het onderste lipje is echt mooi lichtblauw. De schutblaadjes zijn omrand met een dun purper lijntje. Vernoemd naar de kleindochter van Janis. (B)


Bestelnr. 9923 **p.st. 9.50**
 3 st. 27.00



Corydalis solida subsp. solida 'Purple Beauty'

Ontstaan uit *C. solida* x *C. decipiens*. Opvallend grote bloemtrossen dieppaarse bloemen. Krachtige planten, prima voor verwildering in de border. (B)


Bestelnr. 9456 **3 st. 3.75**
 5 st. 6.00



Corydalis solida subsp. solida 'Purple Bird'

Na jarenlang selecteren uit schitterende zaailingen van *C. solida* had de heer Huisman een serie Vogeltje-op-de-kruk met vogelnamen ontwikkeld. Deze vondst is dieppaars. Er blijkt nu recentelijk een andere selectie onder deze naam geregistreerd te zijn, waarschijnlijk zal de naam nog worden aangepast. (B)

Bestelnr. 9197 **3 st. 4.95**
 5 st. 7.50



Corydalis turtschaninovi


Herkomst: in verschillende bosrijke gebieden op humusrijke gronden in Zuidoost-Rusland. Een laatbloeiende species met mooie blauwe bloemen, soms met een violette zweem. Het blad is diep ingesnedен. (B)



Bestelnr. 9457

p.st. 9.50

3 st. 27.00



CROCUS, HERFSTBLOEIEND

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Herfstbloeiende krokussen groeien vaak in gebieden waar het 's zomers heel droog is. De milde najaarsregen zet de krokus aan tot bloei. De meest bekende is wel *Crocus sativus* die het kostbare saffraan produceert. In het in 2010 verschenen boek 'Crocuses, A complete Guide to the Genus' van Janis Ruksans zijn bijna vijftig pagina's aan deze groep gewijd.



Crocus banaticus


C. banaticus komt voor op vochtige koele plaatsen in Roemenië, het noordoosten van voormalig Joegoslavië en in het zuidwesten van de Oekraïne. Een unieke diep lilablauwe herfstkrokus waarbij de buitenste bloemblaadjes veel langer zijn dan de binnenste. Voor een koel plekje.



Bestelnr. 040

p.st. 4.95

3 st. 13.50




Crocus cancellatus subsp. cancellatus

(Synoniemen: *C. cancellatus* var. *cilicicus*, *C. cancellatus* var. *kotschianus* en *C. cilicicus*)

Intro: voor 1841. Herkomst: Zuid-Turkije, West-Syrië, Libanon en Noord-Israël.
De bloemkleur van deze 7 tot 10 cm hoge species is licht blauwachtig lila met aan de buitenzijde een violette blos. De buitenste kelkblaadjes zijn violet gestreept. Heel mooi zijn de oranje stempels.
Na de bloei verschijnen de bladeren.
De knolletjes zijn eetbaar.


Bestelnr. 2142	10 st.	4.00
	25 st.	9.00



Crocus cartwrightianus 'Albus'

Intro: 1843. Herkomst: Griekenland en op het eiland Kreta. Aanvankelijk werd *C. cartwrightianus* beschouwd als *C. sativus*; zij zijn nauw aan elkaar verwant. Bloem en blad verschijnen gelijktijdig.
De zuiver witte bloemen worden geaccentueerd door drie helderrode stempels.


Bestelnr. 2146	5 st.	3.50
	10 st.	6.50



Crocus goulimy

In Zuid-Griekenland (de Peloponnesus), komt deze species plaatselijk massaal voor in oude olijfbosgaarden en onder vijgenbomen. In november 1954 vond Dr. C. N. Goulimy deze krokus; pas in 1975 werd deze weerbestendige herfstbloeiër naar zijn ontdekker vernoemd.
De buisvormige bloempjes zijn roze met een zweem van lila, aan de binnenzijde voorzien van een wit hartje. Het knolletje heeft iets weg van een hazelnoot.

Bestelnr. 2148	3 st.	4.50
	5 st.	7.00



Crocus goulimyi 'Mani White'

Een schitterende zuiverwitte vorm uit het zuiden van Griekenland, het Mani-schiereiland, ontdekt door M. Hoog. De scherp gepunte bloemblaadjes geven de bloem een aparte vorm. Goed groeiend en betrouwbaar bloeiend.



Bestelnr. 9117

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Crocus kotschyanus




Op 1150 meter hoogte troffen de heren H. Kendorff en E. Pasche in Hatay, een provincie in Turkije, deze schoonheid aan. De lieflijke licht violette bloemen zijn donker generfd. Door de opvallende oranjegele blosjes aan de onderkant van de bloemblaadjes, lijkt het alsof dit een oranje keel is. Wellicht een van de beste nieuwkomers?



Bestelnr. 9926

p.st. 6.50
3 st. 18.00



Crocus laevigatus 'Fontenayi'

(Synoniem: *C. fontenayi*)


Herkomst: Griekenland (de Cycladen). Een bijna winterbloeiende krokus die in de volksmond 'kerstkrokus' wordt genoemd. De binnenkant van de bloem is zachtlila naar de keel witachtig overgaand naar geel. De buitenzijde van de bijna ronde bloemblaadjes bestaat uit een zachtlila ondergrond met een mengeling van bruingele en witte veren.

De gespleten stempels zijn warm oranje.



Bestelnr. 2152

5 st. 3.50
10 st. 6.50




Crocus ligusticus

(Synoniem: *C. medius*)

C. ligusticus komt voor in het noordwesten van Italië, voornamelijk in de provincie Ligurië, ten noorden van La Spezia, tot aan de Alpen in het zuidoosten van Frankrijk, in de directe omgeving van Menton. Zowel de binnen- als de buitenkant van de trechtervormige bloem zijn lilapaars met naar de basis donkerpaarse streepjes. De vertakte oranje stijlen perfectioneren deze fraaie herfstbloei.



Bestelnr. 2156 **10 st. 4.00**
 25 st. 9.50




Crocus mathewii 'Dream Dancer'

De 'Droomkrokus'. Wat een verrijking van het assortiment herfstbloeiende krokussen. Vorig jaar was er een handje vol aanbod van *C. mathewii*, nu bieden we de mooiste vorm aan. Parelmoerblauwe bloemen met een fluweelpaars hart en stempels die naar saffraan geuren. Herkomst: Zuid-Turkije. 's Zomers is een koele standplaats aan te bevelen.



Bestelnr. 9927 **p.st. 12.50**
 3 st. 36.00




Crocus niveus -White Form-

Intro: 1874. Herkomst: het zuiden van Griekenland voornamelijk in de Peloponnesus. Wellicht de mooiste witte najaarsbloei. De keel is geelachtig oranje met een scharlaken stamper die aan de top in drie delen gesplitst is. De helmknopjes zijn geel. Bij voorkeur gedijt deze krokus op een niet te droge standplaats. Een warme zomer resulteert in een goede bloei.



Bestelnr. 2160 **3 st. 7.50**
 5 st. 12.00




Crocus nudiflorus

(Synoniemen: *C. aphyllus*, *C. fimbriatus*,
C. multifidus, *C. medius* en *C. pyrenaicus*)

Zoals de naam nudiflorus (naaktbloemig) aangeeft, verschijnt eerst de bloem. Tijdens de bloeiperiode ontwikkelen zich de bladeren. In de Pyreneeën worden ze massaal aangetroffen. De onderaardse delen lijken echt niet op die van de ons bekende krokus; het zijn curieus gevormde stolonen. De smalle, ietwat spits toelopende bloemblaadjes zijn zacht violet met een onopvallende glans. In tegenstelling tot de meeste andere herfstkrokussen gedijt *C. nudiflorus* beter op een niet uitdrogende bodem.

Bestelnr. 2162

p.st. 4.50
3 st. 12.75




Crocus ochroleucus

De introductie van *C. ochroleucus* dateert van oktober 1859. Ze worden nog steeds aangetroffen in Libanon, het zuidwesten van Syrië en in het noorden van Israël, veelal in rotsachtige gebieden. De bloemkleur is crèmewit met een brede gele basis, de naam is hiervan afgeleid. Het lange blad verschijnt voor de uitbundige bloei.

Bestelnr. 2164

10 st. 4.50
25 st. 10.50




Crocus pulchellus 'Inspiration'

Pulchellus betekent schitterend of prachtig, vandaar de door velen gebruikte naam: prachtkrokus. Stevige intens blauwe bloemen met een oranje hart, een oranje stempel en crèmekleurige helmknoppen. Inheems in de Balkan en in Turkije. Deze krokus is een grootbloemige selectie uit materiaal dat in 1978 door Maria en Rolf Mertens in Bursa in West-Turkije op een hoogte van 1600 meter verzameld is.

Bestelnr. 9119

p.st. 2.95
3 st. 8.25



Crocus pulchellus 'Zephyr'

Een blikvanger geïntroduceerd door de heer Tom Hoog. Elegante grote witte bloemen met een ongewone parelgrijze zweem. De keel is geel met 'n vleugje lichtoranje. Verwildert makkelijk.



Bestelnr. 2172	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



Crocus sativus

De saffraankrokus. Algemeen wordt aangenomen dat *C. sativus* een vorm van *C. cashmirianus* zou zijn. De bloemkleur is lila-achtig paars voorzien van een fraaie nervatuur. De in verhouding grote orangerode stempels steken meestal boven de bloem uit en het is net of ze naar één kant hangen. Het blad verschijnt gelijk met de bloem, soms eerder. Elke bloem bevat een stamper met drie stempels en voor vijf gram kostbaar saffraan zijn circa 600 tot 700 bloemen nodig.



Bestelnr. 2174	10 st.	4.50
	25 st.	11.00




Crocus speciosus subsp. speciosus 'Albus'

Eén van de twee in Nederland gecultiveerde vormen van *C. speciosus*, destijds, in 1913 uit handen van Van Tubergen. Witte bloemen met een oranje keel, probleemloos groeiend. *Crocus speciosus* is inheems op de Krim, Kaukasus, Turkije en Iran.



Bestelnr. 9423	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



Crocus thomasii

2013


Van origine voorkomend op rotsachtige berghellingen tot op 1000 meter hoogte in Zuid-Italië, Servië en Kroatië. De lila tot dieplila gekleurde bloemen geuren heerlijk naar honing. Vanuit de zachtgele keel verschijnen de oranje-rode stempels die iets langer zijn dan de gele meeldraden.



Bestelnr. 8463

p.st. 3.95

3 st. 11.25



CROCUS, VOORJAARSBLOEIEND

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Eén van de bekendste knolgewassen is wel de krokus. Het geslacht kent een zeer groot aantal species en de daaruit voortgekomen honderden cultivars. Het aanbod bestaat uit een tamelijk breed assortiment waaronder zeer zeldzame, soms niet eerder in Nederland verkrijgbare species en cultivars. Vrijwel alle krokussen zijn geschikt voor verwildering.



Crocus ancyrensis

Algemeen voorkomend in Centraal-Turkije en vernoemd naar de stad Ankara. Zij groeien in beboste gebieden met eiken, sparren en dennen, maar zijn op rotsachtige bodem op open plaatsen in de bergen het meest uitbundig. Makkelijk verwilderend, rijk bloeiende en een lekker vroegbloeiende voorjaarskrokus.



Bestelnr. 9675

25 st. 2.75

100 st. 10.00




Crocus biflorus subsp. tauri

Het aanbod is een goed groeiende vorm uit Noord-Turkije, provincie Sivas met attractieve violetblauwe bloemen en een gele keel.

De variabele subspecies kent een veel groter verspreidingsgebied; tot in Noordwest-Iran en Noord-Irak.

Bestelnr. 9460

p.st. 3.50
3 st. 9.75




Crocus corsicus

(Synoniem: *C. insularis*)

Intro: 1838. Ze worden nog aangetroffen op Midden- en Noord-Corsica. Er bestaan slechts twee species op het eiland Corsica, de andere is *C. minimus*. De bloemen van het zeer aparte krokusje zijn aan de binnenzijde licht- tot donkerpaars, de buitenzijde is geelachtig met één, soms drie violette streepjes met een verfijnde nervatuur. De keel is wit tot zachtliila.

Bestelnr. 8537

3 st. 4.95
5 st. 8.00




Crocus etruscus 'Zwanenburg'

Een selectie die dateert van 1939 en zich onderscheidt van de oorspronkelijke species door de fellere roze kleur met een violette glans, tegen het blauw aan.

De buitenste bloemblaadjes zijn purper geveerd op een wat grijze ondergrond.

Bestelnr. 464

25 st. 3.50
100 st. 13.00




Crocus flavus subsp. flavus

(Synoniemen: *C. aureus*, *C. lacteus*, *C. lagenaeflorus*, *C. luteus* en *C. maesiacus*)

Intro: maart 1579. Herkomst: Balkan en het noordwesten van Turkije. Stervormige boterbloemgele bloempjes, naar de keel ietsje donkerder. Een enkele keer treffen we een 'verdwaald' bruin spatje of streepje aan. De meeldraden en de pijlvormige helmknoppen zijn geel.


Bestelnr. 466	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



Crocus fleischeri

Herkomst: Zuid- en West-Turkije. Vernoemd naar Franz von Fleischer (1801-1871) die in 1827 de eerste exemplaren aantrof in de buurt van Izmir. Een heerlijk geurend krokusje. De bladeren zijn lang en smal. De witte sternvormige bloempjes zijn op de drie buitenste bloemblaadjes voorzien van blauwgrijze streepjes die zich in het midden van elk bloemblaadje bevinden. De keel is geel. De in drieën gesplitste stijl is fel oranje. Eigenaardig gevormde knolletjes.


Bestelnr. 468	5 st.	4.50
	10 st.	9.00



Crocus imperati subsp. imperati 'De Jager'

P. de Jager & Sons. Eén der vroegst bloeiende krokusjes. De bloempjes zijn aan de binnenzijde lavendelblauw, de drie buitenste bloemblaadjes zijn ambergeel met kleine donkerpaarse veertjes. De drie binnenste bloemblaadjes zijn heliotroopblauw met drie kleine paarse veertjes. De basis is geel.

Bestelnr. 476	3 st.	4.50
	5 st.	7.00





**Crocus chrysanthus
'Advance'**

2013

Bestelnr. 450

25 st.
100 st.

4.50
17.00



De opvallende groep *Crocus chrysanthus* kenmerkt zich door de vele spectaculaire kleurtjes. De oorspronkelijke vorm (intro: 1843) vindt zijn herkomst op de Balkan. Uitermate geschikt voor verwilderding, prettig vroeg bloeiend.



**Crocus chrysanthus
'Ard Schenk'**

Bestelnr. 452
25 st.
100 st.

2.75
10.00



**Crocus chrysanthus
'Blue Bird'**

Bestelnr. 9205
25 st.
100 st.

4.00
15.00



**Crocus chrysanthus
'Blue Pearl'**

Bestelnr. 456
25 st.
100 st.

2.75
10.00



**Crocus chrysanthus
'Cream Beauty'**

Bestelnr. 460
25 st.
100 st.

2.75
10.00



**Crocus chrysanthus
'Prinses Beatrix'**

Bestelnr. 9868



10 st.
25 st.

3.00
7.00



Crocus chrysanthus 'Herald'



Bestelnr. 9929

10 st. 3.00
25 st. 7.00



**Crocus chrysanthus
'Prins Claus'**

Bestelnr. 8541


25 st. 3.50
100 st. 13.00

Crocus korolkowii

Intro: 1880. Herkomst: Tasjkent en Turkestan.
Vernoemd naar zijn 'ontdekker' generaal Korolkov.
C. korolkowii is erelid van het zogenaamde 'Central Asian Trio': *C. michelsonii*, *C. alatavicus* en *C. korolkowii*. De aangeboden mooie kloon heeft goudgele bloemen met aan de buitenzijde vanaf de basis een brede donkerrode tot donkerpaarse streep, die naar boven versmalt. De knol is vaak hoekig van vorm.



Bestelnr. 480	25 st.	3.95
	100 st.	15.00




Crocus korolkowii 'Golden Nugget' 2013

Geselecteerd door de Tsjech Vaclav Jost, een liefhebber die wij bij Janis in Letland in 2011 ontmoetten en sindsdien hebben wij regelmatig contact. 'Golden Nugget' werd aangetroffen in Agalik. Donker goudgele bloemen, bronskleurig geveerd en besprenkeld.



Bestelnr. 9930	10 st.	2.75
	25 st.	6.25




Crocus kosaninii 'April View' 2013

Een Nederlandse selectie uit *C. kosaninii*. De species komt voor in het zuiden van Servië, in de omgeving van: Kacanik, Brezovica en Bujanovac en werd vernoemd naar Professor N. Kosanin (1874-1934), een botanicus uit het vroegere Joegoslavië. De mooi gevormde bloemen zijn zachtblauw en aan de buitenzijde iets donkerder generfd. Zoals de naam doet vermoeden, bloeit de krokus pas in april.



Bestelnr. 9405	10 st.	3.50
	25 st.	8.25




Crocus minimus

Zoals het woord *minimus* aangeeft, is dit een zeer kleine species die afhankelijk van de standplaats, bloeit van februari tot april. Werd in 1905 geïntroduceerd en komt oorspronkelijk voor op Sardinië en in het zuiden van Corsica.

De binnenzijde van de bloemblaadjes varieert van paars tot donkerpaars, de buitenste bloemblaadjes zijn geelachtig met een duidelijk waarneembare violette nerf, soms spontaan gevlekt.

Bestelnr. 500 **10 st. 4.95**
25 st. 12.00




Crocus olivieri subsp. balansae

(*Synoniem: C. balansae*)

Intro: 1879. Herkomst: West-Turkije. Vernoemd naar de Franse botanicus Benjamin Balansa (1825-1891), die vele malen Turkije bezocht. Volgens de grote kenner Brian Mathew is deze krokus één der mooiste voor wat betreft de kleurzetting. Een sublieme krokus met donkeroranje bloemen en aan de buitenzijde chocoladebruin tot brons gekleurd.


Bestelnr. 502 **10 st. 4.95**
25 st. 12.00



Crocus x reticulatus 'Janis Ruksans'

Door Leonid Bondarenko gewonnen hybride uit *Crocus reticulatus* x *Crocus angustifolius*. Rijk bloeiend met grote, aan de binnenkant goudgele bloemen, de buitenkant is crèmekleurig met purperen streepjes. Een steriele kloon met een goede groei en goed bestand tegen slecht weer. Werd voor het eerst in 2000 door Janis Ruksans aangeboden en in 2004 geregistreerd.

Bestelnr. 8543 **5 st. 5.25**
10 st. 9.95




Crocus sieberi 'Bowles' White'

Grote zuiver witte bolvormige bloemen met een oranje keel. Eén der mooiste witte krokussen die direct na de winter tezamen met *C. sieberi* 'Firefly' hun bloemen tonen.



Bestelnr. 458

10 st. 3.50
25 st. 8.00




Crocus sieberi 'Firefly'

Intro: 1956 door M. Thoolen. Mooie grote zacht violetroze bloemen, een unieke kleur. John Grimshaw zei over deze krokus: "Vigorous, unique, early, beautiful" en nog enige superlatieven werden gebruikt om mij te overtuigen om 'Firefly' in het assortiment te houden.



Bestelnr. 9678

25 st. 3.50
100 st. 13.00




Crocus sieberi 'Hubert Edelsten'

Een heel aparte krokus, vernoemd naar Hubert D. Mc. Edelsten, die in de twintiger jaren de op Kreta inheemse vorm *C. sieberi subsp. sieberi* met *C. sieberi subsp. atticus* kruiste. Hieruit ontstonden twee nieuwigheden, één daarvan is de hier aangeboden vorm. De buitenzijde is glanzend lila met een zilverwitte onregelmatige band, de binnenzijde is zilverkleurig lila. De keel is geel.



Bestelnr. 6011


5 st. 4.95
10 st. 9.50



Crocus sieberi subsp. sublimis 'Tricolor'

E.A. Bowles. Deze elegante krokus heeft een schitterende gedetailleerde pentekening op de buitenkant van zijn bloemblaadjes. Als de bloemen in het zonnetje opengaan, showen zij de binnenzijde van de bloemen. Lilapaars met een witte band en een geel hart. In Engeland wordt deze krokus een 'Snow Crocus' genoemd: krokussen die al bloeien alvorens de laatste sneeuwresten verdwenen zijn en terwijl de vorst nog in de grond zit.


Bestelnr. 506 25 st. 3.50
100 st. 13.00



Crocus 'Spring Beauty'

Een recent geïntroduceerde kleurige krokus, een selectie van *C. minimus*. Zo'n zelfde schitterende bloemkleur, waarbij de binnenzijde lichtblauw is, de buitenzijde purperlila met een witte rand, tevens geel purper gestreept.

Bestelnr. 8547 25 st. 3.50
100 st. 13.00




Crocus veluchensis



Herkomst: Bulgarije, Albanië en Griekenland. De aangeboden partij is afkomstig uit zaad hetgeen verzameld is in Bulgarije. Mooie iets variabele donkerpaarse bloemen met een witte keel. Deze krokus houdt er niet van om in de zomer helemaal uit te drogen, dat komt omdat de nieuwe wortels al gevormd worden alvorens het oude blad afgestorven is. De bol lijdt er niet onder om toch verplant te worden, maar het is wel aan te bevelen om de bollen direct na ontvangst te planten.

Bestelnr. 9931 p.st. 4.95
3 st. 13.50






Crocus tommasinianus 'Ruby Giant'

Bestelnr. 510

25 st.	2.75
100 st.	10.00



Intro: 1847. Nederlandse namen: boerenkrokus en elfenkrokus. Herkomst: het zuiden van 'Joegoslavië' tot in het zuiden van Hongarije, doch hoofdzakelijk op de kalksteenheuvels in Dalmatië.

De stervormige bloemetjes zijn bijzonder rijk bloeiend. Vermeedert spontaan en is een prima krokus voor verwildering. Bloeit in februari, of in geval van een langere vorstperiode in maart.

C. tommasinianus is een Stinzenplant, de andere aangeboden soorten zijn een selectie hieruit.



Crocus tommasinianus

Bestelnr. 508

25 st.	3.50
100 st.	12.50



Crocus tommasinianus 'Barr's Purple'

Bestelnr. 9462

25 st.	2.75
100 st.	10.00



Crocus tommasinianus 'Roseus'

Bestelnr. 9207

10 st.	2.50
25 st.	6.00


Crocus veluchensis 'Alba'



Een erg mooie vorm van deze bijzondere species. De grote puur witte bloemen tonen soms een zweempje roze. Herkomst: Bulgarije, Albanië en Griekenland. Evenals de soort is het aan te bevelen om de bollen direct na ontvangst te planten.



Bestelnr. 9932 p.st. 4.95
3 st. 13.50




Crocus vernus subsp. vernus

(Synoniemen: *C. banaticus*, *C. heuffelianus*, *C. neapolitanus*, *C. purpureus* en *C. scepusiensis*)

Intro: 1765. Herkomst: het voormalige Joegoslavië, Polen, Tsjechië en Slowakije. Een zelden aangeboden krokusje. De kleur is variabel: van bleek- tot donkerpaars veelal met een donkere vlek aan de uiteinden van de bloemblaadjes. Stinzenplant.




Bestelnr. 516 5 st. 3.50
10 st. 6.50




Crocus 'Yalta'

Vernoemd naar de plaats Yalta op de Krim, omdat het zaad waaruit deze schoonheid is geselecteerd, door Janis Ruksans was ontvangen van de botanische tuin Nikitsky in Yalta. Het zaad was afkomstig van een *C. tommasinianus* die vrijwel zeker op een natuurlijke manier gekruist is geweest met een Nederlandse *C. vernus*. De zilver gekleurde buitenste bloemblaadjes vormen een prachtig contrast met de donkere paarse binnenste bloemblaadjes. De bloemgrootte houdt het midden tussen die van beider ouders.

Bestelnr. 8091 25 st. 3.95
100 st. 15.00





Grootbloemige krokussen, bekend als “large Dutch crocuses”, veelal toegepast in openbaar groen. Betrouwbaar terugkomend en sterk. Waarschijnlijk allemaal nakomelingen van de Italiaanse wildvormen, wellicht in de toekomst ingedeeld onder *Crocus xcultorum*.

Crocus vernus
-mengsel in de tinten blauw en wit-

Bestelnr. 9933
25 st. 4.95
100 st. 18.50



Crocus vernus
‘Grand Maitre’

Bestelnr. 9935
25 st. 4.95
100 st. 18.50



Crocus vernus
‘Grote Gele’

Bestelnr. 9934
25 st. 4.95
100 st. 18.50



Crocus vernus
‘Jeanne d’Arc’

Bestelnr. 9936
25 st. 4.95
100 st. 18.50



Crocus vernus
‘King of the Striped’

Bestelnr. 9937
25 st. 4.95
100 st. 18.50



Crocus vernus
‘Negro Boy’

Bestelnr. 9938
25 st. 4.95
100 st. 18.50

De naam Cyclamen is afkomstig van de oude Griekse plantennaam 'Kyklaminas' ('Kyklos'), dat wil zeggen: kring of schijf verwijzend naar de schijfvormige knollen.

Een cyclaam moet 'n paar jaar 'vaststaan' alvorens tot rijke en optimale bloei te komen.

Het vermeerderen geschiedt door uitzaai, direct zodra het zaad rijp is.

Een cyclaam groeit en bloeit het beste in een humusrijke grondsoort met een goede drainage.

Beschermd tegen teveel koude in de winter door een lage onderbeplanting; 'n rustperiode in de zomer (zon en warmte) en enige schaduw tegen fel zonlicht in de winter en lente.

Al het aangeboden is uitsluitend op Nederlandse en Engelse kwekerijen vermeerderd materiaal. Voor het eerst worden de Cyclamen in pot geleverd. Dit zorgt voor een makkelijkere hergroei van de knol.

Cyclamen africanum




(Synoniemen: *C. ambiguum*, *C. commutatum*, en *C. numidicum*)

Herkomst: Noord-Afrika, voornamelijk in Tunesië en Algerije. Ze tonen enige gelijkenis met *C. hederifolium*. De ronde, soms hartvormige en vlezige bladeren zijn donkergroen met een onopvallende markering. De geurende bloempjes zijn roze gekleurd met een donkerrood oog. Redelijk winterhard.



Bestelnr. 525

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Cyclamen alpinum


(Synoniemen: *C. trochopteranthum* en *C. coum* subsp. *alpinum*)

Intro: rond 1872. Herkomst: het zuidwesten van Turkije. De bloemkleur varieert van donkerroze tot diep karmijnroze met een paarsrode vlek in de keel. De kroonblaadjes zijn gedraaid en lijken in bovenaanzicht op een propellertje. De ronde tot eivormige bladeren zijn donkergroen en vaak crèmewit gemarmerd. Ze geuren naar honing.



Bestelnr. 557


3 st. 7.50
5 st. 12.00



Cyclamen balearicum

Aanvankelijk werd aangenomen dat deze species uitsluitend op de Balearen zou voorkomen. Later werden ook exemplaren aangetroffen in Zuid-Frankrijk, groeiend in de schaduw in struikgewas. De smalle witte bloempjes met een grijsroze gloed geuren heerlijk. De bladeren zijn zilverkleurig of groen met heel veel zilveren vlekjes. De plant heeft bescherming tegen strenge vorst nodig.


Bestelnr. 527 3 st. 7.50
 5 st. 12.00



Cyclamen cilicium

Intro: 1872. Herkomst: Turkije, vooral in de bosrijke omgeving van het Taurus gebergte. Zachtroze, soms roze bloemen zijn vaak voorzien van een W-vormige vlek op iedere lob. De bladeren zijn grijs of crèmewit gevlekt en licht getand. Winterhard tot -18 °C.


Bestelnr. 529 3 st. 6.00
 5 st. 9.50



Cyclamen cilicium forma album

Een vorm van *C. cilicium* met zuiverwitte bloemen die verschijnen in de periode september tot november. De kleine bloemen met bloemblaadjes van 15 tot 20 mm lengte verspreiden een heerlijke honinggeur.

Bestelnr. 523 3 st. 7.50
 5 st. 12.00




Cyclamen coum subsp. coum

(Synoniemen: *C. coum subsp. hiemale* en *C. orbiculatum var. coum*)

Herkomst: Oost-Bulgarije, Noord- en Zuid-Turkije, West-Syrië, Libanon, Noord-Israël en het schiereiland Krim. In de aangeboden partij treft u witte tot purperroze bloemen aan met tussenliggende kleuren in vele rozetinten. Het blad is rond tot niervormig en heeft een vrijwel gave rand; de bladkleur is zeer variabel. Winterhard tot maar liefst -30 °C.

Bestelnr. 531	3 st.	6.00
	5 st.	9.50




Cyclamen coum subsp. coum 'Album'

(Synoniem: *C. atkinsii 'Album'*)

Intro: 1646. Een witte vorm met een karmijnen gloed en soms ook een karmijnrood oogje. De niervormige bladeren zijn 'gewoon' groen.


Bestelnr. 533	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Cyclamen coum subsp. coum 'Rubrum'

Selectie van purperrood bloeiende planten. Misschien wel de meest opvallende kleur wanneer de bloemen tussen de sneeuwresten te voorschijn komen. Ook fantastisch in combinatie met sneeuwklokjes.

Bestelnr. 8557	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Cyclamen coum subsp. elegans

2013


(Synoniem: *C. elegans*)

Een zelden aangeboden Cyclamen uit de bossen van Noord-Iran. In eerste instantie werd gedacht dat het een eigen species zou zijn, maar nu ingedeeld als subspecies bij *C. coum* terwijl zowel het blad als de bloemen groter zijn. Het hartvormige gemarmerde blad is vaak voorzien van een langwerpige patroon. De bloemen zijn roze met een donkerroze blosje.

Bestelnr. 9939

p.st. 3.50

3 st. 9.75




Cyclamen cyprium

Herkomst: West- en Noord-Cyprus, in bossen met een rotsachtige ondergrond. Het is een jaarlijks genot voor de Cyprioten wanneer deze heerlijk geurende cycloam en masse in de herfst en winter staat te bloeien. De bloemen verschijnen gelijk met het blad en zijn wit of zeer zachtroze met een magenta keelvlek. De hartvormige olijfgroene bladeren zijn verfraagd met grijze of crèmekleurige streepjes en aan de onderzijde voorzien van een purperen gloed. De plant heeft bescherming tegen strenge vorst nodig.

Bestelnr. 543

3 st. 7.50

5 st. 12.00



Cyclamen graecum

(Synoniemen: vele o.a. *C. aegineticum*, *C. cypro-graecum*, *C. maritimum*, *C. mindleri*, en *C. pseudograecum*)


Intro: ca. 1930. Herkomst: Zuid-Griekenland, Kreta, West- en Zuid-Turkije, Noord-Cyprus. Op de oorspronkelijke vindplaatsen worden de knollen op een grote diepte aangetroffen, hetgeen wordt veroorzaakt door de vlezige 'bijwortels'.

De bloemkleur is van zachtroze tot ceriseroze, met drie rode streepjes aan de binnenzijde van elk bloemblaadje. De bladtekening is variabel; overwegend in de tinten groen, grijs en crème.

Bestelnr. 559

p.st. 3.50


3 st. 9.75



Cyclamen hederifolium var. hederifolium -paarse selectie-

Een schitterende aangeboden partij met diep paarse bloemen. Door A. Koen op de bloemen uit zaailingen geselecteerd. Het decoratieve blad is licht variabel.

Bestelnr. 8093 3 st. 6.00
 5 st. 9.50




Cyclamen intaminatum

(Synoniem: *C. cilicium* var. *intaminatum*)

Werden in juni 1934 door E.K. Balls verzameld in de omgeving van Burujuk, Noordwest-Turkije. Voorkomend op rotsachtige bodem en tussen boomwortels (eiken). De geschulpte bladeren zijn donkergroen met zilverachtige vlekken. De bloemkleur is wit, soms zeer zachtroze. Een heel mooi fijn cyclaampje.


Bestelnr. 547 3 st. 7.50
 5 st. 12.00



Cyclamen libanoticum

Een bijna uitgestorven species die nog sporadisch voorkomt in de bergen van Libanon. Het is één van de mooiste cyclamen met grote lichtroze geurende bloemen die in het voorjaar, februari-april, verschijnen. Op de bloemblaadjes is aan de buitenzijde een duidelijk zichtbaar rood merkje te zien. Het donkergroene blad met onregelmatige lichtere patronen is aan de onderkant glanzend rood gekleurd. Voor de zekerheid deze cyclamen tegen strenge vorst beschermen.

Bestelnr. 8095 p.st. 3.50
 3 st. 9.75




Cyclamen mirabile

Volgens de overlevering werden in 1901 de eerste exemplaren verzameld in het zuidwesten van Turkije (Anatolië) en via het toenmalige Smyrna (nu Izmir) door de firma Van Tubergen ingevoerd. De donkergroene bladeren zijn hartvormig met onregelmatige grijsgroene, crème of zilveren vlekken en zijn getand. De geurende roze bloemen met een steenrood oog verschijnen vanaf september. Tip: een handje gecomposteerde dennennaalden door de grond mengen. Winterhard tot -18 °C.

Bestelnr. 549

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Cyclamen persicum subsp. persicum

Intro: waarschijnlijk 1739. Herkomst: Rhodos, Cyprus, Kreta(?), op 'n enkele locatie in Zuid-Griekenland (de omgeving van Athos), Zuidwest-Turkije, Jordanië, Libanon, Israël, het noordoosten van Algerije en Noord-Tunesië. Uit deze van december tot maart bloeiende species ontwikkelden hybridiseurs de welbekende (pot)cyclamen. De bloemkleur varieert van wit tot zachtroze. Geurend. De veelal hartvormige, getande groene bladeren kennen vele vormen en zijn voorzien van lichtgele strepen en stippen. Niet goed winterhard.

Bestelnr. 551

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Cyclamen pseudibericum

Het is één der mooiste voorjaarsbloeiende cyclamen, al bekend sinds 1895. In 1952 aangetroffen door de Turkse botanicus Dr. Demiriz op de Duldul Dag in de provincie Adana (het Adanus gebergte). De hartvormige bladeren zijn gekarteld en aan de onderzijde purperrood. Waarschijnlijk heeft deze wildvorm de donkerste bloemkleur, donker paarsrood naar de keel donkerder. Nabij het oog is elk bloemblaadje gemarkeerd met een vlekje in de vorm van een schoppenaas. Geurend.

Bestelnr. 553

3 st. 7.50
5 st. 12.00



Uit het Grieks: *dichelos* (twee-wiggig) en *stemma* (kroon). Dit heeft te maken met de meeldraden van *D. congestum* die halverwege in twee delen zijn gesplitst.

Ze verlangen een zonnige standplaats met een goed doorlatende grond. Vermeerderen geschiedt uit zaad of door het in de herfst afnemen van de jonge klisters. Deze klisters zullen dan na twee tot drie jaar weer bloeien. Het zijn goed houdbare snijbloemen.




Dichelostemma congestum

(Synoniem: *Brodiaea congesta*)

Intro: 1806. Herkomst: Washington tot Noord-Carolina (U.S.A.). Een bolgewas met dicht op elkaar staande zacht lilablauwe buisvormige bloempjes, geplaatst boven op een bladloze 70-90 cm lange bloemsteel. Zeer langdurig bloeiend en schitterend voor op de vaas en prima te combineren in de border samen met *Papaver* en *Nepeta*.



Bestelnr. 561	10 st.	3.50
	25 st.	8.00




Dichelostemma ida-maia

(Synoniemen: *Brodiaea ida-maia*, *B. coccinea* en *Breevoortia ida-maia*)

Intro: 1870. Herkomst: Californië en Oregon waar ze groeien en bloeien in de 'Redwood' bossen, voornamelijk op graslanden. De Amerikaanse naam 'Firecracker-Flower' (vuurwerkbloem) is zeer toepasselijk: de bloemknop die zich bevindt aan 50-60 cm lange veelal kromme stengels spat uit één in vijf tot negen vuurrode hangende en buisvormige bloempjes, die weer geaccentueerd worden door heldergroene topjes en een wit hart.

Bestelnr. 563	10 st.	3.00
	25 st.	7.00




Dichelostemma 'Pink Diamond'

Een hybride die is ontstaan uit *D. ida-maia* x *D. multiflorum*. De kleur is roze met groen. Voor wie het rood van de *D. ida-maia* te vurig is, is dit een prima alternatief. Mede door de frivole groeiwijze mooi te combineren met *Geranium*, *Nepeta* of *Alchemilla*.



Bestelnr. 565

10 st.	3.00
25 st.	7.00




Dichelostemma volubile

Een klimmende *Dichelostemma*, voorkomend aan de voet van de bergen in Californië. De stengel kan tot 2 meter lang worden en kronkelt zich een weg omhoog door struikgewas in de natuur. In de tuin kan ook een oude tak als steunmateriaal fungeren. Een dicht bloemscherf met roze bloemen. Een aanrader, een originele klimplant.



Bestelnr. 567

p.st.	4.95
3 st.	13.50



ERANTHIS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER RANUNCULACEAE


Nederlandse naam: winterakoniet. De naam werd ontleend aan de Griekse woorden: er (lente) en anthos (bloem). De ondergrondse delen zijn nogal klein, ongeveer de grootte van een erwt en veelal onregelmatig van vorm; grotere exemplaren lijken op een vleugelmoer! De bladeren vormen een op de grond liggend rozet, de bovenste bladeren tonen enige gelijkenis met een halskraag, die de bloemen omvat. De gele bloemen voorzien van vele meeldraden bevinden zich aan het einde van zeer korte (ca. 5 cm) steeltjes en vormen na enige tijd een waar bloementapijt. Na de bloei verschijnen de stervormige zaaddozen. Wanneer ze openbarsten, zullen de ronde zaden voor vele nakomelingen zorgen.



Eranthis cilicica

Intro: 1892. Herkomst: Turkije waar de vindplaatsen, ondanks de late 'ontdekking', al vrij aardig zijn leeggeroofd. De bladeren zijn diep ingesneden en enigszins bronsgroen bij het ontluiken. Ze bloeien iets later dan *E. hyemalis*, maar de goudgele bloemen zijn weer groter terwijl de halsband rond de bloem kleiner en fijner gedeeld is. *E. cilicica* verlangt een drogere standplaats en meer zon.


Bestelnr. 570 25 st. 4.50
100 st. 17.00



Eranthis hyemalis

Intro: 1570, hier en daar komen ze nog verwilderd voor. Herkomst: Zuid-Frankrijk, Italië, voormalig Joegoslavië en Bulgarije, maar ook in Noord-Irak en Afghanistan. De bladeren zijn niet zo diep ingesneden als die van *E. cilicica*, de bloemsteeltjes zijn wel wat langer (7-10 cm) en de bloemdoorsnede is vaak niet groter dan twee cm. De bloemkleur is heldergeel. *E. hyemalis* verdraagt een wat vochtigere bodem en kan meer schaduw hebben.


Bestelnr. 572 25 st. 4.50
100 st. 17.00



Eranthis hyemalis 'Grünling'

In de tuin van Frau Ruth Treff in Darmstadt worden bijzondere winterakonieten aangetroffen. Zo ook 'Grünling'. Op de buitenzijde van de diepgele bloemblaadjes zit een groene streep, soms ook aan de binnenkant van de blaadjes. Uniek!

Bestelnr. 9467 p.st. 7.50
3 st. 21.00




Erant^his *hyemalis* 'Grünspecht'

Eén van de gevuldbloemige vormen van *E. hyemalis*. De volle, iets onregelmatige bloemen zijn groengeel en vaak voorzien van een groen blosje dat naarmate de bloei vordert, verdwijnt. Uiteindelijk wordt ook het hartje van de bloem zichtbaar zodat vroege insecten de winterakoniet volop kunnen bezoeken.



Bestelnr. 9468 p.st. 8.95
3 st. 25.50




Erant^his *hyemalis* 'Schwefelglanz'

Sterk onderscheidend van de bekende *Erant^his* is deze zacht zwavelgele akoniet. Ook ooit aangetroffen in de tuin van Frau Ruth Treff in Darmstadt. Makkelijk groeiend en fantastisch gezelschap voor de sneeuwkllokjes.



Bestelnr. 9469 p.st. 5.25
3 st. 15.00



EREMURUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ASPHODELACEAE

Nederlandse namen: Naald van Cleopatra en Steppenlelie. *Eremurus* komt van de Griekse woorden: eremos (woestijn, eenzaam) en oura (staart). De natuurlijke vindplaatsen zijn de droge rotsachtige en sterk begraasde berghellingen van Oost-Turkije tot aan de Himalaya, met species in China. De wortels zijn dik en vlezig en doen denken aan een zeer groot model spin. Ondanks deze 'grootte' dient een *Eremurus* zeer ondiep te worden geplant: drie cm aarde op de wortelvormende knol is voldoende. Zoals de natuurlijke standplaats aangeeft, verlangt een *Eremurus* een goed doorlatende en voedselrijke zanderige grond op een zonnig plekje. Let wel op in de winter, eremurus is enigszins vorstgevoelig, afdekken dus.



Eremurus fuscus




Wordt massaal aangetroffen in o.a. Oezbekistan op hoogtes van 2000 meter. De bloemstelen bereiken makkelijk een meter en de bloemaren zijn bezet met ontelbare zachtgele bloemen. De helmknoppen worden in een later bloeistadium bruin waardoor de bloemaar een goudbruine zweem over zich heen krijgt. Nauw verwant aan *E. altaicus*.



Bestelnr. 9942

p.st. 4.95
3 st. 14.25




Eremurus himalaicus

Intro: 1811. De herkomst van deze zuiver witte species ligt in het noordwestelijk gelegen deel van de Himalaya. De bloemaar, bestaande uit vele witte bloemen, bereikt op z'n sloffen 80-90 cm, terwijl de totale lengte van de bloemsteel gemiddeld twee meter kan worden.



Bestelnr. 575

p.st. 5.95
3 st. 16.50




Eremurus robustus

Intro: 1871. Herkomst: Afghanistan en Centraal-Azië. Robustus betekent: sterk, krachtig. De hoogte kan wel 250 cm zijn, waarvan de bloemtros een lengte van zo'n 100 cm voor haar rekening neemt.



Bestelnr. 577

p.st. 6.95
3 st. 19.50



Eremurus stenophyllus

(Synoniem: *E. bungei*)


Intro: 1914. Inheems in Centraal-Azië, vooral in Kopet Dag, Iran, Afghanistan, West-Pakistan en de Pamir Alai, op stenige hellingen. De kanariegele bloemaren bereiken een lengte van 40 cm, de totale lengte van de plant is ongeveer 100 cm, maar kan iets variëren. Opvallende rode meeldraden.



Bestelnr. 8563

3 st. 6.00

5 st. 9.50



ERYTHRONIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER LILIACEAE

Het geslacht *Erythronium* is al vele eeuwen in cultuur. Eén van de redenen dat het aanbod zo schaars blijft, is te wijten aan de moeilijke teelt. Knollen van *Erythronium* zijn erg gevoelig voor wind en mede daardoor kunnen de bolletjes na het rooien snel indrogen. Machinaal rooien is niet bevorderlijk voor de kwaliteit, een beschadiging op de knol leidt al snel tot schimmelvorming. Het verspreidingsgebied is groot: Midden- en Zuid-Europa, Iran en de Kaukasus en vele species vinden hun oorsprong in Noord-Amerika. De hybriden, ontstaan uit kruisingen van *E. tuolumnense* x *E. revolutum*, zijn van Nederlandse afkomst (onder andere van de heer L. Slikker). De Nederlandse benaming hondstand is ontleend aan de vergroeide buisvormige bol, vergelijkbaar met de tand van een hond. De bladeren staan tegenovergesteld, zijn breed ovaalvormig en steeds twee per plant. Vrijwel alle *Erythronium* hebben een schitterend getekend blad. Een opvallend detail is dat behalve vele soorten die knikkende bloemen hebben, de toppen van de bloemblaadjes naarmate uitbloei vordert, achterwaarts gebogen zijn. De planten houden van een wat zanderige humusrijke grond op een beschaduwde plekje en de bollen dienen vrij diep te worden geplant. Ze kunnen vele jaren op dezelfde plaats staan en vermeerderen zich voornamelijk door zaad.

Erythronium californicum


Intro: 1904. Inheems in voornamelijk de beboste kustgebieden van Noordwest-Californië. De crèmekleurige bloemen, meestal twee tot drie per bloemsteel, hebben mooie oranjegele tekeningen aan de basis en steken ruim boven het schitterend gemarmerde blad uit. De aangeboden partij is uit zaad geteeld, direct afkomstig uit Californië.



Bestelnr. 8111

p.st. 6.50

3 st. 18.00




Erythronium 'Kondo'

Een kruisingsproduct van *E. tuolumnense* x *E. 'White Beauty'*. Zwavelgele knikkende bloemen met een opvallende bruine ring in de keel. De bladeren zijn lichter getekend dan die van *E. 'Pagoda'*. In de jaren zestig rijkelijk onderscheiden met vele awards.



Bestelnr. 8115	5 st.	4.50
	10 st.	8.50




Erythronium 'Pagoda'

Eveneens een kruising van *E. tuolumnense* x *E. 'White Beauty'*, met dank aan dhr. Lou Slikker die het selectieproces begeleidde. De ca. 30 cm hoge bloemstelen worden geflankeerd door vier tot vijf knikkende zwavelgele bloemen met in de keel een opvallende brede roodbruine kring. De bladeren zijn gevlekt met 'n ietwat overheersing van een bronskleurige gloed. In 2010 reikte de K.A.V.B. aan deze selectie een jubileumgetuigschrift uit.



Bestelnr. 606	10 st.	4.00
	25 st.	9.50




Erythronium revolutum

Geïntroduceerd rond 1895. Inheems langs de westkust van Noord-Amerika. Meestal vier tot vijf bloemen per steeltje, variërend in kleur van zachtroze tot purperroze. Ook de bloemtekening is variabel, geel tot oranjegele cirkels, of soms zelfs bruinrode vlekjes rond de keel. Het blad is licht gemarmerd. Gedurende de zomer mag de plant niet te droog komen te staan.




Bestelnr. 8117	p.st.	6.95
	3 st.	19.50





ERYTHRONIUM DENS-CANIS



Erythronium dens-canis

Bestelnr. 587

5 st.	4.50
10 st.	8.50

Wordt sinds 1596 in cultuur aangetroffen. Naast de meest voorkomende Nederlandse benaming: hondstand of hondstandviooltje wordt ook gebruikt: addertong of lamstong, lawinelelie en hertenlelie. Schitterend gemarmerd blad. Worden ze geplant (als onderbegroeiing) in een voedselrijke niet te droge grond dan kunnen ze zich, na een wat langzame start, snel vermeerderen. Het aanbod betreft de wildvorm en een aantal mooie selecties.



Erythronium dens-canis 'Frans Hals' 

Bestelnr. 590
3 st. 7.50
5 st. 12.00



Erythronium dens-canis 'Lilac Wonder'

Bestelnr. 592
3 st. 7.50
5 st. 12.00



Erythronium dens-canis var. niveum 

Bestelnr. 9943
p.st. 5.50
3 st. 15.00



Erythronium dens-canis 'Pink Perfection' 

Bestelnr. 594
3 st. 7.50
5 st. 12.00



**Erythronium
dens-canis 'Rose Queen'**

Bestelnr. 598
 3 st. 7.50
 5 st. 12.00




**Erythronium
dens-canis 'Snowflake'**

Bestelnr. 600
 3 st. 7.50
 5 st. 12.00



Erythronium dens-canis 'Purple King'

Bestelnr. 596
 3 st. 7.50
 5 st. 12.00




Erythronium sibiricum subsp. sibiricum

De uit Siberië afkomstige tegenpool van *Erythronium dens-canis*. Ze bloeien later, maar de bloemen zijn aanmerkelijk groter: cyclamen-purper met gele helmknopjes.

De vegetatieve vermeerdering gaat moeizaam, maar als het verse zaad direct gezaaid wordt, dan is deze schoonheid goed te vermeerderen.

Op www.pcnijssen.nl worden nog twee nieuwigheden aangeboden: *E. sibiricum* 'Gornaya Shoria' en 'Grandiflora'.


Bestelnr. 8565 p.st. 12.00
3 st. 34.50



Erythronium 'White Beauty'

Intro: ca. 1895. Een cultivar met grote witte bloemen met in de keel een smalle bruingele ring. Het blad is is mooi gemarmerd en overwegend lichtgeel geaderd. Deze roomwitte schoonheid zal zich op humusrijke grond prima uitbreiden.

Bestelnr. 608 5 st. 4.95
10 st. 9.50



Onkruidwieder of cape cod weeder

Gesmeed en uitgehard van zeer hoogwaardige kwaliteit staal.



totale afmeting : 400 mm
afmeting blad : 85x20 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4704 (Linkshandig) p.st. 25.00
Bestelnr. 4705 (Rechtshandig) p.st. 25.00

Schepel

Gesmeed en uitgehard van zeer hoogwaardige kwaliteit staal.



totale afmeting : 450 mm
afmeting blad : 120x40 mm
handvat : essenhout

Bestelnr. 4706 (Linkshandig) p.st. 25.00
Bestelnr. 4707 (Rechtshandig) p.st. 25.00

Warrenhakje met punt

Uitgesmeed, gehard en ontlaten.

Doordat het materiaal volledig is uitgehard, is dit hakje zelfslijpend.



Bestelnr. 4709 p.st. 25.00

De naam is afkomstig van het Latijnse woord: fritillus, dit betekent dobbelbeker. Eén van de opvallendste kenmerken van *Fritillaria* is het gat (gaatje) in de bol. Dit is vooral bij de grote cultivars duidelijk waarneembaar. Deze opening markeert de plaats waar de oude bloemstengel heeft gezeten. De bol is vrij kwetsbaar vanwege het ontbreken van 'n droge, beschermende huid. Vrijwel alle fritillaria's hebben hangende klokvormige bloemen.

De grondsoort behoort goed doorlatend en humusrijk te zijn waar de *Fritillaria* diep moet worden geplant. Hoewel de bollen redelijk winterhard zijn, wordt een winterdek warm aanbevolen. De decoratieve zaaddozen zijn te verwerken in boeketten.




Fritillaria acmopetala

(Synoniemen: *F. lycia* en *F. intermis*)

Intro: 1874. De bladzetting aan de tot 50 cm hoge bloemsteel is opvallend. Slechts enkele dunne bladeren staan om de 10 cm aan de bloemsteel. Tot drie knikkende klokvormige bloemen per bloemsteel. Aan de buitenzijde zijn de bloemblaadjes olijfgroen met bruine vlekken terwijl de binnenzijde kastanjebruin is. Herkomst: het zuidwesten van Turkije, Syrië, Libanon en Cyprus waar ze in wijngaarden worden aangetroffen. Op de oorspronkelijke vindplaatsen worden ze als 'onkruid' afgedaan!

Bestelnr. 620

10 st.	4.50
25 st.	10.50




Fritillaria amana

(Synoniemen: *F. hermonis* subsp. *amana*, *F. guicciardii*, *F. ochridiana*, *F. unicolor*, *F. urmensis* en *F. zahnii*)

Intro: 1975 door E.K. Bells. Herkomst: Turkije (het Amana gebergte), Syrië en Libanon. Eén, soms twee breed klokvormende bloemen op een 20-30 cm hoge bloemsteel. De bloemkleur is groen met een variabel bruinachtig purperen ruitpatroon aan de randen van de buitenste bloemblaadjes. De bladeren zijn glanzend groen.

Bestelnr. 628

5 st.	4.50
10 st.	8.50




Fritillaria amana 'Goksun Gold'

De groene kleur in *F. amana* is hier vervangen door een mooie diep goudgele kleur. Er zit minder rood in de bloem en het bruine ruitpatroon is ook niet aanwezig. Deze mooie vorm van *F. amana* is gevonden op de berg Goksun in Zuid-Turkije.

Bestelnr. 618

p.st. 6.95
3 st. 19.50



Fritillaria armena




(Synoniemen: *F. brevicaulis* en *F. tulipifolia*)

Intro: 1846. Herkomst: het noordoosten van Turkije, op leiesteentachtige hellingen op plekjes bij de laatste restjes smeltende sneeuw. De oorspronkelijke species alsook de gekweekte vorm komt steeds minder voor. Het bloemsteeftje is slechts 5 tot 7 cm hoog en is omgeven door drie tot vier grijsgroene blaadjes. De hangende donkerpaarse met bruine bloempjes zijn aan de buitenzijde overdekt met een grijze blos.

Bestelnr. 630

p.st. 7.95
3 st. 22.50




Fritillaria aurea

(Synoniemen: *F. cilico-taurica* en *F. bornmuelleri*)

Intro: 1854. Inheems in Centraal-Turkije waar deze groeit tussen kalksteenrotsen en klippen, vaak bij smeltende sneeuwplekken op 1800-2000 meter hoogte. Waarschijnlijk de mooiste geelbloeiende *Fritillaria* met een enkele hangende klokvormige bloem, voorzien van een bruin ruitpatroon. Behoorlijk variabel in hoogte.

Bestelnr. 8121

p.st. 9.50
3 st. 27.00



Fritillaria bithynica subsp. carica


(Synoniem: *F. carica*?)

Vindplaatsen voornamelijk in cederbossen in het zuidwesten van Turkije. De 10-15 cm hoge steel heeft brede, lancetvormige bladeren, gerangschikt in paren, tegenover elkaar staand met een grijze gloed. De bloemkleur is geel met een zweem van bruin en groen.



Bestelnr. 640

p.st. 2.95
3 st. 8.25




Fritillaria bucharica 'Giant'

Intro: 1884. Herkomst: Noord-Afghanistan, Tadzjikistan en het oosten van Oezbekistan. De donkergroene bladeren zijn breed lancetvormig die naar de top smaller worden. Zo'n acht tot tien witte bloemen met een grijsachtige waas is normaal. Verlangt een droge en zonnige plek gedurende de zomermaanden.



Bestelnr. 642

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Fritillaria bucharica 'Hodji-Obi-Garm'




Een rijk bloeiende en krachtig groeiende vorm, aangetroffen in het dorp Hodji-Obi-Garm, gelegen in het hogere gebied rond de Varzob-rivier in Tadzjikistan. Witte bloemen met groene nectariën, aan de buitenkant groenig getint vanuit het bloemsteeltje. Glanzend groen blad.



Bestelnr. 9946

p.st. 4.95
3 st. 14.25




Fritillaria camschatcensis

(Synoniem: *Lilium camschatcense*)

Intro: 1757. De enige trans-Atlantische species. Komt voor in Noord-Amerika, van Washington tot Alaska en daar door de Eskimo's: Eskimo-aardappelen genoemd. Ook wordt hier de naam Chocolate Lily gebruikt. Ze worden ook aangetroffen op de Koerilen, Kamtsjatka en Noord-Japan. 'Rijstekorrelbolletje' is een toepasselijke bijnaam, dit vanwege de vele kraaltjes die na uitgroei de oorspronkelijke bol omgeven. Heldergroene bladerkransen, meestal vijf in getal, omgeven de bloemsteel. Knikkende, bijna zwarte bloemen met opvallende gele helmknopjes.

Bestelnr. 644 p.st. 4.50
3 st. 12.75



Fritillaria davisii

Herkomst: Griekenland (het zuidoosten van de Peloponnesus). Vernoemd naar Dr. Peter H. Davis die deze fritillaria daar in 1940 aantrof. Onder aan de bloemsteel bevinden zich twee brede en glanzende bladeren. De tot drie dikke wasachtige bloemknoppen tonen een sterk ruitpatroon. De bloemkleur is chocoladebruin met groen en aan de uiteinden van de kelkblaadjes een minuscuul geel randje, aan de binnenzijde lichter gevlekt.

Bestelnr. 648 3 st. 3.75
5 st. 6.00




Fritillaria eduardii

(Synoniemen: *F. imperialis* subsp. *eduardii* en *Petilium eduardii*)

Herkomst: Hoog in de bergen van Tadzjikistan. Op de beschaduwde hellingen worden ze nog veelvuldig aangetroffen. De bloeiwijze bestaat uit licht oranje knikkende klokvormende bloemen, die enigszins terug krullen. *F. eduardii* is niet vegetatief te vermeerderen. De aangeboden partij is licht variabel. De bloemen verspreiden niet de zogenaamde vossengeur, zoals *F. imperialis* dat doet.

Bestelnr. 650 p.st. 5.50
3 st. 15.75




Fritillaria elwesii

(Synoniem: *F. sieheana*)

Herkomst: het zuidwesten van Turkije, waar ze worden aangetroffen als onderbegroeiing van pijnbomen. Het steeltje is omgeven door smalle gewelfde bladeren. De tot vier semi-knikkende en klokvormige bloemen zijn purperbruin met heldergroene streepjes. Het hart van de bloem is gevuld met gele meeldraden en een brede harige stijl.

Bestelnr. 652

5 st.	4.95
10 st.	9.50




Fritillaria 'Golden Flag'

Een mutant uit *F. aurea*. Een opmerkelijk verschil met het type is dat de bloem wijder uitstaat. De gele bloemetjes zijn aan de buitenzijde voorzien van een verbluffend mooie nervatuur en spikkeltjes.

Bestelnr. 656

3 st.	6.00
5 st.	9.50




Fritillaria graeca

(Synoniemen: *F. thessala* (?), *F. guicciardii*, *F. ochridiana*, *F. unicolor*, *F. urmensis* en *F. zahnii*)

Spits toelopende grijsgroene bladeren waarvan de onderste duidelijk breder zijn. Tot vier klokvormige knikkende bloemen, bruinpurper geruit op een groene ondergrond met op ieder bloemblaadje een duidelijk zichtbare groene streep. Herkomst: Noord-Griekenland tot in Zuid-Bulgarije. Vochtige bodem.

Bestelnr. 660


3 st.	4.50
5 st.	7.00



Fritillaria latakienensis

Intro: 1975. Herkomst: het Taurus gebergte en nabij Latakia in het noordwesten van Syrië. De één tot twee smalle klokvormige bloemen zijn paars, soms met een grijze gloed, vaak ook met een groene streep in het midden van de bloemblaadjes. De bloemopening is zo smal, dat nauwelijks te zien is dat de meeldraden paars met een lichtgroene glans zijn.


Bestelnr. 666	p.st.	3.50
	3 st.	9.75



Fritillaria meleagris

Intro: 1573. Kievitsbloem, komt voor in vrijwel geheel Europa, in Nederland op de uiterwaarden langs de IJssel, massaal voorkomend in Hasselt en bij de Reeuwijkse plassen. Het is een stinzenplant. Bij uitstek geschikt voor verwildering. De bladeren zijn langwerpige. De bloemsteel heeft vrijwel altijd één klokvormige bloem per stengel, maar naarmate de planten langer op een plaats vast staan, kan dit aantal oplopen tot drie. De bloemen zijn wit tot paars met vele tussenliggende nuances, vaak met een gespikkeld en/of blokvormig patroon.


Bestelnr. 670	25 st.	3.50
	100 st.	13.00
	250 st.	30.00



Fritillaria meleagris 'Alba'

Een selectie uit verzamelde witte tinten van *F. meleagris*. Een frisse verschijning op wat donkerdere plaatsen in de tuin. De groene bloemtekening zoals bij de soort is nauwelijks waarneembaar.

Bestelnr. 673	10 st.	3.75
	25 st.	9.00




Fritillaria michailovskyi

Intro: 1905. Herkomst: het noordoosten van Turkije, vooral rond het Vanmeer en Kars. In 1904 voor het eerst aangetroffen en beschreven door Michailovski. Prima geschikt voor een wat beschaduwde rotstuin. De weinige bladeren zijn enigszins ellipsvormig. De bloemen tot wel acht in getal, zijn roodachtig purper met een kunstig goudgeel gebiesde bloemrand, de keel is geel. Een plaatje!



Bestelnr. 675

10 st. 4.00
25 st. 9.75



Fritillaria minuta


(Synoniem: *F. carduchorum*)

Intro: 1859. Herkomst: Zuidoost-Turkije en Noord-west-Iran. De bloemkleur is bruinachtig oranje met 'n zweem van stofgrijs, aan de binnenzijde is de smalle bloem voorzien van een barnsteengeel netwerk. De stijl is glad en in drieën gedeeld. Glanzend groen blad. Deze fritillaria houdt ervan om diep geplant te worden in een humusrijke bodem en wilt 's zomers niet te droog komen te staan.



Bestelnr. 677

5 st. 4.95
10 st. 9.50



Fritillaria montana

(Synoniemen: *F. caulescens*, *F. neglecta*, *F. nigra*, *F. orsiniana*, *F. racemosa* en *F. tenella*)

Een wijdverbreid soort dat in heel Zuid-Frankrijk tot in Noord-Italië en verder weg tot in het voormalige Joegoslavië en Noord-Griekenland vrij goed is te vinden op steile hellingen. Het verspreid staande blad is kort en blauwachtig.


De bloemkleur: aan de buitenzijde donker paarsachtig bruin met bruin en wat geelgroen.

De binnenzijde is overwegend citroengeel met groen en kastanje, naar de basis bruinachtig.

De bloemblaadjes zijn aan de top iets teruggeslagen.

Bestelnr. 679


p.st. 3.50
3 st. 9.75



Fritillaria pallidiflora

Intro: 1857. Ontdekt door de Duitse botanicus en plantenverzamelaar Eduard August von Regel (1815-1892). Mooie zeegroene kruislings geplaatste bladeren. Grote (ca. 5 cm) knikkende citroengele (pallidus betekent bleekgeel) bloemen met zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde fijne groene nerven. De plant draagt wel tot zeven bloemen per stengel. Herkomst: Oost-Siberië en Noordwest-China in vochtige veenachtige gras- en weidelanden. In China worden ze gekweekt voor medicinale doeleinden, net als alle andere Chinese species.

Bestelnr. 681 3 st. 6.75
5 st. 11.00




Fritillaria persica

(Synoniemen: *F. eggeri*, *F. libanotica*, *F. arabica* en *Lilium persicum*)

Herkomst: Cyprus, Turkije, Iran en Syrië. De ca. 90 cm hoge bloemsteel wordt omgeven door blauwgroene bladeren die beurtelings langs de steel staan, vaak alleen, soms met drie bladeren op gelijke hoogte. De klokvormige intens donker purperen bloemen vormen een tros met een lengte van zo'n 30 cm. De aangeboden bollen zijn Nederlands gekweekt.


Bestelnr. 718 p.st. 3.50
3 st. 9.75



Fritillaria persica 'Ivory Bells'

Een crèmewitte mutant uit *F. persica*. Mooie volle bloemaren met afhangende klokvormige bloemetjes. De selectie 'Ivory Bells' onderscheidt zich van *F. persica* 'Alba' door veel dichter bezette bloemstelen. De gehele plantopbouw oogt voller en krachtiger.

Bestelnr. 720 p.st. 7.95
3 st. 23.25



Fritillaria pontica


(Synoniem: *F. olympica*)

Intro: 1826. Herkomst: Albanië, Noord-Griekenland en Zuid-Bulgarije tot en met de Pontische bergen in Turkije. Verlangt een licht beschaduwde plek, maar is probleemloos te kweken. Bloeit in april-mei met één tot drie bloemen aan 15-35 cm lange stengels. De aparte bloemkleur is het best te omschrijven als: lichtgroen, naar de rand purperachtig bruin.

Bestelnr. 685

10 st. 4.50

25 st. 10.50



Fritillaria raddeana


(Synoniem: *F. askhabadensis*)

Intro 1909. Herkomst: Afghanistan, het noordoosten van Iran en het zuidoosten van Turkije. Verwant aan *F. imperialis*. Glanzend groene spits toelopende bladeren, die afwisselend zijn geplaatst tot vijftien cm van de bloeiwijze. Ieder stervormig en hangend bloemetje, vrijwel horizontaal geplaatst ten opzichte van de steel, is sleutelbloemgeel met een zacht-groene gloed. Het aanbod is van een iets donkerdere kloon. Fantastische voorjaarsbloeier.

Bestelnr. 691

p.st. 5.95

3 st. 16.50




Fritillaria reuteri

Herkomst: Iran, nabij Isfahan, in natte, leemhoudende weiden op 2500-3000 meter hoogte. De plant lijkt op een rijk bloeiende *F. michailovskyi*, maar de bloemen zijn korter en slanker, de bloemstengel is langer. De klokvormige bloemen zijn donker kastanjebruin tot rood van kleur, ze staan horizontaal en wijd open en zijn voorzien van een geel randje. Het blad is lancetvormig. *F. reuteri* gedijt het beste op een koele, vochtige standplaats.

Bestelnr. 8127

p.st. 4.50

3 st. 12.75




Fritillaria sewerzowii

(Synoniem: Korolkowia sewerzowii)

Herkomst: op puinhellingen in Kirgizië, Kazachstan, Afghanistan, Noord-Pakistan en Kasjmir, tot ver in China. Het tegenover elkaar geplaatste ellipsvormige blad is grijsgroen en zit langs een 25 tot 30 cm hoge steel. De pagodevormige bloemen, tot wel vijftien per steel, zijn slank tot halverwege de kroonbladeren, daarna naar buiten uitwaaiend waardoor de zwarte helmknoppen extra opvallen. De bloemkleur varieert van groen en bruin aan de buitenkant en zuiver groen aan de binnenkant tot paars.

Bestelnr. 700

p.st. 6.50
3 st. 18.00




Fritillaria stananthera

Herkomst: Oezbekistan, via Afghanistan naar Noord-Iran, en in het Kara-Tau gebergte in Kazachstan. Ze worden pleksgewijs aangetroffen rond Tasjkent en Chimgan. Een brede paarse cirkel rond de nectarlieren overheerst de bijzonder fraaie, zachtroze bloemen die ver opgegaan en bijna horizontaal staan. De bladeren zijn grijsgroen.

Bestelnr. 695

p.st. 7.95
3 st. 23.25




Fritillaria strausii



Herkomst Noord-Iran en West-Turkije, voorkomend op losse puinhellingen op 1500-2000 meter hoogte. De Iraanse vorm is iets hoger en ook in cultuur blijft deze iets forser. Eén of twee zilvergroene, breed klokvormige bloemen die in een later bloeistadium donker kastanjebruin kleuren. Glanzend groen lancetvormig blad.

Bestelnr. 9947

p.st. 17.50
3 st. 51.00



Fritillaria thunbergii

F. thunbergii heeft aan de bladtoppen een soort hechtranken, waarmee deze zich in het wild staande houdt tussen de bamboe. Wanneer de fritillaria geplant staat bij heesters, zal die zich vastgrijpen met zijn hechtranken in de takken.


De bloemsteel draagt zo'n zestal verspreid zittende crèmgroene knikkende klokvormige bloemen die aan de binnenzijde rood gespikkeld zijn.

Herkomst: Oost-Siberië, het noordwesten van China en verwilderd in Japan.

Bestelnr. 8129

p.st. 4.95

3 st. 14.25



Fritillaria uva-vulpis

Nederlandse naam: vossendruif. Intro: 1974.

Herkomst: Oost-Turkije, Noord-Irak en West-Iran.


Enkele glanzend groene en smalle bladeren omhullen de ca. 25 cm hoge bloemsteel.

De bloeiwijze bestaat uit klokvormige knikkende bloemetjes, purperachtig van kleur en gehuld in een groene waas. De topjes van de bloemblaadjes zijn goudgeel, zo ook de keel. Leuk snijbloempje maar indien u ze laat uitgroeien, verschijnen de fraaie vruchtbeginsels. Het is één van de gemakkelijkste fritillaria's.

Bestelnr. 703

25 st. 3.50

50 st. 6.50




Fritillaria whittallii

Herkomst: het zuiden en westen van Turkije op stenige hellingen. Al in 1909 in een Britse catalogus aangeboden. De knikkende bloempjes, 2 tot 3 cm groot, soms twee per steel, zijn groengeel met een donkerbruin netwerk, soms ook donkerbruin geruit. De gespleten stijl is kort.

Bestelnr. 705

p.st. 4.50

3 st. 12.75





**Fritillaria imperialis
'Maxima Lutea'**



Bestelnr. 8241

p.st. 3.95
3 st. 11.25



**Fritillaria imperialis
'Orange Beauty'**

Bestelnr. 9695

p.st. 3.95
3 st. 11.25



**Fritillaria imperialis
'Argenteovariegata'**

Bestelnr. 710

p.st. 11.00
3 st. 30.00



**Fritillaria imperialis
'Aureomarginata'**

Bestelnr. 724

p.st. 11.00
3 st. 30.00



**Fritillaria imperialis
'Garland Star'**


Bestelnr. 722

p.st. 3.95
3 st. 11.25

FRITILLARIA IMPERIALIS

De Nederlandse naam luidt: keizerskroon. De zeer stevige bloemsteel is aan de onderste helft voorzien van smalle en spits toelopende glanzende bladeren. De lelieachtige bloemen, gevormd als een trompet, gaan vergezeld van een kroon met groene bladeren. Elk geaderd bloemblaadje heeft aan de binnenzijde een duidelijk zichtbaar honingstempel. U kunt genieten van de heerlijke honingsmaak door in de vroege ochtend eens, nadat de dauwdruppels hun werk hebben verricht, een licht tikje tegen de bloem te geven (uiteraard uw hand eronder houden) om van dit heerlijke vocht te proeven. De typische 'vossengeur' van keizerskronen, waarvan wordt gezegd dat het mollen, veldmuizen en woelratten weghoudt, wordt veroorzaakt door één vluchtige stof, een zwavelhoudend terpeen, dat de plant produceert.

Rond het midden van de zestiende eeuw werden in Leiden, via Wenen (Oostenrijk) door Carolus Clusius de eerste fritillaria's aangeplant. Herkomst: Turkije, het zuidoosten en westen van Iran, Afghanistan, Pakistan en het Kashmir gebergte. Om meerdere jaren achtereen een goede bloei te krijgen, is het belangrijk dat de keizerskroon jaarlijks van flink wat voeding en organische stof wordt voorzien. Herplanten is alleen nodig als de groepen te massief geworden zijn.





Fritillaria 'Vivaldi'


Bestelnr. 9687

3 st.

7.50

5 st.

12.00



Een recent geïntroduceerde groep, wordt waarschijnlijk later ondergebracht als *Notospecies*.

Het is mij niet geheel duidelijk, maar waarschijnlijk ontstaan uit *Fritillaria raddeana* x *Fritillaria eduardi* var. *inodora*. Mooie subtiele tinten, veelal donkere bloemstengels en schitterende zaaddozen.

De drie componisten worden gemengd aangeboden onder de naam: *Symphonica*.



Fritillaria 'Chopin'

Bestelnr. 9686

3 st.

7.50

5 st.

12.00



Fritillaria 'Beethoven'

Bestelnr. 9685

3 st.

7.50

5 st.

12.00

Fritillaria -Symphonica-

Bestelnr. 9482


5 st.

12.00

10 st.

21.50

Van het sneeuwklokje zijn tot nu toe negentien soorten bekend. Dat kan nog best eens veranderen en niet alle botanici zijn het ook eens over dit aantal. Soorten komen ergens ter wereld in het wild voor. Veel sneeuwklokjes zijn erg variabel en als iemand een afwijkend sneeuwklokje ontdekt en dat een naam geeft dan is er weer een cultivar bij. Dit voorjaar verscheen: GALANTHUS, a list of cultivar names, van Hanneke van Dijk & Wim Snoeijer (ISBN: 978-90-73350-04-5), met ongeveer 2000 cultivars. Het is "in" om sneeuwklokjes te verzamelen en fanatieke galanthofielen hebben grote bedragen voor een bolletje over. Door al die verschillende soorten en cultivars is het mogelijk om vanaf de herfst tot in april sneeuwklokjes bloeiend in de tuin te hebben. Belangrijk is de bollen meteen na aankomst te planten. Vaak worden bijzondere sneeuwklokjes "in the green" verkocht, houd hiervoor onze webwinkel in de gaten op www.pcnijssen.nl



Galanthus angustifolius


Zeldzame vorm die alleen voorkomt in het noorden van de Kaukasus en nog zeldzamer is in cultuur. En daarom was Colin Mason zo sceptisch nadat ik vertelde dat Antoine Hoog hiervan een klein partijtje voor ons teelt. Een jaar later, nadat Colin enige exemplaren van ons ontvangen had, beaamde hij de soortechtheid. Op de binnenste bloemblaadjes staat een enkel V- of U-vormig groen merkje. Voor een schaduwplekje op humusrijke bodem.



Bestelnr. 9688

p.st. 9.50

3 st. 27.00



Galanthus 'Charlotte' (Imperial Group)


In een partij sneeuwklokjes die bollenkweker Jan Huisman van een boer in de Wieringermeer kocht ontdekte hij een sneeuwklokje dat duidelijk anders was. Niet wat tekening betrof, want die was niet afwijkend van de *Galanthus nivalis* waar het tussen stond, maar wel wat bloei betrof. Dit sneeuwklokje dat maar kleine bolletjes heeft, bloeit ongelooflijk rijk en iets later dan de gewone soort. Jan noemde het naar zijn kleindochter Charlotte.



Bestelnr. 9219

5 st. 4.95


10 st. 9.50



Galanthus 'Dionysus' (Double Group)

De dubbele sneeuwkllokjes van Heyrick Greatorex zijn beroemd. In de jaren vijftig van de vorige eeuw voerde hij geheimzinnige kruisingen uit met als resultaat een aantal dubbele sneeuwkllokjes waarbij de binnenste bloemblaadjes veel netter gerangschikt zijn dan van 'Flore Pleno'. Het is vaak moeilijk om de dubbele sneeuwkllokjes van Greatorex uit elkaar te houden. 'Dionysus', ook wel op de markt als 'Sybil Roberta' heeft soms langere, meer overhangende bloemsteeltjes dan de andere.

Bestelnr. 727	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Galanthus elwesii var. elwesii

(Synoniem: *G. elwesii*)

In 1874 ontdekte de Engelse plantenverzamelaar Henry John Elwes het grote sneeuwkllokje.

Het werd naar hem vernoemd, *Galanthus elwesii*.

Van dit sneeuwkllokje bestaan twee variëteiten,

Galanthus elwesii var. *elwesii* en *Galanthus elwesii*


var. *monostictus*. Die twee ontlopen elkaar niet veel,

het enige verschil is dat de laatste één vlek op de binnenste bloemblaadjes heeft en de eerste twee.

Ze zijn niet in een groep ingedeeld omdat het

soorten zijn en geen cultivars.

Bestelnr. 729	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	27.00



Galanthus 'Flore Pleno' (Double Group)

(Synoniem: *G. nivalis* var. *hortensis flore semipleno*)

Het bekende dubbele sneeuwkllokje dat al sinds 1731

in cultuur is. De binnenste bloemblaadjes vormen

een frivool rokje waarbij de blaadjes lang niet zo

netjes gerangschikt zijn als bij de Greatorex doubles

bijvoorbeeld. Het leuke van deze sneeuwkllokjes is

dat ze al uit de verte te herkennen zijn. De buitenste


bloemblaadjes worden opgetild door de binnenste

en daardoor zien ze er extra wit uit. Ze bloeien lang,

zijn sterk en vermeerderen zich snel, voor je het weet

heb je een veldje.


Bestelnr. 750	10 st.	5.00
	25 st.	11.25



Galanthus nivalis

Het gewone sneeuwkllokje dat iedereen kent. Als sneeuwkllokjes in sprookjes, gedichten en verhalen voorkomen dan is het dit sneeuwkllokje. Deze soort komt oorspronkelijk uit West-, Midden- en Zuid-Europa, maar werd rond 1500 in Nederland geïmporteerd. De buitenste bloemblaadjes zijn wit en op de binnenste bevindt zich een kleine groene U-vormige tekening. Uitstekende tuinplant, geschikt voor verwildering.


Bestelnr. 745	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	27.00



Galanthus reginae-olgae subsp. reginae-olgae

Een herfstbloeiende sneeuwkllok die in 1876 in Griekenland werd ontdekt en vernoemd naar de toenmalige koningin Olga. Deze subspecies krijgt eerst bloemen en pas daarna blad. De buitenste bloemblaadjes zijn wit en de tekening op de binnenste bloemblaadjes is V- of U-vormig. De aangeboden kloon is afkomstig uit de Peloponnesus. 's Zomers droog houden.

Bestelnr. 754	p.st.	9.00
	3 st.	25.50




Galanthus 'S. Arnott' (Imperial Group)

(Synoniemen: *G. 'Arnott's Seedling'* en *G. 'Sam Arnott'*)

Als je maar één cultivar zou mogen kiezen dan moet je deze nemen. Dit is een super sneeuwkllokje. De bloemstengels zijn meer dan 30 cm lang en de grote bloemen hebben mooie bolle buitenste bloemblaaden. De binnenste bloemblaaden hebben een V-U-vormige groene tekening. Bijzonder is dat 'S. Arnott' heel sterk naar honing geurt.

Bestelnr. 756	3 st.	4.50
	5 st.	7.00



GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN

Trots zijn wij er op dat er wederom een uniek aanbod 'klokjes' van Colin Mason en een andere beroemde Engelse kwekerij tot stand is gekomen.

De partijen zijn niet groot, maar wel van uitzonderlijke Engelse kwaliteit. Om zeker te zijn van de beschikbaarheid en om niet achter het net te vissen, kunt u de Engelse sneeuw klokken het beste bestellen op www.pcnijssen.nl. Met bestellen middels het bestelformulier loopt u het risico dat op het moment van verwerken van uw bestelling het één en ander al is uitverkocht.



Galanthus x allenii

Een naar amandelen geurend, langbloeiend sneeuw klokje.
Een kruising, waarschijnlijk tussen *G. alpinus* x *G. woronowii*.

Bestelnr. 9950

p.st. 7.50



Galanthus 'Ballerina' (Double Group)

Een zeer mooi en regelmatig gevuld sneeuw klokje. De bloem lijkt wel een balletrok, zo mooi. In 1991 door J. Cornish geïntroduceerd.

Bestelnr. 9873

p.st. 19.50



Galanthus 'Blewbury Tart' (Spiky Group)

Ook bekend als 'Bluebury Tart', door Allen Street in Blewbury gevonden. Gevulde onregelmatig gevormde bloemen, vaak naar boven of opzij wijzend met veel groen in de bloem. Zeldzaam en opvallend soort.

Bestelnr. 9874

p.st. 12.50



Galanthus 'Baxendale's Late' (Imperial Group)

Een laatbloeiend sneeuw klokje, ontdekt door Leo Baxendale. Leo is de vader van Martin Baxendale die een romantische komedie schreef over sneeuw klokjes: The Snowdrop Garden.

Bestelnr. 9951

p.st. 7.50



Galanthus 'Corkscrew' (Speckled Group)

Slank sneeuw klokje met het karakteristieke gedraaide blad van *G. gracilis*. De binnenste bloemblaadjes tonen naar het groene merkje ook twee vrolijke spikkeltjes.

Bestelnr. 9956

p.st. 27.50



Galanthus 'Cowhouse Green' (Green Group)

Eind jaren tachtig aangetroffen op een grondstuk waar vroeger een koeienstal heeft gestaan. Grote bloemen met op de buitenkant olijfgroene strepen. Vaak twee tot drie stelen per bol.

Bestelnr. 9952

p.st. 35.00

GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN



Galanthus 'Digory' (Imperial Group)

Zeer afwijkend. De buitenste bloemblaadjes vormen een pukkellige ballonvorm, met een koord langs de zoom.

Bestelnr. 9628

p.st. 25.00



Galanthus 'Falkland House' (Imperial Group)

Een mooie, bewonderingswaardige, grootbloemige sneeuwklonk met een perfecte ronde vorm, verwant aan *G. 'Mighty Atom'*.

Bestelnr. 9953

p.st. 13.50



Galanthus 'Fenstead End' (Imperial Group)

Goed bruikbare, grootbloemige, vroegbloeiende sneeuwklonk aangetroffen door de Grey-Wils ons toen zij verhuisden naar Fenstead End, Hawkedon, Suffolk in 1987.

Bestelnr. 9954

p.st. 13.50



Galanthus 'Fieldgate Prelude' (Imperial Group)

Zeer vroeg, vaak met Kerstmis bloeiend. De markering op de binnenste bloemblaadjes vervaagd naar de top.

Bestelnr. 9629

p.st. 17.50



Galanthus 'Galatea' (Imperial Group)

De redelijk grote bloem hangt aan een lange steel te pronken met sterk op 'Magnet' gelijkende bloemen. Vaak twee bloemstengels per bol.

Bestelnr. 9955

p.st. 6.95



Galanthus 'Godfrey Owen' (Double Group)

Waarschijnlijk het enige sneeuwklonkje met zes buitenste bloemblaadjes en zes binnenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9631

p.st. 30.00



Galanthus 'Heffalump' (Double Group)

De gevulde bloemen zijn intens groen gemarkeerd. De buitenste bloemblaadjes zijn smal. Aangetroffen in de tuin in South Hayes, eind jaren tachtig.

Bestelnr. 9607

p.st. 15.00



Galanthus 'Henham No. 1' (Imperial Group)

Op de binnenste bloemblaadjes is een duidelijke Y-markering te zien. Werd in 1984 onder een kurkeik aangetroffen in het park van Henham. Vroeg.

Bestelnr. 9957

p.st. 19.50

GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN



Galanthus 'Kildare' (Green Group)

Uit Ierland. Grote, slanke bloemen waarvan de buitenste bloemblaadjes aan de onderkant groen gestreepd zijn.

Binnenin groen, naar de basis lichter wordend. Krachtig.

Bestelnr. 9609

p.st. 25.00



Galanthus 'Melanie Broughton' (Imperial Group)

Een mooie, goed in proporties zijnde sneeuwklonk waarvan de binnenste bloemblaadjes nagenoeg geheel groen zijn.

Bestelnr. 9958

p.st. 15.00



Galanthus 'Modern Art' (Green Group)

De stevige buitenste bloemblaadjes zijn aan de boven- en onderkant groen aangetipt.

De binnenste bloemblaadjes tonen ook een groen merkje.

Bestelnr. 9645

p.st. 19.50



Galanthus 'Mrs. Thompson' (Imperial Group)

Een rariteit, meestal hebben de bloemen vijf bloemblaadjes in plaats van drie. Robuuste plant, veel gezocht.

Bestelnr. 9613

p.st. 15.00



Galanthus 'Naughton' (Twomark Group)

Het synoniem 'Largest of All' geeft een duidelijk beeld van deze super-sneeuwklonk. Op de binnenste bloemblaadjes zijn twee groene markeringen zichtbaar.

Bestelnr. 9959

p.st. 35.00



Galanthus 'Primrose Warburg' (Gold Group)

Een 'gouden' sneeuwklonk. Het vruchtbeginsel is geel en de binnenste bloemblaadjes zijn heldergeel gemarkeerd.

Bestelnr. 9647

p.st. 22.50



Galanthus 'Richard Ayres' (Double Group)

Eén van de hoogste dubbelbloemige vormen, grote iets onregelmatige bloemen met soms meer dan drie buitenste bloemblaadjes. Krachtig.

Bestelnr. 9690

p.st. 15.00



Galanthus 'Seagull' (Imperial Group)

Aangenaam en sterk geurende hybride die vaak twee bloemstelen per bol geeft.

Verdraagt goed slechte weersomstandigheden.

Bestelnr. 9960

p.st. 16.50

GALANTHUS VAN BEROEMDE ENGELSE KWEKERIJEN



Galanthus 'Sibbertoft White' (Albino Group)

Een charmante albinovorm. Zowel de binnenste- als de buitenste bloemblaadjes zijn geheel wit. Tenger postuur, maar krachtig groeiend.

Bestelnr. 9637

p.st. 15.00



Galanthus 'Sickle' (Imperial Group)

Een opvallende *G. elwesii*, afkomstig uit de tuin van Phillip Ballard. Het schutblad boven het vruchtbeginsel heeft een typische sikkelvormige vorm. Zeldzaam. Hoog en breedbladig.

Bestelnr. 9877

p.st. 15.00



Galanthus 'Spindlestone Surprise' (Gold Group)

Wellicht de mooiste 'gouden' sneeuwkllok. Een wat grotere vorm met een geel vruchtbeginsel en duidelijke gele markeringen op de binnenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9617

p.st. 25.00



Galanthus 'Sutton's Courtenay' (Twomark Group)

Een gracilis-hybride, ook bekend onder de naam: Nancy Lindsay. Een grote ronde bloem, de binnenste bloemblaadjes zijn aan de onder- en bovenkant groen. Het vruchtbeginsel is geel tot olijfgroen.

Bestelnr. 9878

p.st. 20.00



Galanthus 'Three Ships' (Imperial Group)

Vaak al in november bloeiend, bijna altijd voor Kerstmis. De buitenste bloemblaadjes van de ronde bloemen zijn pukkelig.

Bestelnr. 9638

p.st. 20.00



Galanthus 'Trymlet' (Fancy Group)

Het sneeuwkllokje dat het meeste indruk op mij gemaakt heeft tijdens de Sneeuwkllokjesreis in Engeland. Een plicatus, een selectie uit nakomelingen van Trym. Zeldzaam. Prachtige bloemvorm met opvallende groene tekening op de buitenste bloemblaadjes.

Bestelnr. 9879

p.st. 35.00



Galanthus 'Tubby Merlin' (Imperial Group)

De grote lange bloemen komen goed tot hun recht boven het laagblijvende, bijna grijze blad. De binnenste bloemblaadjes zijn olijfgroen gemarkeerd.

Bestelnr. 9961

p.st. 10.00



Galanthus 'Wendy's Gold' (Gold Group)

Het meest bekende 'gouden' sneeuwkllokje met een lange uitgerekte gele markering op de binnenste bloemblaadjes, dat soms groen wordt. Geel vruchtbeginsel.

Bestelnr. 9694

p.st. 19.50

Het geslacht Ooievaarsbek omvat vele honderden soorten waarvan 'n enkele verdikte wortelstokken als onderaardse delen heeft. Het overgrote deel zijn vaste planten waarvan het aangeboden sortiment jaarlijks toeneemt en verbetert, kijk voor een actueel aanbod op www.pcnijssen.nl. Ze verlangen een plekje in de lichte schaduw en een normale, doorlatende grondsoort die liever te droog dan vochtig dient te zijn (vooral in de zomermaanden!).




Geranium transversale forma laciniata

Herkomst: Oezbekistan, door Janis Ruksans aangetroffen in het Tschatkal-gebergte. Deze ongewone vorm van *G. transversale* met zeer smal loof dat dunning en spichtig oogt, heeft een luchtige, exotische habitus. De purperlila bloemen verschijnen in april-mei.



Bestelnr. 8141

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Geranium transversale 'Rosea'




G. transversale komt verspreid voor in Centraal-Azië, West-Siberië en Noord-China. Het aanbod, dat is aangetroffen in de Korzhantau-range, ten oosten van Tashkent, te midden van duizenden paarsbloeiende soortgenoten, heeft een unieke kleur voor de species: helder dieproze. Het stervormige blad bestaat uit zeven tot negen lancetvormige segmenten.



Bestelnr. 9221

p.st. 5.95
3 st. 17.25




Geranium tuberosum

Intro: 1596. Herkomst: Zuid-Europa en Turkije. Nederlandse naam: knolooievaarsbek. (Tuberosus betekent: knolachtig verdikt). De bladeren zijn diep ingesneden. Op een behaarde 20-25 cm hoge en rechte bloemsteel ontwikkelen zich ca. 2 cm grote bloemen die uit vijf gekerfde roze tot lichtpaarse bloemblaadjes bestaan; elk bloemblaadje heeft een donkere nerf. Na de bloei verkleurt het blad rood alvorens het afsterft.



Bestelnr. 771	10 st.	3.00
	25 st.	7.00



GETHYUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE


Gethyum atropurpureum

(Synoniem: *Solaria atropurpurea*)

Afkomstig uit de omgeving van Santiago, Chili, een gebied met milde winters en droge zomers. Hier winterhard op een beschutte standplaats. De langdurige bloei volgt in het voorjaar met zijde zwarte, bruine stervormige bloemetjes op 30 cm hoge steeltjes. De geur is wat minder aangenaam en enige vliegen zijn te verwachten.



Bestelnr. 9753	p.st.	7.50
	3 st.	21.00



GLADIOLUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

De grootbloemige, felgekleurde Gladiolen-hybriden zijn overbekend als snijbloem, maar in het algemeen hier niet zo populair voor tuinbeplanting. Maar, er zijn een aantal bijzondere Gladiolen-species die vrijwel winterhard zijn en zich prima lenen voor beplanting in een border.




Gladiolus communis subsp. byzantinus

2013

Het is mij niet duidelijk of we hier te maken hebben met een vorm van *G. italicus* (*G. segetum*) of met een uit zaad geselecteerde vorm van *G. communis subsp. byzantinus*. Het betreft hier een aanbod van een winterhard en makkelijk groeiend gladiooltje dat prima toepasbaar is in de border tussen de vaste planten. Licht violetrode bloemen in aren en na de bloei mooie zaaddozen. Herkomst: grote delen van Zuid-Europa.

Bestelnr. 9962 10 st. 2.50
25 st. 6.00




Gladiolus imbricatus

Inheems in Zuidoost-Europa en Turkije, waar het in moerassen en vochtige weilanden groeit. De dichte aar draagt vier tot twaalf grote bloemen, in kleur variërend van diep paars tot karmijnrood.

Karakteristiek voor de soort is dat het onderste blad niet scherp is maar rond, stomp. Winterhard op doorlatende grond waarbij de bodem vochtig moet zijn ten tijde van de groei.

Bestelnr. 9696 p.st. 3.95
3 st. 11.25



Gladiolus papilio


2013

(Synoniem: *G. purpureo-aureus*)

Een zeldzame verschijning. Op vochtige plaatsen inheems in Zuid-Afrika en dan met name in Transvaal en Natal op 1600 meter hoogte.

De grijzige, zachtgele belvormige bloemen tonen aan de buitenkant een zacht lila-purperen blos, de keel en soms ook de onderste bloemblaadjes zijn bruin of purperrood getekend. Redelijk winterhard.

Bestelnr. 9963 p.st. 3.95
3 st. 11.25



GYMNOSPERMIUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER BERBERIDACEAE

Gymnospermium altaicum



Misschien wel het mooiste bolgewasje dat begint te bloeien zodra de sneeuw smelt. De zuiver gele bloemen ontluiken in knikkende bloemtrossen aan een roodbruin steeltje. Het groene, handvormige blad ontwikkelt zich gelijktijdig. Afkomstig uit het zuidelijk deel van het Altai-gebergte. Bij voorkeur droog overzomerren.



Bestelnr. 9964 p.st. 22.50
3 st. 63.00



HERMODACTYLUS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE


Hermodactylus tuberosa

(Synoniem: *Iris tuberosa*)

Vingerknol. Intro: 1597. Herkomst: Zuid-Europa, Noord-Afrika, Israël en Turkije. De lange en vierkantige bladeren komen zeer vroeg tevoorschijn.

De geurende bloemen zijn bijzonder: het opgaande gedeelte van de bloem (de staander) is geelachtig groen terwijl het hangende deel (de lip) zeer donkerpaars is, voorzien van een crème streep. Verwildert goed op een warm plekje op een doorlatende zanderige grond.

Bestelnr. 776 10 st. 3.00
25 st. 7.00



Handgereedschap

Bahco Bollenplanter

Stevige stalen uitvoering met beukenhouten handvat. Gemakkelijk snijdend.



Bestelnr. 4713

p.st. 10.95


De Wit Bollenpoter

Handig te gebruiken bij de aanplant van kleine bolgewasjes.



Bestelnr. 4612

p.st. 16.95



Hyacinthoides hispanica -blauw-

Bestelnr. 780

10 st.	3.00
25 st.	7.00

De eerste beschrijving van de boshyacint dateert van 1601. De brede bladeren zijn wat hangend en lintvormig. De ronde tot 40 cm hoge bloemstelen zijn voor ongeveer eenderde bezet met vele knikkende, breed klokvormige bloemen die de volle zon verdragen, maar hun bloemkleur optimaal tonen op een beschaduwde plek. Prima soortje voor verwilderding. Herkomst: Noord-Afrika, Portugal en het westelijk deel van het Middellandse Zeegebied.



Hyacinthoides hispanica 'Dainty Maid'

Bestelnr. 784

10 st.	3.00
25 st.	7.00



Hyacinthoides hispanica 'Miss World'



Bestelnr. 9965

10 st.	3.00
25 st.	7.00



Hyacinthoides hispanica 'White City'

Bestelnr. 9698

10 st.	3.00
25 st.	7.00



Hyacinthoides hispanica -gemengde kleuren-

Bestelnr. 788

10 st.	2.50
25 st.	5.75

Hyacinthoides lingulata subsp. ciliolata

2013

(Synoniem: o.a. *Scilla lingulata* var. *ciliolata*)

In 1944 gaf Werner Hugo Paul Rothmaler dit herfstbloeiende gewasje deze naam, maar de *Hyacinthoides* was al in 1789 bekend onder *Scilla*, nu het synoniem. Ze worden aangetroffen in Noord-Afrika, met namen in Marokko en Algerije waar zij op droge gronden voorkomen. Na enig vocht in de nazomer-herfst ontwikkelt zich het op de bodem liggende, lancetvormige blad en verschijnen de zachtblauwe stervormige bloempjes in kleine trosjes.

Bestelnr. 9987	p.st.	3.50
	3 st.	9.75




Hyacinthoides non-scripta

(Synoniemen: *Scilla non-scripta* en *Scilla nutans*)

Hazenklokje en ook: 'Bluebell'. Deze species was al in de middeleeuwen bekend. Hoewel de oorspronkelijke vindplaatsen zich in het noordwesten van Italië en het zuidoosten van Frankrijk bevinden, treffen we de hazenklokjes verwilderd aan in vrijwel geheel Europa. Het glanzend groene blad is vrij breed en lintvormig. De smalle klokvormige en zacht geurende blauwe bloemen zijn min of meer naar één zijde gericht. Perfect voor verwildering en onderbegroeiing. Het aanbod is afkomstig van een kwekerij uit Engeland.

Bestelnr. 792	10 st.	3.50
	25 st.	8.25
	100 st.	30.00



Hyacinthoides vicentina

2013

(Synoniem: *Scilla vicentina*)

Uitsluitend voorkomend in het zuidwestelijke puntje van Portugal in het natuurpark: Parque Natural do S.W. Alentejano e Costa Vicentina. Aanvankelijk werd gedacht dat het hyacintje was uitgestorven, gelukkig zijn er toch weer enige populaties aangetroffen. De zachtblauwe kleine bloemetjes verschijnen in mei. Voor een zonnige standplaats.


Bestelnr. 8579	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Hyacinthus orientalis 'Blue Festival'

Heerlijk geurende hyacinten met een natuurlijke uitstraling. Er verschijnen meerdere bloemstelen per bol. Door de luchtige opbouw vallen deze niet snel om. Blauw.


Bestelnr. 8581 5 st. 4.50
10 st. 8.50



Hyacinthus orientalis 'Pink Festival'

De 'Festivalhyacinten' zijn door hun fijne habitus een welkome aanvulling. Prima toepasbaar in de border, potten en manden zonder het idee te krijgen dat het kunstmatig is. Roze.


Bestelnr. 8583 5 st. 4.50
10 st. 8.50



Hyacinthus orientalis 'White Festival'

Festivalhyacinten kunnen jaren in de grond blijven. Een (organische) bemesting direct na de bloei en in de herfst is dan wel van belang. Witte selectie.

Bestelnr. 8585 5 st. 4.50
10 st. 8.50




Hyacinthus orientalis

Intro: 1562. De aangeboden partij van deze wildvorm komt oorspronkelijk uit de Hortus Bulborum in Limmen. De hyacint is inheems in Klein-Azië, met name in Turkije, Syrië en Libanon. Ze groeien tussen rotsen op wel 2000 meter hoogte. Uit de *H. orientalis* zijn de tegenwoordig aangeboden hyacinten ontstaan. Welriekend.



Bestelnr. 795 3 st. 7.50
 5 st. 12.00



IPHEION

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Oude Wijfjes. *I. uniflorum* werd al in 1832 geïntroduceerd. Herkomst: Zuid-Brazilië, Uruguay, Argentinië en Peru waar ze in grote aantallen voorkomen in weide- en graslanden alsook op rotsachtige terreinen. Ze gedijen bij voorkeur in de volle zon. Het fijngewreven blad heeft een lichte uiengeur, de bloemen ruiken naar zeep. Vanwege deze uiengeur wordt *Ipheion* ook gebruikt tussen rozenstruiken tegen het rozenaaltje. Zeer geschikt voor verwildering.




Nothoscordum dialystemon

(Synoniem: *Ipheion dialystemon*)

Intro: 1981. Verzameld door Dr. Rolf Fiedler als *Beauverdia sellowiana* in Patagonië, Argentinië. In 1984 bij de Royal Hortical Society in Londen gepresenteerd als *Ipheion sellowiana*. Mooie heldergele bloemen. Komt het best tot zijn recht in een pot.




Bestelnr. 801 3 st. 6.00
 5 st. 9.50



Iris bucharica

Intro: 1901. Een gemakkelijk te kweken species die voorkomt in het Pamir Alai-gebergte maar ook in Tadzjikistan en het noordoosten van Afghanistan. De glanzende in lagen geplaatste bladeren staan tegenover elkaar. De tot zeven heerlijk geurende bloemen komen uit de bovenste bladoksels tevoorschijn. De aangeboden cultuurvorm heeft een crèmewitte vlag, de lip is van dezelfde kleur maar heeft een grote ovale goudgele vlek en donkere strepen. Houdt van zon en van een goed gedraineerde grondsoort.

Bestelnr. 824 5 st. 3.50
10 st. 6.50




Iris cycloglossa

(Synoniem: *Iris duclouxii*)

Intro: 1958. Herkomst: Zuid-Afghanistan. De vorm van de bloem is ongewoon voor een Juno-type. Ze bestaat namelijk uit brede vlakke buitenste bloembladen en horizontale binnenste bloembladen. Op de lavendelblauwe lip bevindt zich een grote witte vlek waarop weer een klein geel vlekje (het honingmerk) zit dat wordt omgeven door ragfijne donkere adertjes. De plant wordt 40 cm hoog en heeft zo'n zes smalle bladeren op het onderste deel van de stengel. Welriekend.

Bestelnr. 826 p.st. 2.95
3 st. 8.25




Iris danfordiae

(Synoniemen: *I. amasiana*, *I. bornmuelleri* en *I. crocifformis*)

Geïntroduceerd in 1876 door Mrs. Danford. De plant heeft zeer smal blauwgrijs blad. De goudgele bloemen met groene spikkels op de lip verschijnen in februari. Herkomst: Turkije (Taurus gebergte). Zacht geurend. De bol van *Iris danfordiae* heeft de vreemde gewoonte om na de bloei in vele kleine kraaltjes uiteen te vallen. Dit kan voorkomen worden door deze dieper te planten en van een royale hand voeding te voorzien.

Bestelnr. 828 25 st. 3.50
100 st. 12.50




Iris foetidissima 'Citrina'

Nederlandse naam: Stinkende lis. De aangeboden vorm is een rijk bloeiende zachtgele lis die zelfs op droge grond in de schaduw gedijt. Ruim na de bloei barsten de opgezwollen peulen open en ontluikt er een dikke tros rode bessen die decoratief blijft tot ver in de winter.



Bestelnr. 9701 p.st. 4.95
3 st. 13.50




Iris histrioides 'George'

Intro: 1973. Vernoemd naar George Rodionenko, hortulanus te Leningrad. Ontstaan uit een kruising van *Iris histrioides* var. *major* x *Iris reticulata* 'J.S. Dijt'. Een grote bloem, waarvan de vlag paars is. De lip is ietsje donkerder van kleur met een zweem van donkerpaars, versierd met gele spikkels en paarse streepjes met een geel honingmerk op een witte achtergrond. Een iris die betrouwbaar terugkomt.



Bestelnr. 840 25 st. 4.00
100 st. 15.00



Iris histrioides 'Lady Beatrix Stanley'

Intro: 1930. De bloemen zijn uniform morsblauw. Op de lippen witte veertjes en een geel honingmerk. De bloem verspreidt een heerlijke viooltjesgeur. In 1977 een Award of Merit van de Royal Horticultural Society ontvangen.



Bestelnr. 842 10 st. 3.50
25 st. 8.25




Iris hoogiana

In 1913 door Van Tubergen geïntroduceerd. Direct in die jaren daarna, zijn er vele onderscheidingen en getuigskriften verdiend. Herkomst: Turkestan. De twee, soms drie heerlijk geurende bloemen per steel, zijn zacht lavendelblauw met een gele baard. Het blad is donker blauwgroen.

Bestelnr. 8153

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Iris 'Katharine Hodgkin'

Werd in 1958 door E.B. Anderson geselecteerd en vernoemd naar de echtgenote van Eliot Hodgkin. Hij was een vermaard bollenverzamelaar en kweker. Ontstaan uit een kruising van *I. histrioides* var. *major* x *I. winogradowii*. De vlag is blauwachtig groen, de lip is groenachtig blauw met een zweem van geel en voorzien van blauwe adertjes. Het honingmerk is geel. De bloem is vrij groot.

Bestelnr. 846

10 st. 2.75
25 st. 6.50




Iris korolkowii

Ongetwijfeld de fraaiste uit de Regelia-groep. 7 cm grote krachtige bloemen, tot drie per bloemsteel, zijn crèmekleurig, soms zachtlila, voorzien van een netwerk van dieppaarse aders. Een Award of Merit in 1979. Herkomst: Afghanistan.

Bestelnr. 834

p.st. 9.50
3 st. 27.00




IRIS RETICULATA CULTIVARS

Iris reticulata 'Alida'

Uit *I. reticulata* 'Harmony' geselecteerd en in 1990 geregistreerd. De lip is korenbloemblauw, licht bariümgeel gestreept, uitlopend in ivorkleurig witte vlekjes. De staanders zijn Frans blauw.


Bestelnr. 9703 25 st. 3.50
 100 st. 13.00



Iris reticulata 'Cantab'

Deze schoonheid werd in 1914 geïntroduceerd door E.A. Bowles. De gehele bloem heeft een vlasblauwe kleur, met op de lip een oranje honingmerk op een witte ondergrond.

Bestelnr. 8159 25 st. 3.75
 100 st. 14.00




Iris reticulata 'Clairette'



Intro: 1953. *Iris reticulata* x *Iris bakeriana*. Hemelsblauwe staanders worden omsloten door middenblauwe lippen voorzien van een witte tekening. Opvallend mooi.


Bestelnr. 8593 25 st. 3.75
 100 st. 14.00



Iris reticulata 'Natascha'

Intro: 1973. Een hebbedingetje dat is ontstaan uit een kruisbestuiving van *I. reticulata* 'Cantab' x *I. reticulata* 'Cantab'. Ivoorwit met een geraffineerd groen lijnenspel. Het honingmerk is goudgeel.

Bestelnr. 858 10 st. 3.75
25 st. 9.00




Iris reticulata 'Pauline'

(*I. bakeriana* x ?).

Vernoemd naar één der dames Hoog. De vlag is violet, de lip donkerpurper met witte vlekken en een geel honingmerk. In 1953 en 1979 onderscheiden met een Award of Merit.


Bestelnr. 860 25 st. 3.50
100 st. 13.00




Iris reticulata 'White Caucasus'

Een in 2003 geregistreerde nieuwe kristalwitte *Iris reticulata*. Oorspronkelijk verzameld door Alan McMurtrie nabij het meer Sevan in Armenië. In 2008 onderscheiden op de Lentetuin in Breezand als 'Beste bijzonder bolgewas klein formaat'.

Bestelnr. 9704 p.st. 4.95
3 st. 13.50





Iris sphenensis x danfordiae 'Sea Green'
Bestelnr. 9969 p.st. 16.00

INTERSPECIES HYBRIDEN UIT HANDEN VAN ALAN MCMURTRIE



De Canadese Alan McMurtrie is beroemd onder de Iris-liefhebbers vanwege zijn fanatieke interesse in *Iris reticulata*. Duizenden kruisingen en selecties in de mooiste kleuren en afwijkende vormen komen uit zijn handen. Wij hebben hieruit de volgende keuze gemaakt:



Iris sphenensis x danfordiae 'Down to Earth'

Bestelnr. 9966 p.st. 11.00



Iris sphenensis x danfordiae 'Making Out'

Bestelnr. 9967 p.st. 13.00



Iris sphenensis x danfordiae 'Orange Glow'

Bestelnr. 9968 p.st. 21.00



Iris sphenensis x danfordiae x Çat species 'Storm'

Bestelnr. 9970 p.st. 13.00

IXIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IRIDACEAE

Ixia paniculata 'Eos'


Ixia paniculata is inheems op vochtige zandvlaktes in het noordwesten en zuidwesten van de Kaap.

De cultivar 'Eos' is vernoemd naar de godin van de dageraad uit de Griekse mythologie. Elk steeltje produceert zeker vijftien zacht abrikoosgele bloemen. De stervormige bloemen ontluiken uit een purperrood steeltje. De bollen kunnen in het najaar geplant worden en hebben de laatste winters bewezen goed winterhard te zijn.

Bestelnr. 9486

25 st. 3.50

100 st. 13.00



IXIOLIRION

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER IXIOLIRIACEAE

Ixiolirion tataricum


(Synoniemen: *I. ledebourii*, *I. montanum* en *I. pallasii*)

Blauwe sterlelie. Intro 1821. Herkomst: van de Kaspische-Zee via Klein-Azië tot aan Israël en Egypte. De ranke bloemstelen met donkerblauwe trechtervormige bloemen verschijnen vanaf eind mei. Het bloemscherm bevat tien tot vijftien los ogende bloemen. Ze gedijen op een droog en zonnig plekje, perfect voor verwildering.

Bestelnr. 877

25 st. 2.50

100 st. 9.00



LEUCOJUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER AMARYLLIDACEAE

Ontleend aan het Griekse woord leuceion wat zoveel betekent als: 'witte ogen'. Deze naam werd gebruikt door Hippocrates. Dit geslacht is nauw verwant aan *Galanthus*. Het voornaamste verschil zit in de lengte van de kelkblaadjes. Bij *Leucojum* zijn ze van gelijke lengte.




Acis autumnalis 'September Snow'

(*Leucojum autumnale* 'September Snow')

Het herfstklokje. Vanaf augustus verschijnen de sierlijke parelwitte klokvormige bloempjes, vaak per twee, aan een roodverkleurend steeltje. Dit rood loopt door tot in het vruchtbeginsel bovenaan de bloem. De variërende wildvorm komt voor in het Zuidwesten van Europa en Noord-Afrika, waar het makkelijk groeit op zonnige standplaatsen in doorlatende grond.



Bestelnr. 901	5 st.	6.00
	10 st.	11.50




Leucojum aestivum

(Synoniemen: *L. hernandezii* en *L. pulchellum*)

Intro: 1594. Herkomst: grote delen van Europa en het zuidwesten van Azië tot Noord-Iran, zeldzaam in België en Nederland (stinzenplant). Ze vragen om een vochtig standplaats. Het blad verschijnt tijdens de wintermaanden, dat bij vorst e.d. geen consequenties heeft. De 20-35 cm hoge bloemstelen zijn voorzien van drie tot vijf klokvormige witte bloempjes die op ieder kelkblaadje met een groen topje zijn versierd. Nederlands gekweekte bollen.

Bestelnr. 895	10 st.	4.50
	25 st.	10.50




Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'

De aangeboden partij *Leucojum aestivum* 'Gravetye Giant' is een grootbloemige kloon. De tot zes knikkende klokvormige en helderwitte bloemen hebben aan het uiteinde van de kelkblaadjes zeer opvallende zachtgroene punten. Dit in mei-juni bloeiende gewas houdt van een vochtige voedselrijke grond, bijvoorbeeld geplant rond vijvers. 'Gravetye' is de naam van de tuin van de plantenliefhebber William Robinson, Sussex, Engeland.



Bestelnr. 897	10 st.	5.00
	25 st.	11.25



Acis nicaeensis

(Synoniemen: *Leucojum nicaeense* en *L. hiemale*)

Het Franse lenteklokje. Herkomst: het zuidoosten van Frankrijk, de Côte d'Azur alwaar zij Nivéole de Nice genoemd worden. De witte knikkende bloempjes worden vergezeld door donkergroene bladeren.



Bestelnr. 903

3 st. 5.25

5 st. 8.00



Leucojum vernum

(Synoniem: *L. carpathicum*)

Intro: 1420. Herkomst: van België tot Polen en van de Pyreneeën tot voormalig Joegoslavië. Verwilderd in Nederland, Zuid-Engeland en Denemarken.


De geurende bloemen zijn roomwit met groene puntjes aan de bloemtoppen voor zover de species afkomstig is uit westelijke gebieden. In de zuidelijke streken zijn ze voorzien van gele bloemtopjes.

De donkergroene bladeren glanzen. Behoren geplant te worden in een vochtige grond. Na aanplant kunnen de bollen wel een jaar latent blijven!

Bestelnr. 905

10 st. 5.00

25 st. 11.25



Leucojum vernum var. carpathicum 'Podpolozje'




De oorspronkelijke species werd aan het einde van de 19e eeuw beschreven. Verzameld nabij de plaats Podpolozje, in het oosten van de Karpaten. Een selectie waarbij twee bloemetjes per bloemsteelje zitten. Op de topjes van de bloemblaadjes bevinden zich gele puntjes. Ideaal voor een vochtig plekje in de lichte schaduw tot schaduw.

Bestelnr. 907

p.st. 7.95

3 st. 22.50



Bij benadering zijn er honderd species van het geslacht Lelie bekend. Het aantal cultivars rijst de pan uit en loopt in de duizenden. De species worden aangetroffen in bosachtige streken van Europa, Centraal- en Zuid-Azië tot aan de Filippijnen en Noord-Amerika. Vele lelies geuren. Het zinnebeeld van reinheid en onschuld! Ze behoren tot de oudst bekende planten en worden terecht tot schoonheidskoninginnen van de tuinplanten verheven.



Lilium canadense



Gracieuze en elegante wildvorm van de oostkust van Canada en uit delen van de New England States, groeiend in natte bossen tussen de varens. De forse bloemstelen kunnen wel twintig bloemen per steel dragen. De puntige oranjegele bloemblaadjes, aan de binnenkant vol met purperen spikkels, groeien belvormig uit naarmate de bloem rijpt. Gedijt op een humusrijke, niet te droge bodem.



Bestelnr. 9705

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium candidum

(Synoniemen: *Lilium album* en *Lilium candidum* subsp. *candidum*)

Maria- of Madonnalelie. Ze worden aangetroffen in Libanon en Oost-Israël, hoewel ervan wordt uitgegaan dat ergens in de Balkan, de eerste exemplaren aangetroffen zijn. De Romeinen namen deze bloem mee als teken van overwinning, later de kruisvaarders. Zij zorgden ervoor dat *Lilium candidum* naar Midden- en West-Europa kwam. Aan de bloemsteel zitten verspreide lancetvormige bladeren en tot wel twintig geurende naar buiten gerichte breed trechtervormige witte bloemen. De eerste bladeren verschijnen vaak in de herfst.

Bestelnr. 910

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Lilium 'Eurydice'

2013

Zij was de mooiste nimf van de Naiaden en de geliefde en bruid van de Thracische zanger Orpheus. Het is niet zomaar dat deze hoge Aziat vernoemd wordt naar Eurydice. Elegante, diep fuchsiarode knikkende bloemen op tot 150 cm hoge stelen. Uit handen van de Tsjechische hybridiseur Vaclav Jost, die ons persoonlijk deze schoonheid adviseerde.

Bestelnr. 9971 **3 st. 4.95**
 5 st. 7.50

120-150 6-7 15 10-12 18



Lilium henryi

Intro: 1889. De Ierse botanicus en dendrograaf Augustine Henry (1857-1930) introduceerde deze zacht geurende species. Herkomst: Ichange gorge (West-Hubei) en Guihoe in Centraal-China. De in hun oorspronkelijke omgeving voorkomende planten worden vaak niet hoger dan 100 cm, terwijl de robuuste lelie in onze contreien wel twee keer zo hoog kan worden. De stevige bloemsteel is voorzien van purperen vlekken. De vele bloemen zijn oranje en verfraaid met bruine spikkels en papillen.

Bestelnr. 916 **3 st. 4.95**
 5 st. 7.50

150-200 7-8 20 12-15 18



Lilium leichtlinii

Vernoemd naar Max Leichtlin. Deze Japanse species heeft grote geurende citroengele bloemen met vele roodpurperen spikkels. Vanaf juli is dit moois te aanschouwen aan 90 cm hoge bloemstelen, vaak in luchtige trossen van meer dan twaalf bloemen. Voor een plekje in humusrijke grond in de halfschaduw.

Bestelnr. 9247 **3 st. 4.95**
 5 st. 7.50

90-120 7 20 12-15 18



Lilium 'Scheherazade'

2013

Een krachtig groeiende, prettig geurende, Amerikaanse Orienpet-Hybride, *Oriental x Trumpet lelie*, ook wel ingedeeld bij de Turkse mutslelies. Langs de rozerode bloemen worden de crèmegele randen intenser van kleur naarmate de bloei vordert. Scheherzade heeft inmiddels veel lof ontvangen op het gebied van betrouwbaarheid, rijke bloei en winterhardheid.



Bestelnr. 9972

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Lilium tsingtauense


Bekend als de 'Twilight Lily', inheems in het oosten van China en Korea. De naam is afgeleid van de plaats: Tsingtao in China. De licht trompetvormige, oplichtend oranje bloemen (tot 15 in totaal) worden gedragen door een stevige stengel met kransgewijs geplaatst, glad, lancetvormig blad.



Bestelnr. 9489

p.st. 4.95

3 st. 13.50



HYBRIDEN VAN LILIUM MARTAGON EN MARTAGON-TYPE LELIES

De Turkse lelie komt voor in grote delen van Europa tot aan Azië. De lelies houden van een lichte humusrijke grond (kalk) met goede drainage. Probeer de wortelvoet in de schaduw (tussen beplanting in de border) te houden. Ten tijde van de bloei verspreiden de bloemen een heerlijke 'wilde bloemengeur', gonst het van de hommels en bijen en zelfs vlinders genieten van de schoonheid. U ontvangt Nederlands gekweekte bollen.




Lilium martagon

Intro: 1596. Nederlandse naam: Turkse lelie.
De bladeren die lancetvormig tot ovaal zijn, zijn in kransen geplaatst langs de forse 120-150 cm hoge bloemstengels. De knikkende paarse bloemen zijn op de kroonbladeren gemerkt met donkere vlekjes. Stinzenplant, heerlijk geurend. Extra grote bolmaat.



Bestelnr. 920 p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium martagon var. album

De witte vorm wordt al sinds de 16e eeuw aangetroffen in tuinen en ontving in 1889 een First Class Certificate van de Royal Horticultural Society en een AGM in 1933. De statige plant met de stevige stelen showt zijn geurende, ivoorwitte bloemen, tot wel twintig per steel, in mei-juni. Opvallend mooie oranje meeldraden. Extra grote bolmaat.



Bestelnr. 9249 p.st. 6.50
3 st. 18.00



Lilium 'Arabian Night'

(*L. martagon* 'Arabian Night')

Schitterende nazaat, al in 1999 geregistreerd, uit kruisingswerk verricht met o.a. *L. martagon*. Heerlijk geurende, vele knikkende bloemen, bordeauxrood, vanuit het hart goud bespikkeld, in grote trossen. De stevige stelen bereiken een lengte van 100 cm.



Bestelnr. 9239 p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium 'Chameleon'

Een bijzondere hybride, wanneer de bloemen zich openen zijn zij zachtroze, enkele dagen later veranderen ze naar crèmekleurig. De mooi getekende bloemen zijn 5 cm groot en verschijnen, bij volle wasdom, met wel veertig stuks aan de stevige steel.

Bestelnr. 9708

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium 'Claude Shride'

Een krachtige cultivar met lange bloemtrossen. De typische martagon-bloemvorm is duidelijk herkenbaar. Diep maroonrode bloemen, aan de buitenzijde roze gekleurd.

Bestelnr. 8621

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium 'Gaybird'

Een vrolijke vogel enigszins vergelijkbaar met *L. 'Manitoba Morning'*, echter de bloemen zijn iets kleiner. Daarentegen is de totale plantopbouw forser. De leverroze bloemen zijn besprenkeld met mahonierode spikkels omzoomd door goudgele markeringen.

Bestelnr. 9709

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium 'Orange Marmalade'

Oorspronkelijk in 1972 door E. Robinson geïntroduceerd onder de naam 'Tsinson', samengesteld uit de Latijnse namen van de ouders (danhansoni en tsingtauense). Deze naam is echter niet acceptabel volgens de internationale code van ICNCP 2004, omdat het Latijn was (of daaruit samengesteld). Vandaar de nieuwe naam 'Orange Marmalade', door Eugene Fox in 1994 gegeven. Luchtige, slanke bloemtrossen met zacht oranje bloemen. De donkere bloemstelen contrasteren mooi met de talrijke bloemen waarvan de bloemblaadjes minder ver naar achter gebogen zijn.

Bestelnr. 9257

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Lilium 'Pink Morning'

2013

Tijdens de Dutch Lily Days viel 'Pink Morning' ons direct op. De schitterende zachtroze bloemen besprenkelt met purperroze stipjes aan de krachtige stelen in de karakteristieke luchtige bloemtros maakt dit een goede aanvulling op het groeiende assortiment Martagon-lilies.

Bestelnr. 9973

p.st. 4.95
3 st. 13.50



Lilium 'Sunny Morning'

Warmgele bloemen waarop aan de binnenkant van de bloemblaadjes, veel paarsrode spikkels zichtbaar zijn. Op het uiteinde van het bloemblaadje zitten de spikkels dichter op elkaar en geeft dit dezelfde kleurindruk als die van de meeldraden, heel mooi! Eveneens van oorsprong uit de V.S.

Bestelnr. 9492

p.st. 4.95
3 st. 13.50




Muscari armeniacum

(Synoniemen: *Muscari colchicum*, *M. concinnum*, *M. conicum*, *M. cyaneo-violaceum*, *M. micranthum*, *M. polyanthum*, *M. sosnovsky* en *M. saovitsianum*)

Het bekende blauwe druifje. Intro: 1877.
Herkomst: Roemenië, Klein-Azië en de Kaukasus.
Het bloemtrosje is zeer compact.
De vele kobaltblauwe klokvormige bloempjes zijn voorzien van een wit randje. De smalle bladeren zijn vaak langer dan de bloeiwijze.


Bestelnr. 937	25 st.	3.00
	100 st.	11.50
	250 st.	27.50



Muscari armeniacum 'Siberian Tiger'

In het jaar van registratie, 2005 werd deze nieuwkomer direct gewaardeerd met een Getuigschrift Proeftuin van de K.A.V.B. Aanvankelijk zijn de bloemen spierwit maar langzaam verschijnt er ten tijde van de bloei een zweem van violetblauw over de bloemen waardoor op afstand lijkt alsof zij viltig grijs zijn.

Bestelnr. 9712	10 st.	3.00
	25 st.	7.00




Muscari armeniacum 'Touch of Snow'



Een prachtig gekozen naam voor deze nieuwkomer. Het is net alsof er een dotje sneeuw op het bloempje van de blauwe druif ligt. De bloemvorm van *M. armeniacum* is duidelijk herkenbaar. Uit handen van Paul van Bentum Bloembollen.


Bestelnr. 9973	10 st.	3.50
	25 st.	8.00



Muscari aucheri 'Mount Hood'

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de geurende *M. aucheri* is niet geheel zeker, maar waarschijnlijk is die afkomstig uit Noord-Iran. 'Mount Hood' is in eind 2003 geregistreerd. Violetblauw bloemtrosje waarvan de bovenste bloemetjes in het bloemtrosje wit zijn. Zeer opvallend voor zowel in de border, verwildering, als in potten.

Bestelnr. 8175 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00




Muscari aucheri 'Sky Blue'

(Synoniem: *M. species nova* 'Sky Blue')

In de jaren zeventig ontving Dr. Aldonis Verinsh in het wild verzamelde bollen van *M. pallens*. Er zat een enorme variatie in de bloei, in eerste instantie gezien als variëteiten van *M. pallens*. Dit bleek niet juist te zijn. Waarschijnlijk waren het hybriden ontstaan uit *M. pallens* en *M. neglectum*, die naast elkaar, wel onder verschillende groeiomstandigheden, in het wild voorkomen. Eén van deze selecties is de nu aangeboden *M. aucheri* 'Sky Blue'.

Licht hemelsblauwe bloemen met witte topjes.


Bestelnr. 8599 **25 st. 4.00**
100 st. 15.00



Muscari aucheri 'White Magic'

Ook een introductie van Kwekersvereniging Muscari Blue Magic. Maar nu munt de selectie uit in het bloeitijdstip, een vroege zuiver witte druif. Zeer geschikt voor potcultuur.

Bestelnr. 960 **10 st. 3.00**
25 st. 7.00



Muscari azureum


(Synoniemen: *Bellevalia azurea*, *Hyacinthella azurea*, *Hyacinthus azureus* en *Pseudomuscari azureum*)

Intro: 1859. Herkomst: Oost-Turkije. De slechts twee tot drie grijsgroene bladeren omsluiten aan de voet het tot 15 cm hoge plantje. Het bloemtrosje kan wel tot 60, nauwelijks vijf millimeter grote klokvormige en dicht opéén zittende bloemetjes bevatten.

De hemelsblauwe (azureus) bloempjes hebben een donker streepje op elk bloemblaadje. De uiteinden van de kelkblaadjes zijn niet samengetrokken.

Prima soortje voor verwildering.

Bestelnr. 940 **10 st. 2.50**
25 st. 6.00




Muscari azureum 'Album'

(Synoniemen: *Hyacinthella azurea* 'Alba' en *Hyacinthus azureus* 'Albus')

Intro: 1939 (J. Bijl van Duyvenbode). Een zuiver witte vorm uit *M. azureum*. Het is net alsof er een groene waas over de bloempjes ligt. Bloeit prettig vroeg.

Bestelnr. 942 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00




Muscari 'Bling Bling'



De ontwikkeling in het assortiment gaat gewoon door. Dit jaar viel mij op de Muscari-keuring de glimmende 'Bling Bling' op. Glanzende violetblauwe bloemen in dichte, stevige rechte bloemtrossen. Lang bloeiend en een goed vaasleven. Geregistreerd in juli 2013, 'Bling Bling' ontving in 2011 een getuigschrift op de proeftuin van de K.A.V.B.

Bestelnr. 9974 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00




Muscari botryoides 'Album'

Intro: 1596. Het is een witte mutant uit *M. botryoides*. De bladeren zijn opmerkelijk korter dan de nagenoeg rechthoekige bloeiwijze.

Herkomst: Zuid-Europa en de Balkan, ook bekend als: 'Pearls of Spain'.

Bestelnr. 946	10 st.	2.50
	25 st.	6.00




Muscari botryoides 'Superstar'

Muscari botryoides is de enige echte blauwe druifhyacint die nog sporadisch, verwilderd, in Nederland voorkomt (stinzenplant). We bieden de selectie 'Superstar' aan, een in 1997 geregistreerde cultivar met korenbloemblauwe bloemen.

Elk bloemetje is afgebiesd met eenivoorkleurig wit randje.


Bestelnr. 8601	10 st.	2.50
	25 st.	6.00



Muscari comosum

Intro: 1596. Herkomst: Noord-Afrika, Frankrijk, Midden-Europa, het zuiden van Rusland en zuidwesten van Azië. Nederlandse naam: kuifhyacint. Verspreid voorkomend in onze duinen. Het onderste gedeelte van de bloem bestaat uit olijfgroene bloempjes op korte steeltjes die fertiel (vruchtbaar) zijn en de bovenste steriele (onvruchtbare) lang gesteelde lobbloemetjes zijn zacht violet. Het verhaal wil dat de plant in Nederland zou zijn ingevoerd met fazantenvoer. De bloeiwijze is curieus.

Bestelnr. 948	10 st.	3.50
	25 st.	8.00




Muscari discolor



Aangetroffen in de omgeving van Konya, Turkije. Spraakmakende dwergspecies waarbij de fertiele bloemen opvallend tweekleurig zijn. Diep zwartblauw aan de basis en bijna wit aan de top. De steriele bloemen zijn licht- tot violetblauw. De bloemtros is in verhouding groot. De tot vier slanke blaadjes liggen gedraaid op de grond.



Bestelnr. 9975 p.st. 7.50
3 st. 21.00




Muscari latifolium

Intro: 1858. Herkomst: West- en Zuid-Turkije. De sterk ontwikkelde topbloemen zijn lichtblauw, het onderste gedeelte van de bloeiwijze bestaat uit donkerblauwe steriele bloemetjes. Gewoonlijk heeft de plant slechts één breed blad (latifolius). Goed voor verwildering.



Bestelnr. 954 25 st. 3.00
100 st. 11.50




Muscari macrocarpum

(Synoniemen: *M. flavum*, *M. luteum* en *M. moschatum* var. *flavum*)

Herkomst: Griekenland, de Cycladen en West-Turkije. Een vrij zelden aangeboden gele druif. De vruchtbare bloempjes zijn eerst rossig violet maar verkleuren snel naar geel tot bruingeel. Steriele bloemen zijn sporadisch aanwezig. Zoet geurend.



Bestelnr. 958 5 st. 3.50
10 st. 6.50




Muscari muscarimi

(Synoniemen: *M. ambrosiacum*,
M. moschatum en *Muscarimia muscari*)

Intro: 1554, al lang in cultuur vanwege de muskusgeur. Herkomst: het zuidwesten van Turkije. Het bovenste gedeelte bestaat uit slechts enkele paarse onvruchtbare bloemetjes. Het overige gedeelte is zachtgeel met een amberkleurig bloemrandje.

Bestelnr. 962 5 st. 3.50
 10 st. 6.50




Muscari neglectum

(Synoniemen: *M. atlanticum*, *M. compactum*,
M. elwesii, *M. leucostomum*, *M. mordoanum* en
M. racemosum)

Intro: 1568. Herkomst: België (Maasvallei), Frankrijk, Duitsland, Noord-Afrika en het zuidwesten van Azië. De drie tot zes lichtgroene bladeren zijn smal en kunnen een lengte bereiken van 30 cm. De bloemkleur is bijna zwart (zeer donkerblauw) met aan het einde van de bloembuis een smal helderwit randje. De steriele bloemetjes aan de top van de bloemtros zijn blauw. Heel apart.


Bestelnr. 964 10 st. 3.00
 25 st. 7.00



Muscari parviflorum

Dit is het enige blauwe druifje dat in de herfst bloeit. Behorende tot de pseudomuscari-groep. Inheems in het Mediterrane gebied, van Spanje tot Turkije. Intro in 1798. De los ogende 10 cm lange bloemtros bestaat uit een twintigtal lichtblauwe belvormige bloemen, 3-4 mm groot. Planten op een beschutte standplaats.

Bestelnr. 970 3 st. 5.25
 5 st. 8.50




Narcissus 'Albus Plenus Odoratus'

Intro: 1590. Division 4. Reeds in 1590 ontving Carolus Clusius de eerste bolletjes van deze zachtgeurende narcis. Door de jaren heen heeft ze nogal wat bij-namen gekregen, enkele voorbeelden zijn: 'Double Border', Double Pheasant's Eye', poeticus 'Flore Pleno', poeticus 'Pattellaris Pleno Albo Cum Croceo', poeticus 'Plenus' en 'The Large Gardenia Flowered Double White Daffodil'. De bloemkleur: gevuldbloemig wit, de gele meeldraden en helmknoppen worden zichtbaar als de bloemen rijpen. Ook voor verwilderding.

Bestelnr. 1490

5 st. 4.75

10 st. 9.00



Narcissus asturiensis



(Synoniem: *N. minimus*)


Division 13. Inheems op de bergweiden van Spanje en Noord-Portugal. De perfecte miniatuur van de trompetnarcis. Zowel de dekblaadjes als het trompetje zijn goudgeel, waarbij de rand van het trompetje meestal is geplooid.

Prettig vroeg bloeiend, ideaal voor de rotstuint.

Bestelnr. 9976

p.st. 4.95

3 st. 13.50



Narcissus 'Bath's Flame'


(Synoniem: *N. 'Flame'*)

Intro: voor 1913. Division 3. G.H. Engleheart. Award of Merit in 1915. Aan de los ogende bloem is direct te zien dat we met een historische cultivar van doen hebben. Het diepgele cupje heeft een oranje randje, de bloemblaadjes zijn geel.

Bestelnr. 1560

3 st. 3.75

5 st. 6.00



Narcissus 'Canary Bird'

Een Nederlandse introductie van voor 1913.
Division 8. Meerbloemige Tazetta-narcis met ronde heerlijk geurende donker citroengele bloemen met een oranje cupje.



Bestelnr. 9714 **10 st. 4.50**
25 st. 10.50




Narcissus cantabricus

Division 13. Een variabele species oorspronkelijk voorkomend in Zuid-Spanje, de Balearen en Noord-Afrika. De subspecies verschillen met name door het aantal grasachtige bladeren en de bladgrootte van elkaar.
Op een hoepelrokje gelijkende glazig witte bloemen op korte steeltjes, 10-15 cm.
Vaak al bloeiend in januari-februari.



Bestelnr. 8181 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00




Narcissus 'Centannees'

Intro: 1984. Division 11.
Heerlijk geurende opvallende spleetkronige narcis. De grote gespleten echt oranje kroon bedekt bijna in z'n geheel de goudgele kroonbladeren.
Goed houdbare snijbloem.



Bestelnr. 8183 **5 st. 4.95**
10 st. 9.50





NARCISSUS BULBODIDIUM SUBSP. BULBODIDIUM

Intro: 1629. Division 10. Nederlandse naam: hoepelroknarcisje.
 Herkomst: Algerije, Marokko, Spanje, Portugal en het zuidwesten van Frankrijk.
 Het aanbod bestaat uit drie selecties en/of kruisingen die veel beter en rijker bloeien dan de soort, selecties waarbij er meerdere bloemstelen (tot wel 7) per bol verschijnen.
 Graag een zonnig plekje en een niet te droge grond.



Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium 'Classic Gold'

Bestelnr. 9267
 10 st. 4.00
 25 st. 9.50




Narcissus 'Spoirot'

Bestelnr. 9503
 5 st. 3.50
 10 st. 6.50



Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium 'China Gold' 

Bestelnr. 9977
 10 st. 4.00
 25 st. 9.50








Narcissus 'Chit Chat'

©2013

Een kruising uit begin jaren zestig, *N. assoanus* x *N. jonquilla*. Division 7. Een miniatuurnarcis gewoonlijk met twee heldergele heerlijk geurende bloemen per steeltje. Chit Chat omdat het door de stand van de bloempjes lijkt alsof zij met elkaar aan het kletsen zijn.

Bestelnr. 9978 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00






20-25  4-5  10  10-12  9 



Narcissus 'Cherry Spot'

Intro: 1975. Division 3. Grant E. Mitsch, ontstaan uit *N. 'Artillery'* x *N. 'Avenger'*. Zeer opvallende levendig orangerode cup, mooi contrasterend met de witte kroonbladeren die bij het ontluiken een crèmegele band rond de basis tonen.

Bestelnr. 8605 **5 st. 4.95**
10 st. 9.50






45-50  4-5  10  12-15  1. 



Narcissus 'Curlew'

Division 7. Uit de 'vogeltjes-serie' van G.E. Mitsch, met als ouderpaar: *N. 'Killaloe'* x *N. jonquilla*. Er verschijnen tot drie ivoorwitte bloemen per steel met een relatief lang uitgerekt cupje dat gedurende de bloei ook naar ivoorwit kleurt. Geurend.

Bestelnr. 9716 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00

30  4  10  10-15  14 




Narcissus 'Daphne'

(Synoniem N. 'Spalding Queenie')

Intro: voor 1914. Division 4. De dubbele dichters-narcis, een selectie uit zaailingen van *N. poeticus* 'Ornatus'. Heerlijk geurende mooi gevormde dubbele witte bloemen.

Bestelnr. 1620 3 st. 4.95
 5 st. 8.00



Narcissus 'Dear Lotte'

©2013

Division 3. Afkomstig uit de proeftuin van Mrs. Abel Smith. In het avondrood zijn de bloemblaadjes warmoranje en omsluiten zij een oranjerood cupje. Fantastische kleur met een heerlijke geur. Overdag zijn de bloemen romig oranje.

Bestelnr. 9979 5 st. 4.00
 10 st. 7.50



Narcissus 'Derringer'

Division 7. Uit handen van Brent C. Heath, 2003. De heerlijke geur van *Narcissus jonquilla*, één der kruisingsouders, is zeer herkenbaar. De zachtoranje cup wordt omsloten door zachtgele bloemblaadjes die aan de rand lichter van kleur zijn.

Bestelnr. 9717 10 st. 3.50
 25 st. 8.00




Narcissus 'Dutch Lemon Drops'

Intro: 2007. Division 5. Voorheen aangeboden als *N. 'Lemon Drops'*. Degene die dit narcisje op de wereld gezet heeft, is tot op heden onbekend. Meerdere knikkende bloemen aan een 20-25 cm lange bloemsteel. De kroonblaadjes zijn wit en het cupje is citroengeel.



Bestelnr. 1519	5 st.	3.75
	10 st.	7.00



Narcissus 'Elka'

Division 1. Terecht in 2011 een Award of Garden Merit ontvangen. Een miniatuur trompetnarcis die in knopstadium een zachtgele trompet toont, maar bij volle wasdom van de bloem uiteindelijk zuiver wit is. In 1989 door Alec Gray, Engeland, geïntroduceerd. Mooi voor verwildering.



Bestelnr. 9718	10 st.	3.75
	25 st.	9.00




Narcissus 'February Gold'

Division 6. Al een oudje, van voor 1923 maar nog steeds een heel betrouwbare gele cyclamineus die zeer geschikt is voor verwildering. Een Nederlandse hybride, van de Graaff Bros. De levendig gele bloemen kunnen al vanaf februari verschijnen.



Bestelnr. 9719	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00




Narcissus 'Frou-Frou'



Intro: 1984. Division 4. Frou Frou, het krokante wafeltje met de romige vanille crème geeft een aardige kleurindruk. Uit Noord-Ierland. Heerlijk geurende gevulde bloemen met vanuit het hart een vleugje groen.

Bestelnr. 9980

p.st. 2.95
3 st. 8.25



Narcissus 'Hawera'

Intro: 1928. Division 5. Door Dr. William M. Thomson in Nieuw-Zeeland gewonnen met als kruisingsouders *N. jonquilla* en *N. triandrus*. Gewoonlijk meerdere, zes tot acht, knikkende citroengele bloemetjes aan een 25 cm hoog bloemsteeltje. Het blad is smal, enigszins grasachtig. Heerlijk geurend. Hawera heeft al vele prijzen gewonnen zoals een Award of Merit in 1938 en een AGM, Award of Garden Merit in 1995.

Bestelnr. 8193

25 st. 4.00
100 st. 15.00



Narcissus 'Irene Copeland'



Division 4. Een historische narcis van voor 1915 door William F.M. Copeland op de wereld gezet, vernoemd naar zijn dochter. Sneeuwwit en sprankelend groengeel zijn de kleuren die de perfect gevulde bloem omschrijven.

Bestelnr. 8689

3 st. 3.75
5 st. 6.00



Narcissus jonquilla

Division 13, section Jonquilla.

Herkomst: Zuid-Spanje. Heerlijk zoetgeurende wildvorm voor een zonnige standplaats.

Elk 20 cm hoog stengeltje geeft twee tot zes helder diepgele bloemen met een klein cupje.

Het cilindervormige blad is donkergroen van kleur.



Bestelnr. 1576	25 st.	4.50
	100 st.	17.00




Narcissus jonquilla var. henriquesii

Division 13, section Jonquilla. Een jonquille die veelvuldig werd gebruikt als kruisingsouder.

Nu wat in de vergetelheid geraakt, maar het blijft één van de fraaiste wildvormen. Een aantekening van Sue Drew in Wisley Daffodil trials: "Lovely garden plant, scented and free flowering. Flowered for 87 days with 62 flowering stems per 10 bulbs. Produced three to five scented flowers per stem".



Bestelnr. 1511	10 st.	3.00
	25 st.	7.00




Narcissus 'Julia Jane'

Intro: 1966. Division 10. Een goed groeiende vorm van *N. romieuxii* subsp. *romieuxii* met mooie zachtgele buitenwaarts bollende bloempjes. Geselecteerd door J.C. Archibald in 1966 uit een wildcollectie van Marokkaanse origine.



Bestelnr. 1496	3 st.	6.00
	5 st.	9.50




Narcissus 'Keats'

2013

Intro: 1952. Division 4. In de afgelopen vijftien jaar is het maar weinig voorgekomen dat wij deze schitterende narcis hebben kunnen aanbieden. Gelukkig is er nu weer wat voor handen. Vernoemd naar Keats, John K. (1795-1821), een vooraanstaand Engelse dichter. Geselecteerd door Alec Gray, Engeland. Gewoonlijk één bloem per steel, de kroonbladeren zijn zuiver wit, het cupje is crèmewit met een groen randje. De uitstekende meeldraden zijn kunstig gevormd, als molenwieken. Deze licht geurende narcis bloeit laat, vanaf eind mei.


Bestelnr. 8195	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Narcissus 'Laurens Koster'

Intro: voor 1906. Division 8. (A. Vis). Naar 'onze' Haarlemse uitvinder van de boekdrukkunst werd deze een eeuw geleden tot de groep tazetta behorende narcis genoemd. Een nakomeling van *N. 'Ornatus'* x *N. tazetta*. Een werkelijk heerlijk ruikende narcis met een botergeel cupje omsloten door witte bloemblaadjes.

Bestelnr. 1600	10 st.	3.50
	25 st.	8.25



Narcissus 'Lemon Silk'

Division 6. Uit Amerika afkomstig, met als ouders *N. 'Nazareth'* x *N. cyclamineus*. Een schoonheid die zelden wordt aangeboden. De bloemblaadjes zijn zacht citroengeel, wit aan de basis, los staand en licht naar achter buigend. Het cilindervormige cupje is wit, licht geribbeld.


Bestelnr. 9722	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Narcissus 'Lieke'

Intro: 2009. Division 7. Een heerlijk geurende witte jonquilla, met meerdere bloemen per bloemsteel. Een zaailing van Brent and Becky Heath, vernoemd naar de dochter van de kweker Gerrit Preijde, die een deel van hun zaailingen test en teelt.


Bestelnr. 9496 10 st. 3.50
25 st. 8.25



Narcissus 'Lucifer'

Intro: voor 1890. Division 2. Een klassieker, in 1898 bekroond met een Award of Merit en in 1901 een FCC. Losjes ogende crèmekleurige bloemblaadjes omvatten het slanke cupje dat naarmate de bloem rijpt, van oranje naar geel kleurt. Het verkleuren van de bloem ten tijde van de bloei is een eigenschap van oude narcissenrassen.

Bestelnr. 9275 3 st. 3.75
5 st. 6.00



Narcissus 'Mallee'

Intro: 2001. Division 11. Een charmante spleetkronige narcis in de zachte tinten wit en roze. Uit handen van B.S. Duncan, N. 'Movie Star' x N. 'Last Chance'. In 2007 heeft 'Mallee' een AGM mogen winnen.


Bestelnr. 9498 5 st. 4.95
10 st. 9.50



Narcissus x odorus 'Plenus'

Intro: 1601. Division 4. De gevuldbloemige vorm van *N. odorus*. Dubbele Campernelen. De heerlijk geurende gele bloemen lijken net roosjes. Bijzonder geschikt voor verwildering.


Bestelnr. 1523	10 st.	3.00
	25 st.	7.00
	100 st.	26.00



Narcissus 'Petrel'

Intro: 1970. Division 5. Door G.E. Mitsch 1970 (Grant Mitsch Novelty Daffodils, Canby, Oregon, U.S.A.). Een Triandrus-type, met gewoonlijk twee of meer hangende bloempjes per steel. De kroonblaadjes zijn teruggeslagen. Een roomwitte, meerbloemige en zeer rijk bloeiende beauty. Lange bloeitijd en heerlijk geurend.

Bestelnr. 1590	10 st.	4.95
	25 st.	12.00



Narcissus poeticus var. recurvus

(Synoniemen: *N. 'Jean(n)ette Blanche'* en *N. 'Pheasant's Eye'*)
Intro: voor 1600. Division 13. Bekend onder de namen: fazanten- of pauwenoog narcis. Als bijna alle narcissen zijn uitgebloeid, ontluiken de heerlijk geurende bloemen van deze schoonheid. De helderwitte licht achterwaarts gebogen bloemblaadjes omgeven een groen cupje met daarop een gele stip voorzien van een fel rood randje. Is niet moeilijk maar bloeit het ene jaar spontaner dan het andere jaar. Geeft een voorkeur aan een niet te droge standplaats.

Bestelnr. 1525	10 st.	4.75
	25 st.	11.50
	100 st.	42.50





Narcissus 'Peeping Tom'

Bestelnr. 1588

5 st. 3.50
10 st. 6.50



Narcissus 'Peeping Jenny'

Bestelnr. 9982

10 st. 3.95
25 st. 9.50



Wellicht de mooiste uit Division 6, Cyclamineus. De goudgele 'Peeping Tom' met zijn lange trompet en de ivoorwitte 'Jenny'. Beide soortjes uit de eerste helft van de vorige eeuw, die nog steeds, zij het beperkt, worden geteeld. En nu worden zij vergezeld door de nieuwkomer 'Peeping Jenny', een tweekleurige aanvulling waarbij de naar achter wijzende bloemblaadjes ivoorwit zijn en de langgerekte trompet goudgeel is.



Narcissus 'Jenny'

Bestelnr. 9983


5 st. 3.50
10 st. 6.50



NARCISSENPAKKETJE

Bestelnr. 9984

5+10+5 st. 10.00
10+20+10 st. 19.50




Narcissus pseudonarcissus



Division 13, section pseudonarcissus.

De aangeboden *Narcissus pseudonarcissus* is een wilde vorm uit het Cantabrisch gebergte, Noord Spanje, verzameld door A. Hoog en zijn vader in 1978 op de Puerto de las Senales op 1500 m. Het een kleinbloemige vorm, minder groot dan *N. nobilis* of *N. leonensis*. Heeft een bepaalde charme en vermeerdert goed uit zaad.

Bestelnr. 9984	3 st.	7.50
	5 st.	12.00




Narcissus pseudonarcissus subsp. lobularis

Division 13, section pseudonarcissus.

Een geografische vorm van *N. pseudonarcissus*, oorspronkelijk voorkomend in Zuid-België en Noord-Frankrijk. Het is één der vroegst bloeiende narcisjes (maart), waarvan de kelkblaadjes crèmegeel zijn en het cupje geel is. In veel botanische tuinen worden ze aangetroffen, niet alleen vanwege de magnifieke plantenbouw, maar nog meer daar juist dit soort zich uitstekend leent voor verwildering.

Bestelnr. 1527	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus pseudonarcissus subsp. obvallaris

(Synoniemen: o.a. *N. bromfieldii*, *N. concolor*, *N. toscanus*)

Division 13, section pseudonarcissus. In Engeland wordt deze verwilderd voorkomende diep goudgele narcis de Tenby-Daffodil genoemd, de nationale narcis van Wales. Er zijn meerdere verhalen in omloop over hoe de narcis in Wales terecht gekomen is. Het volgende klinkt aannemelijk: In de middeleeuwen trokken Italiaanse monniken naar West-Engeland. Onderweg door de bergen namen zij deze narcissen mee voor medicinale doeleinden. Perfect soortje voor verwildering.

Bestelnr. 1533	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus 'Regeneration'


Intro: 1995. Division 7. Een Amerikaanse hybride met als ouders: *N. 'Hillstar'* x *N. 'Quick Step'*.

De geurende bloemen openen zich scherp citroengeel, de cup is crèmewit. Rondom het cupje zijn de bloemblaadjes aan de basis ook crèmewit. Drie tot vijf bloemen per steel.

Bestelnr. 9726

10 st. 4.95

25 st. 12.00



Narcissus 'Rip van Winkle'


Intro: voor 1884. Division 4.

Een historische narcis afkomstig uit Ierland. Zowel de kelkblaadjes als ook het trompetje van dit gevuldbloemige goudgele narcisje zijn verdeeld in smalle stukjes. Net een kaktusdahlia. De bloei vangt groengeel aan en is prettig vroeg. Is ook leuk om in een pot te gebruiken.

Bestelnr. 1634

10 st. 3.50

25 st. 8.00



Narcissus 'Rijnveld's Early Sensation'

Intro: 1946. Division 1.


De allervroegste gele trompetnarcis voor verwildering. De laatste jaren gebeurt het wel dat de Zandvoortselaan, de verbindingsweg tussen Zandvoort en Heemstede, al vanaf december geel kleurt. De bloei houdt bijna de hele winter aan, alleen tijdens sneeuw of strenge vorst staat deze stil. Uiteindelijk volgt er in maart nog een toegift. Award of Merit in 1984 en een AGM in 1993.

Bestelnr. 9281

10 st. 3.50

25 st. 8.00

100 st. 30.00




Narcissus 'Segovia'

Intro: 1962. Division 3. De dekbladeren, die elkaar voor een derde overlappen zijn wit. De cup is aan het uiteinde ribbelig en voorzien van een groengele kleur. Uniek, een heel leuk dwergnarcisje.



Bestelnr. 1545	10 st.	3.75
	25 st.	9.00




Narcissus 'Stainless'

Intro: 1960. Division 2. De ultieme perfectie, smetteloos zuiver witte bloemen met een plat cupje. Fantastisch is het groene hartje. Wellicht de mooiste narcis in zijn klasse.



Bestelnr. 9287	5 st.	4.50
	10 st.	8.50




Narcissus 'Thalia'

Intro: voor 1916. Division 5. De zuiver witte ietwat naar achter gebogen kelkblaadjes vormen een ster. De eveneens zuiver witte cup, aan het uiteinde gegolfd, heeft de vorm van een drinkbeker. Drie tot vier bloemen per steel is normaal. Bij tuinliefhebbers staat dit soort nog altijd hoog op het verlanglijstje en wordt veelal toegepast in verwilderingsborders.



Bestelnr. 1553	10 st.	3.50
	25 st.	8.00
	100 st.	30.00



Narcissus 'Topolino'


Intro: 1965. Division 1. Een leuke narcis voor verwilderling. Lijkt enigszins op *N. pseudonarcissus* subsp. *lobularis*. Door J. Gerritsen & Zoon op de wereld gezet. De kroonbladeren zijn bij het ontluiken crèmekleurig en verbloeien naar bijna wit. Het cilindervormige trompetje is levendig geel. Prettig vroeg bloeiend, vanaf begin maart.



Bestelnr. 8209

10 st. 2.75

25 st. 6.50



Narcissus 'Toto'


Intro: 1983. Division 12. Ook dit narcisje is afkomstig uit de handen van W.G. Pannill. Op slechts 20 cm hoge steeltjes staan één tot drie zuiver witte bloemen met, bij het ontluiken een zachtgeel cupje, dat later verkleurt naar het crèmewit. In alle stadia een prachtige bloem. Een zacht geurende elegante narcis, die ook zeer geschikt is voor verwilderling. Bezit alle kwaliteiten van de bekende *N. 'Tête-à-Tête'*, maar dan in het wit.



Bestelnr. 1596

5 st. 3.00

10 st. 5.50



Narcissus 'Velocity'




Intro: 1995. Division 6. Door de sterk naar achter gebogen goudgele bloemblaadjes toont dit narcisje de indruk haast te hebben. Velocity, de naam, is snelheid, beweging in een dimensie, geeft dit aardig weer. Daarbij de vurige kleurencombinatie, goudgeel met een orangerode cup, maakt dit een goede nieuwkomer in het assortiment die bovenal veel gezonder is dan de andere narcissen uit deze division in dezelfde kleursamenstelling.



Bestelnr. 9985

10 st. 3.75

25 st. 9.00




Narcissus 'Victoria'

(Synoniem: *N. 'Dutch Victoria'*)

Intro: voor 1897. Division 1. Een historische trompetnarcis in een klassieke kleurcombinatie: crèmewitte bloemblaadjes omvatten een gele trompet. Zoals het synoniem doet vermoeden, selectiewerk verricht door een Nederlander, M. Vos. Perfect voor verwilderding.

Bestelnr. 9507	3 st.	3.75
	5 st.	6.00




Narcissus watieri

(Synoniem: *N. rupicola var. watieri*)

Intro: 1931. Division 13. Een prachtig wildvormpje uit Marokko, het Atlas-gebergte. Meestal voorkomend in bosrijk gebied op 1800 tot 2600 meter hoogte. Zowel de zes kroonblaadjes als het platte cupje zijn wit. Het geheel wordt niet veel hoger dan 10-12 cm.


Bestelnr. 8211	p.st.	4.50
	3 st.	12.75



Narcissus 'White Lady'

Intro: voor 1897. Division 3. Ontving in 1898 een Award of Merit. Nog steeds verwilderd voorkomend in Noord-Ierland. De bloemkleur van deze oorspronkelijke Leedsii narcis werd in 1935 door de heer J.H. Hytunadi als volgt omschreven: roomgele kroon met citroengele rand en een dikbladig wit bloemdek.

Bestelnr. 1606	3 st.	3.75
	5 st.	6.00



Narcissus 'Yazz'

Intro: 1991. Division 7.


Een rijk bloeiende heerlijk geurende jonquille in een bijzondere kleurencombinatie. De bloemblaadjes ontluiken zachtgeel en verbloeien naar het ivoorwit. Het cupje is mosterdgeel met een koperoranje randje. Veel bloemen in rijke kleuren.



Bestelnr. 9986

10 st. 4.50

25 st. 10.75



NECTAROSCORDUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Nectar was op de berg Olympus de drank der Goden (maar het is ook een zoet vocht dat de bijen uit de bloemen halen) en uit het Grieks/Latijn scordion wat zoveel betekent als: de plant geurt naar uien.

Een klein geslacht van planten nauw verwant aan *Allium* met als voornaamste verschillen:

een vruchtbeginsel met talrijke zaaddozen en drie tot zeven nerven tekenen elk bloemblaadje, bij allium slechts één. Er zijn een viertal species bekend. De plant groeit op alle goed gedraineerde grondsoorten en verdraagt zowel de volle zon als een schaduwrijk plekje.



Nectaroscordum siculum subsp. *bulgaricum*

(Synoniemen: *Allium bulgaricum*,

A. dioscoridis en *A. siculum*)

Intro: 1873. Herkomst: Zuid-Frankrijk, Sicilië, Sardinië, Zuid-Italië, Noord-Irak, Zuidoost-Turkije en West-Iran.

De wat 'lossig' ogende ca. 15 cm brede bloeiwijze bestaat uit 20-30 zeer fraaie klokvormige en knikkende bloemen die op ca. 10 cm lange en donkere steeltjes staan. De kleur van de bloemen, met overlappende bloemblaadjes is purper met een brede crèmewitte rand en een zweem van groen. Tijdens de uitbloei richten de bloemen zich omhoog. Het is een bijzonder waardevolle snij- en droogbloem.

Bestelnr. 975

10 st. 3.00

25 st. 7.00




Nectaroscordum tripedale

(Synoniem: *Allium tripedale*)

Herkomst: Armenië. De 1,5-2 cm grote, klokvormige satijnroze bloemen vormen samen een compacte bloemtros op 100-130 cm stevige bloemstelen. Deze *Nectaroscordum* is hoger dan *N. meliophilum*, afkomstig van de Krim, die nooit hoger wordt dan 50 cm. In de bloeitijd worden de bloemen vanwege de overvloedige nectar intensief door onder andere hommels bezocht. Waardevolle snij- en droogbloem. Afgelopen voorjaar waren er in de keuringzaal van de K.A.V.B. interessante selecties en kruisingen te zien in dit geslacht, dit belooft mooie aanwinsten voor de toekomst.

Bestelnr. 977

p.st.	9.00
3 st.	25.50



ORNITHOGALUM

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Uit het Grieks: ornis (vogel) en gala (melk). De Nederlandse naam luidt aldus: vogelmelk. Het geslacht *Ornithogalum* bestaat uit een groep bolgewassen die zich lenen voor verwildering. De vele species, maar ook de cultivars zijn zonder meer geschikt als snijbloem. Ze zijn overwegend afkomstig uit de gematigde streken van Europa, Azië, en Afrika. De bollen zouden tamelijk voedselrijk en smakelijk zijn, uiteraard na te zijn gekookt.




Ornithogalum balansae

Intro: 1884. Herkomst: Noordoost-Turkije en het aangrenzende gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Nederlandse naam: breedbladige vogelmelk. Bloeit in maart-april met kortgesteelde, enigszins kegelvormige bloemtrossen geflankeerd door twee à drie tot 1 centimeter brede heldergroene bladeren. De witte bloemen zijn aan de buitenkant voorzien van brede groene strepen. Verwildert goed.

Bestelnr. 981

25 st.	3.50
100 st.	13.00



Ornithogalum ponticum 'Sochii'

Eind jaren tachtig verzameld in de bossen in Sochi, aan de Russische Zwarte Zee, inmiddels veruit de meest populaire badplaats van Rusland en de plaats waar de Olympische Winterspelen 2014 plaatsvinden. De lange piramidaal groeiende dichte bloemtros bestaat uit grote zuiver witte bloemen en is niet alleen perfect voor in de border, maar ook als snijbloem fantastisch.


Bestelnr. 9729	3 st.	4.95
	5 st.	7.50



Ornithogalum reverchonii

Inheems in het zuidwesten van Spanje en Marokko, waar deze vogelmelk groeit in spleten in de kalksteenrotsen. Een sierlijk soort met tot twintig zuiver witte, hangende, 2 centimeter grote klokvormige bloemen. Sterke snijbloem.


Bestelnr. 979	3 st.	7.50
	5 st.	12.00



Ornithogalum umbellatum

Intro: 1594. Gewone vogelmelk, plaatselijk: snottebellen. Herkomst: grote delen van Europa, Noord-Afrika, Turkije, Syrië, Libanon en Israël. De lijnvormige gegroefde en half opgaande groene bladeren hebben een duidelijke witte middenstreep. Het bloemscherm bestaat uit zo'n twintig zuiver witte stervormige bloemetjes met op de achterzijde de groene strepen die vrijwel niet worden opgemerkt wanneer de bloemetjes wijd geopend zijn. Dit gebeurt in de namiddag; bij het invallen van de avond sluiten ze zich.

Bestelnr. 993	25 st.	3.50
	100 st.	13.00



OXALIS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER OXALIDACEAE

Oxalis versicolor


Zeer opvallende Zuid-Afrikaanse species al bekend in 1774. De witte bloemen showen een sterk contrasterende rode rand. De bloemen, die tot ver in de winter bloeien, zijn op zijn mooist in halfgeopende toestand, dan tonen de spiraalvormige bloemblaadjes het zuurstokeffect.

Een echte potplant die tot zes graden vorst verdraagt. Als kamerplant zou deze *Oxalis* jaarrond kunnen bloeien.

Bestelnr. 9511

5 st. 3.50

10 st. 6.75



PARIS

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER TRILLIACEAE

De naam Paris komen we tegen in een van de vele Griekse sagen. Het symboliseert de Trojaanse prins Paris en de drie godinnen Hera, Athene en Aphrodite tijdens een schoonheidswedstrijd rond een overwinningfeest. Het geslacht Paris bestaat uit een tiental species. De planten houden van een schaduwrijk plekje in een grondsoort die rijk is aan humus. Herkomst: Europa, Afghanistan, Himalaya van Kasjmir tot Midden-China en Taiwan en van Manipur tot Noord-Thailand, waar ze vaak massaal in bossen voorkomen op een hoogte van drie-en-een-halve kilometer.




Paris incompleta

Ten vinden in de bossen van Noordoost-Turkije, vanaf Ordu naar het oosten en in de Kaukasus. Verwant aan onze inheemse *P. quadrifolia*, maar is groter en groeikrachtiger. Het blad bestaat uit zeven tot elf bladdelen, de groene tot gelige bloemen zijn samengesteld uit een prachtige compositie van bloemblaadjes, kelkblaadjes en meeldraden. Niet moeilijk op bosgrond in de (half)schaduw.

Bestelnr. 9730

p.st. 8.95

3 st. 25.50



Paris thibetica


2013

(Synoniemen: *P. polyphylla* var. *appendiculata*,
P. polyphylla var. *thibetica* en *Daiswa thibetica*)

Een recent geïntroduceerde species uit China. De 20 tot 40 cm hoge steel draagt een krans van smalle, iets gegolfde blaadjes, waar in het midden een limegroene bloem zit. De brede overlappende kelkblaadjes vormen een mooie ondergrond voor de opvallende opgerolde roodbruine bloemblaadjes, waar tussenuit de lange meeldraden verschijnen. Evenals bij *P. polyphylla* verschijnt in de herfst een opvallende hoeveelheid rode bessen.

Bestelnr. 8217

p.st. 4.95
3 st. 13.50



PUSCHKINIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER HYACINTHACEAE

Vernoemd naar de Russische graaf Apollos Apollosvich Mussin-Pushkin, een in 1805 overleden botanicus die veel planten in de Kaukasus verzamelde. Een zeer klein geslacht nauw verwant aan *Scilla* en *Chionodoxa*, maar het verschilt van deze doordat de kroon samengesteld is uit meel- en helmraden.




Puschkinia scilloides var. libanotica

(Synoniem: *Puschkinia libanotica*)

Intro: 1808. Herkomst: West-Azië en de Kaukasus. Het bloemtrosje wordt gevormd door ongeveer tien ster- en klokvormige licht porseleinblauwe bloemetjes met een blauwgroene middennerf. Goed toepasbaar bijvoorbeeld als onderbeplanting en prima voor verwildering.

Bestelnr. 1001

25 st. 2.75
100 st. 10.00




Puschkinia scilloides var. libanotica 'Alba'

De zuiver witte vorm van *Puschkinia scilloides* var. *libanotica*. Herkomst: Turkije, Hakkari, bij Yuksekova op 2000 meter hoogte. Zeer aantrekkelijk wanneer ze massaal worden aangeplant zoals zij in het wild voorkomen.

Bestelnr. 1003

25 st. 3.50
100 st. 13.00



SANGUINARIA


BEHOORT TOT DE FAMILIE DER PAPAVERACEAE

Sanguinaria canadensis

Herkomst: het oosten van Noord-Amerika. De hartvormige en gelobde bladeren zijn aan de bovenzijde grijsgroen, aan de onderzijde blauwgroen en verschijnen vaak tijdens of direct na de bloei. De helderwitte bloempjes bloeien in april-mei. De vlezige wortelstokken bevatten een rood melksap, vandaar de Nederlandse benaming: bloedwortel. Voor een licht beschaduwde plekje in een humusrijke, vochtige maar goed doorlatende grondsoort.

Bestelnr. 1007

3 st. 7.50
5 st. 12.00




Sanguinaria canadensis 'Multiplex'

(Synoniem: *S. canadensis* 'Flore Pleno')

Een gevuldbloemige vorm. Elke award die te winnen is, is door deze bloedwortel gewonnen. Tussen het blauwgroene loof ontluiken de witte pompons. De bloemen houden langer aan dan de enkelbloemige. Schitterend voor iedere schaduwtuin.

Bestelnr. 1009

p.st. 12.50
3 st. 36.00



Scilla (krenken, benadelen) was het woord dat door Hippocrates gebruikt werd met betrekking tot de wortels die een gewelddadig gif bevatten. De *scilla* die gewoonlijk werd gebruikt door de Romeinen en de Grieken is de plant die we nu kennen als *Urginea maritima* (Zee-ui). Het geslacht *Scilla* omvat ongeveer 100 species, maar daarvan zijn er de laatste jaren nogal wat opgegaan in andere geslachten (bijv. *Scilla non-scripta* heet nu *Hyacinthoides non-scripta*). Ze komen voor in zowel tropische- als gematigde streken van Zuid-Afrika tot aan het gebied langs de Middellandse Zee en overige delen van Europa en Azië. De sterhyacint hoort thuis op kalkhoudende en humusarme zandgrond die niet al te droog mag zijn. **Verwildering!**



Prospero autumnale

(Synoniem: *Scilla autumnalis*)


Intro: 1753. Herkomst: grote delen van Europa (inclusief het Britse Rijk), Noord-Afrika en West-Azië. Zoals de naam aangeeft is dit een in de nazomer of herfst (autumnale) bloeiende species. De voor de bloei verschijnende bladeren zijn smal en grasachtig. De meest voorkomende bloemkleur is paarsblauw, maar ook lila en donkerroze exemplaren zijn gesignaleerd.



Bestelnr. 1015

p.st. 2.95

3 st. 8.25



Scilla bifolia

(Synoniemen: *S. dubia*, *S. minor*, *S. nivalis*, *S. uluensis* en *S. xanthandra*)


Intro: 1568, in Nederland sinds 1594. Herkomst: Midden- en Zuid-Europa en Klein-Azië. Een vroegbloeiend (maart) en welriekend soortje. Het blad, vaak twee in getal (bifolia), is schedevormend en aan één zijde van de bloemsteel geplaatst. Het bloemtrosje omvat zo'n tien opvallend grote gentiaanblauwe stervormige bloemetjes. **Verwildering.**



Bestelnr. 1017

10 st. 2.50

25 st. 6.00




Scilla bifolia 'Rosea'

(Synoniem: *S. bifolia* var. *carnea*)

Een fraaie zachtroze vorm. In cultuur sinds 1601.
Prima geschikt voor verwildering.

Bestelnr. 1021 10 st. 2.50
25 st. 6.00



Fessia hohenackeri


(Synoniem: *Scilla hohenackeri*)

Verzameld door Bowles Scholarship British Expedition (BSBE) in Noordwest-Iran, Talish-gebergte, in hazelaar struikgewas op 24 maart 1963.

De licht indigoblauwe hangende bloemen, met teruggeslagen bloemblaadjes zitten luchtig verspreid aan een stevig bloemsteeltje.

Deze charmante *Scilla* heeft minder, maar mooier blad ten tijde van de bloei dan bijvoorbeeld *S. greilhuberi*.

Bestelnr. 8219 p.st. 4.95
3 st. 13.50



Scilla litardierei

(Synoniemen: *S. albanica*, *S. amethystina*,
S. italica en *S. pratensis*)

Intro: 1827. Herkomst: Dalmatië, voormalig Joegoslavië en het westen van de Balkan.

Het slechts 15 cm hoge bloemsteeltje, omgeven door donkergroene smalle bladeren, torst vijftien tot wel zeventig stervormige zachtlila tot lavendelblauwe bloemetjes die dicht bijéén geplaatst staan en een tros vormen. Na de bloei buigen de bloemblaadjes zich over de stampers.

Bestelnr. 1023 10 st. 2.75
25 st. 6.50




Scilla mischtschenkoana 'Tubergeniana'

(Synoniemen: *S. diziensis* en *S. tubergeniana*)

Intro: 1931. Herkomst: het noordwesten van Iran (Tabris) en de Kaukasus. De weinige bladeren zijn smal en lijn- tot gootvormig. De bloemtrosjes, waarvan het lijkt dat ze direct uit de grond komen, bestaan uit stervormige wat knikkende zeer lichtblauwe geurende bloemetjes met op ieder bloemblaadje een lichtblauw nerfje. Deze zeer vroegbloeiende *Scilla* doet denken aan een verwijnde uitgave van *Puschkinia*. Uit ieder bolletje komen drie tot vier bloemsteeltjes met een hoogte van 10 cm. Verwildering.

Bestelnr. 1025	10 st.	3.50
	25 st.	8.00




Scilla siberica

(Synoniem: *S. cernua*)

Intro: 1796. Herkomst: Zuidoost-Europa, de Kaukasus, Klein-Azië en het zuidoosten van Azië. De helderblauwe, knikkende, ster- tot klokvormige bloempjes worden op ieder bloemblaadje gemarkeerd door een donkerblauwe middennerf. De meest bekende *Scilla*, zeer geschikt voor verwildering.


Bestelnr. 1031	25 st.	3.50
	100 st.	12.50



Scilla siberica 'Alba'

Een witbloeiend sterhyacintje met overigens dezelfde eigenschappen als *S. siberica*. Inheems in de bossen en de weiden in de Kaukasus, de Krim en Noord-Iran.

Bestelnr. 1033	10 st.	2.75
	25 st.	6.50



Scilla siberica 'Enem'


2013

Oorspronkelijk aangetroffen door Viktor Korolev in het Krasnodar District, in het zuiden van Rusland, nabij de plaats Enem. Deze *Scilla* groeit daar in de schaduw in een gemengd loofbos. Het onderscheidt zich van de soort doordat deze nog blauwer is en geheel geen wit in de bloem heeft. Zeer vroeg bloeiend, vaak al in de laatste week van januari.



Bestelnr. 9512

p.st. 2.95
3 st. 8.25



STERNBERGIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER AMARYLLIDACEAE

Dit geslacht werd vernoemd naar graaf Kaspar Moritz van Sternberg (1761-1831). De auteur van "Revisio Saxifragarum" (1810). De bloemen vertonen visueel overeenkomst met die van krokus, maar er zijn essentiële verschillen. De voornaamste: *Sternbergia* heeft zes meeldraden, de krokus drie.

Waarschijnlijk behoren ze tot de planten die in de Bijbel bedoeld worden als 'de leliën des velds'. Voor een zonnige standplaats op doorlatende bodem waar 's zomers in de rustperiode voldoende warmte is.




Sternbergia candida


Een in 1976 door Brian Mathew en Baytop ontdekte species, drie jaar later benoemd. De tot nu toe enige vindplaats is in Zuidwest-Turkije, nabij Fethiye aan de rand van de cederbossen. De lieflijke, geurende witte bloemen verschijnen in de winter, vooraf gegaan door het grijsgroene, lange smalle blad.



Bestelnr. 9658

p.st. 7.95
3 st. 22.50





Tecophilaea cyanocrocus

Bestelnr. 1042

p.st. 3.95
3 st. 11.25

Nederlandse naam: Chileense krokus, ook wel: gentiaan krokus. De naam van dit super fraaie geslacht danken we aan de dochter van de Italiaanse plantkundige Luigi Colla (1766-1848) uit Turijn, die de buitenissige naam "Tecofila" bij haar geboorte kreeg toebedacht. Er is ook sprake van een vernoeming naar de Italiaanse botanisch kunstenaar Tecophila Billottii.

Intro: eind 19e eeuw. Een geurende ca. tien cm hoge voorjaarsbloei. Herkomst: Chili, voornamelijk nabij de hoofdstad Santiago, waar ze door 'liefhebbers' bijna zijn uitgeroeid. Redelijk winterhard.



Tecophilaea cyanocrocus 'Leichtlinii'

Bestelnr. 1051

p.st. 6.50
3 st. 18.00



Tecophilaea cyanocrocus 'Violacea'

Bestelnr. 1053

p.st. 4.95
3 st. 13.50

Vinasse-kali

Een aanvullende bemesting met Vinasse-kali direct na de bloei van de bol- en knolgewassen geeft een betere ontwikkeling van het gewas in het volgende jaar. 100% natuurlijk.

Dosering : 50 gram per m².
Inhoud : 800 gram.

Dit product wordt alleen binnen Nederland geleverd.

Bestelnr. 4701

p.st. 6.95



Trillium is afgeleid van het Latijnse woord tri (drie). Dit omdat zowel het blad als ook de bloem uit drie delen bestaat. Herkomst: Siberië, Korea, Japan en China. Een enkele species wordt aangetroffen in het westelijk deel van de Himalaya, maar het merendeel komt voor in grote delen van Noordoost-Amerika. *Trillium* is herkenbaar aan de kale bloemstelen, drie bladeren die een krans vormen, drie opvallende bloembladeren en drie schutbladeren. Het ondergrondse gedeelte bestaat uit een verdikte wortelstok met zijdelings geplaatste ogen (nieuwe uitlopers). De wortelstokken variëren behoorlijk in grootte, afhankelijk van de species. Het is mogelijk dat deze het eerste jaar na aanplant latent blijft. De standplaats dient vochtig en koel te zijn, een beschaduwde plek, bijvoorbeeld als onderbegroeiing.



Trillium catesbaei




(Synoniemen: *T. catesbyi* en *T. stylosum*)

Herkomst: Noord-Carolina tot Georgia en Alabama. De bronskleurige bladeren zijn ovaal en kort gesteeld. Het gracieuze knikkende witte bloempje, is vaak voorzien van een roze zweem. Het komt voor dat deze helemaal roze is. Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.



Bestelnr. 8223

p.st. 4.50
3 st. 12.75



Trillium cuneatum


Nederlandse naam: Padden-trillium.

Herkomst: het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het is een wat forsere plant met aantrekkelijk gevlekt blad. De 5 tot 10 cm grote maroonkleurige bloem wordt omgeven door enigszins gespreide groene kroonbladeren met een purperen was. Behoort tot de subgenus *Phyllantherum*, waarbij de bloemen opgaand en stengelloos zijn.



Bestelnr. 8225

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Trillium erectum


(Synoniemen: *T. foetidum*, *T. obovatum* en *T. rhomboidum*)

Intro: 1759. Herkomst: oostelijk Noord-Amerika. De groene, steelloze bladeren zijn omgekeerd eirond van vorm. De licht knikkende donker kastanjebruine bloem staat tot 10 cm boven het blad en heeft een doorsnede van zo'n 8 cm.

Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.

Bestelnr. 8227

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Trillium flexipes


(Synoniemen: *T. declinatum*, *T. gleasonii*)

De 'Bent Trillium' of 'Drooping Trillium' komt voornamelijk voor in het middenwesten van de Verenigde Staten. De enigszins variabele species met knikkende witte bloemen wordt aangetroffen op een vochtige kalkstenen bodem. Karakteristiek voor dit, in de tuin makkelijk te houden soort, is de rozengeur die de plant tijdens de bloei verspreidt.

Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.

Bestelnr. 9513

p.st. 5.50
3 st. 15.00



Trillium grandiflorum


Intro: 1799. Herkomst: oostelijk Noord-Amerika waar ze massaal worden aangetroffen in bossen tussen kreupelhout op een kalkzandstenen bodem. De groene bladeren zijn veelal omgekeerd eirond, soms omgekeerd lancetvormig. De grote zuiver witte bloemen verbloeien naar zachtroze.

De bekendste trillium.

Behoort tot de trilliums waarbij de bloemen aan een bloemstengel boven het blad zitten.

Bestelnr. 8231

p.st. 3.50
3 st. 9.75



Een geslacht nauw verwant aan *Brodiaea* en *Dichelostemma*. Vernoemd naar James Brodie (1744-1824) een Schotse tuinbouwkundige. Het geslacht bestaat uit meer dan dertig species en wordt veelal aangeboden als *Brodiaea*. *Triteleia* verdraagt de volle zon, maar ook lichte schaduw. De grond soort mag variëren van zand tot leem, maar dient wel goed vocht doorlatend en rijk aan voeding te zijn. Perfecte planten voor verwildering. Prachtige, langdurig houdbare snijbloemen waarvan we komende jaren leuke kleuren in kunnen verwachten.




Triteleia hyacinthina

(Synoniemen: *Brodiaea hyacinthina* en *B. lactea*)

Intro: 1835. Herkomst: Brits-Columbia, Idaho en Californië (U.S.A.). De bloemschermen zijn gevuld met tientallen melkwitte trechtervormige en opgaande bloemen. De sterke doch soepele bloemstelen worden zo'n 50 cm hoog. Bloeit langdurig in juni-juli.



Bestelnr. 1045 25 st. 2.75
100 st. 10.00




Triteleia ixioides 'Starlight'

Begin jaren negentig is deze *Triteleia* geselecteerd uit *T. ixioides* var. *scabra*, die van oorsprong in Californië (U.S.A.) voorkomt. Een groot bloemscherm bestaande uit tientallen crèmegele bloemen met 'n donkergele streep in het midden van elk bloemblaadje. Prachtig in combinatie met roodbladige vaste planten. Een lange bloeiperiode, van mei tot in juni. Snijbloem.



Bestelnr. 1047 10 st. 3.00
25 st. 7.00




Triteleia 'Rudy'

Het is een rijk bloeiende vorm, tot wel vijftig bloemen per bloemscherm, met decoratieve crèmewitte bloemen die voorzien zijn van een opvallende, paarsviolet streep vanuit het midden uitvloeiend over de bloemblaadjes. Prima snijbloem.



Bestelnr. 8235

10 st. 3.00
25 st. 7.00



TULBAGHIA

BEHOORT TOT DE FAMILIE DER ALLIACEAE

Tulbaghia is vernoemd naar de vroegere Nederlandse Gouverneur in Kaap de Goede Hoop: Ryk Tulbach (overleden 1771). *Tulbaghia* is nauw verwant aan *Allium*. Het is een klein geslacht bestaande uit zo'n twintig species met als thuishaven: Zuid-Afrika. De inheemse bevolking gebruikt de wortelstok van deze plant als smeersel tegen reumatiek, of als aftreksel dat op het voorhoofd wordt gewreven en verlichting bij hoofdpijn zou geven. Goed gedraineerde grond is vereist, anders goed te houden als potplant.




Tulbaghia natalensis

Voorkomend in Natal, één van de vier voormalige Zuid-Afrikaanse provincies, op vochtige, drassige graslanden. Het bloemscherm bestaat uit zes tot zeven bloemen met brede witte bloemblaadjes en een groen naar oranje kleurend hartje. Geurend naar kruidnagel. Gedurende het voorjaar tot in de herfst ontwikkelt de plant wel tot drie keer aan toe een bloeiperiode. Het niet wintergroene loof loopt in het voorjaar frisgroen uit. Vrij zeldzaam.



Bestelnr. 9515

p.st. 4.25
3 st. 12.00




Tulbaghia violacea

(Synoniem: *T. cepacea*)

Intro: 1838. Massaal voorkomend in het Tsitsikamma oerwoud, gelegen aan de oostkant van de Kaapprovincie. De donkergroene en smalle bladeren vormen een rozet. Aan de top van de bloemsteel vormen zich meerdere trossen met stervormige lilaroze bloempjes. Ze vragen een zonnige standplaats en bloeien langdurig vanaf eind mei.

Redelijk winterhard. Een prima snijbloem.

Bestelnr. 1062	5 st.	3.50
	10 st.	6.50




Tulbaghia violacea var. maritima

Een ondersoort met breder blad. Mauve-roze bloemen bestaande uit korte brede bloemblaadjes die elkaar enigszins overlappen, waardoor een mooie ronde bloemvorm ontstaat.

Bloeiend gedurende de hele zomer.

Bestelnr. 1066	3 st.	3.75
	5 st.	6.00




Tulbaghia 'Enya'



Eerder aangeboden onder: *T. -Otterlo 929-*, inmiddels op naam gesteld en geregistreerd. Ontstaan uit *T. capensis* x *T. violacea* uit handen van J. Duijs die de nieuwe serie "Otterlo hybriden" op de markt brengt. *Tulbaghia* soorten kruisen goed met elkaar. Hieruit groeien door het combineren van de verschillende eigenschappen verrassende nieuwe kleuren. Deze serie kenmerkt zich door sneller groeiende planten met veel meer bloemen dan gebruikelijk. 'Enya' bloeit rijk met grotere paarse bloemen, die ten tijde van de bloei iets lichter verkleuren.

Bestelnr. 9516	p.st.	4.75
	3 st.	13.50



Het oorsprongsgebied van *Tulipa* loopt door landen als Turkije, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan. Voor een groot deel zijn dat landen met veel bergen zoals het Ala Tau-gebergte, dat doorloopt tot in China waar het Tien Shan heet. Door het verdwijnen van het IJzeren Gordijn is het voor onderzoekers uit het westen nu mogelijk om de tulpen in hun oorsprongsgebieden te bestuderen en te onderzoeken. Er zijn mogelijk al 150 verschillende soorten of species aangetroffen, voorkomend onder verschillende omstandigheden. Zo zijn er species groeiend op berghellingen, op rotsige bodem, maar ook in zware klei tot een halve meter diep. Wat ze veelal gemeen hebben is: 's zomers gloeiende hitte en 's winters veel sneeuw. De eerste tulp in Nederland kwam in het bezit van de Amsterdamse apotheker Wallich Ziewiertz, vermoedelijk omstreeks 1570, doch geheel zeker is dat niet.



Tulipa acuminata

(Synoniemen: *T. turcica*, *T. cornuta* en *T. stenopetala*)

Intro: 16e eeuw. In 1813 voor het eerst beschreven toen M. Vahl deze opnam in een plantenlijst van de Botanische tuin in Kopenhagen. Eigenlijk is het een hybride die een species-naam draagt. Ook bekend als de 'gehoorde tulp'.


De lange en curieus gevormde bloemblaadjes zijn rood met geel, vaak met een groene gloed aan de buitenzijde. De helmknoppen zijn bruin.



Bestelnr. 1100

3 st. 4.95

5 st. 7.50



Tulipa aucheriana


Geïntroduceerd door H. Elwes in 1880, maar al in 1838 ontdekt door Pierre Aucher-Eloy. Herkomst: Iran en Syrië. De twee tot vijf grijsgroene bladeren zijn ca. 15 cm lang en gegolfd. Eén tot drie roze bloemen met gepunte bloemblaadjes en een geelbruin hart. De buitenzijde van de bloemblaadjes hebben een geelbruine blos. Wanneer de bloemen geopend zijn, tonen zij een duidelijke stervorm. Heerlijk geurend.



Bestelnr. 1102

3 st. 6.00

5 st. 9.50



Tulipa bakeri 'Lilac Wonder'

Intro: 1971. De oorspronkelijke *T. bakeri* is inheems op Kreta. De krachtige cultivar heeft ronde bloemblaadjes, rozelila met een groot rond geel hart aan de binnenzijde. De buitenste blaadjes zijn pastelkleurig mauve. Ongecompliceerd, een prima tuintulpje.

Bestelnr. 9733

10 st. 2.50

25 st. 6.00



Tulipa batalinii 'Bright Gem'


(Synoniem: *T. linifolia* (Batalinii Group) 'Bright Gem')

Intro: 1952. De oorspronkelijke vorm komt voor in Centraal-Azië, het Pamir-Alai gebergte. 'Bright Gem' toont zwavelgele charmante bloemen met aan de buitenzijde een oranje blos. Zodra het zonnetje schijnt, vouwen de bloemen geheel open. Grijsgroen gegolfd blad. Heel leuk voor in potten.

Bestelnr. 8635

10 st. 2.50

25 st. 6.00



Tulipa batalinii 'Red Gem'


(Synoniem: *T. linifolia* (Batalinii Group) 'Red Gem')

Intro: 1985. De buitenzijde van de bloemen is vermiljoenrood met een roze glans. De binnenzijde is scharlaken met een zwart hart en een gele gloed. De meeldraden zijn chroomgeel. Is met succes toegepast om te laten verwilderen in gras.

Bestelnr. 8637

10 st. 3.50

25 st. 8.00



Tulipa batalinii -zaaimengsel-

Een schitterende partij, uit zaad gekweekt, (vermoedelijk *T. montana* x *T. linifolia*) waarin de mooiste tinten uit de Batalinii-groep voorkomen. Van zachtgeel tot diep oranje, met tussenliggende nuances zoals abrikoos en perzik. Om te smullen. Uiteindelijk verkleuren alle tinten in de uitbloei naar roomwit. Perfect voor verwildering op een zonnige plek.


Bestelnr. 1172 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00



Tulipa biflora

Intro: 1776. Herkomst: van Zuidoost-Europa tot aan het gebied rond de Kaspische Zee en de Kaukasus. Een variabele species. De twee, in verhouding tot de totale plantenbouw, vrij grote bladeren zijn verfraaid met een rood randje. Het slechts 12 cm hoge bloemsteelkje draagt een drietal heerlijk geurende bloempjes, wit met een groot geel hart. Het zou wel eens de kleinere uitgave van *Tulipa turkestanica* kunnen zijn.


Bestelnr. 1106 **10 st. 2.50**
25 st. 6.00



Tulipa bifloriformis

Voor het eerst beschreven in 1935. Herkomst: Centraal-Azië, met name het Tien Shan-gebergte, op kalkhellingen op 1900 meter hoogte. Een variabele species, nauw verwant aan *T. turkestanica*. De roomwitte bloemen geuren licht naar honing. De buitenzijde heeft een waas van violet, de basis is roomgeel. Ook in de helmknoppen zit variatie, meestal violet, soms geel.


Bestelnr. 8639 **5 st. 4.50**
10 st. 8.50



Tulipa clusiana

Intro: 1802. Lady Tulip, Candy Tulip of Snoepgoedtulp. Herkomst: Noordoost-Afghanistan en de Kashmir, op sommige plaatsen verwilderd, Zuid-Frankrijk en Griekse eilanden. In Europa zijn zij verspreid door in de kluiten van geïmporteerde druivenstruiken mee te liften. De drie tot vijf bladeren zijn grijsgroen en duidelijk gegolfd. De gepunte bloemblaadjes zijn aan de buitenkant rood en aan de binnenzijde wit. De basis is donker karmijnrood en de meeldraden paars. Bij zonnig weer zijn de geopende bloemen stervormig; dan valt de ongelooflijke kleurencombinatie extra op.

Bestelnr. 1162 5 st. 4.50
 10 st. 8.50




Tulipa clusiana 'Cynthia'

In 1959 door Van Tubergen geïntroduceerd, ontstaan door het kruizen van de gele en witte vormen van *T. clusiana*.

De roomgele bloemen hebben aan de buitenkant van de bloemblaadjes een rode was met een groen randje. Ook de helmknoppen zijn groen. Award of Garden Merit in 1999. Een nieuwe toepassing voor de *Tulipa* is aanplanten in het gras. Hier zijn inmiddels goede resultaten mee behaald.


Bestelnr. 8251 10 st. 2.50
 25 st. 6.00



Tulipa clusiana var. chrysantha 'Tubergen's Gem'

Intro: 1969. Deze hogere selectie behaalde vele getuigschriften o.a. op de Floriade Amsterdam 1972. De buitenste drie bloemblaadjes zijn karmijnrood, de binnenste drie bloemblaadjes zijn zwavelgeel gekleurd. De binnenzijde van de bloem is goudgeel met gele helmknoppen. Ook deze *Tulipa* is geschikt voor verwildering in het gras.


Bestelnr. 8253 10 st. 2.75
 25 st. 6.50



Tulipa clusiana var. stellata

Intro: 1827. Herkomst: o.a. het noorden van Afghanistan en Pakistan. De bloemen missen de karakteristieke zwarte keel zoals de soort dat wel heeft. De witte bloemen tonen aan de buitenzijde een rozerode blos en over het geheel zit een roze gloed. De bloemstengel is langer, 30-35 cm.

Bestelnr. 9308	10 st.	3.50
	25 st.	8.00




Tulipa cretica 'Archanes'



Uit een collectie in het wild verzamelde *Tulipa cretica* zijn na jaren lang selecteren drie mooie introducties ontstaan die vernoemd zijn naar steden op Kreta. Wij bieden er twee aan. 'Archanes' is rijkbloeiend met op de buitenste bloemblaadjes een zilverroze blos, lichter wordend naar de rand. De binnenzijde van de bloem is nagenoeg wit met een geel hartje. Twee tot drie glanzend groene speervormige bladeren.

Bestelnr. 9987	p.st.	2.95
	3 st.	8.25




Tulipa cretica 'Heraklion'



Ook een fantastische selectie uit *Tulipa cretica* die voorkomt in de bergen van Kreta, rond Kisamos, Lapsili, de berg Ida, Kaap Malacca, Sitra en Akrotiri, in de buurt van struikgewas. Tot drie bloempjes aan een enkel steeltje, wit met een roze blos die verloopt tot een gele basis. Op de achterkant van de buitenste bloemblaadjes zitten fuchsiaroze vleugjes waardoor er een vrolijk tweekleurig effect ontstaat. Twee tot drie glanzend groene speervormige bladeren.


Bestelnr. 9988	p.st.	2.95
	3 st.	8.25



Tulipa didieri

Een sierlijke tulp die ontluikt uit een smalle puntige knop. Voorkomend in Zuid-Europa, met name in de Savoyen. Voor het eerst beschreven in 1846 door Alexis Jordan, één van de eerste Neo-tulpen die als species beschreven is. De bloemen zijn meestal donker rozerood, hoewel er sprake is van een veranderlijkheid van deze soort. De lange gepunte bloembladen kunnen iets naar buiten zijn gebogen. Aan de voet in het hart zit een zwarte vlek met een witte omlijning.


Bestelnr. 1178 **3 st. 3.75**
 5 st. 6.00



Tulipa hageri

Intro: 1874. Herkomst: Griekenland, Kreta en de omgeving van Izmir (Turkije). Vernoemd naar Friedrich Hager door Theodor von Heldreich, die beiden het tulpje introduceerden. De klokvormige bloemen hebben een kleur die het midden houdt tussen koperkleurig en scharlaken met op de buitenste bloemblaadjes een duidelijk zichtbare olijfgroene gloed. Het hart is zwart met een geel randje.

Bestelnr. 1116 **10 st. 3.50**
 25 st. 8.00



Tulipa hageri 'Splendens'

Intro: 1945. De bloemkleur is koperbrons met een scharlaken gloed aan de buitenzijde, weinig of geen groen in de bloem.

Dit schaarse, meerbloemige tulpje heeft drie tot vijf klokvormige bloemen op een 20-25 cm hoog steeltje. De bloem opent zich al enkele centimeters boven de grond.

Bestelnr. 1180 **5 st. 4.00**
 10 st. 7.50



Tulipa heweri

Inheems in Noord-Afghanistan, verzameld door Professor Tom Hewer en Grey Wilson in 1969. Via Wageningen, L.W.D. van Raamsdonk, in de handel gekomen. Een zeer verleidelijk tulpje met glimmende gele bloemen die voorzien zijn van een rode vlam op de buitenste bloemblaadjes. In het wild variabel voorkomend. Meestal twee tot drie bloemen per steeltje.


Bestelnr. 1184	3 st.	3.75
	5 st.	6.00



Tulipa humilis

Herkomst: Noord- en Noordwest-Iran (Elburz gebergte) en Kurdistan. Intro: 1844. Slechts 10-12 cm hoog met een variabele bloemkleur van mauve tot violet en een grote gele basis. De bloemen zijn bekervormig, maar openen zich tot een ster in de zon.


Bestelnr. 1166	10 st.	2.75
	25 st.	6.50



Tulipa humilis 'Eastern Star'

In 1975 door Visser Czn. geïntroduceerd. Magentaroze bloemen met een bronsgroene vlam op de buitenste bloemblaadjes. Het hartje is kanariegeel. In het jaar van introductie ontving het oosterse sterretje direct een Getuigschrift van de Proeftuin K.A.V.B.

Bestelnr. 9735	10 st.	2.50
	25 st.	6.00




Tulipa humilis 'Lilliput'

2013

Intro: 1987 (Visser Czn.). Een meerbloemig 'dwergje' van circa 10 cm hoog met kardinaalrode, mooi gevormde bloemetjes voorzien van een paarszwart hartje.

Bestelnr. 1114

10 st. 2.75
25 st. 6.50




Tulipa humilis 'Magenta Queen'

Intro: 1975, uit handen van W. Kooiman. De vroegste cultivar van *T. humilis*. De buitenste bloemblaadjes zijn lilapaars met een varengroene vlam, de binnenste bloemblaadjes zijn lilapaars. De binnenkant van de bloem is lilapaars met een gele basis en groengele meeldraden. Het langwerpige, ietwat brede blad is grijsgroen.

Bestelnr. 8257

3 st. 4.50
5 st. 7.00




Tulipa humilis 'Persian Pearl'

Geïntroduceerd in 1975 door Grullemans en via W. Lemmers bij Visser Czn. terechtgekomen die het tulpje op naam stelde. De kelkblaadjes zijn aan de buitenkant magentaroze met een groene gloed, aan de binnenzijde cyclamenpurper. Het hart is boterbloemgeel.

Bestelnr. 8641

10 st. 3.00
25 st. 7.00




Tulipa humilis var. pulchella 'Alba Caerulea Oculata'

(Synoniem *T. violacea* var. *pallida*)

Intro: ca. 1989, verzameld in het noordwesten van Iran. Dit bijzonder fraaie tulpje zal vanaf begin april zonder meer een eyecatcher zijn. Zodra de elegante, witte bloemen zich openen, tonen zij een staalblauw hart. Award of Merit in 1989 van de R.H.S.

Bestelnr. 1120	3 st.	4.50
	5 st.	7.00




Tulipa iliensis

(Synoniemen: *T. dykesiana* en *T. hoeltzeri*)

Intro: 1879. Herkomst: Tien Shan (Centraal-Azië) en China waar ze voorkomen in het Dzungaria-Kashgar gebied op rots- en grashellingen. Nauw verwant aan *T. altaica*. De bloemkleur is citroengeel met op de buitenste bloemblaadjes violette tinten. De helmknoppen zijn geel.

Bestelnr. 1122	5 st.	4.00
	10 st.	7.50



Tulipa ingens

Herkomst: Centraal-Azië (Pamir-Alai, Zeravshan). Verzameld door Paul Graeber in 1901. Opmerkelijk is de ca. 40 cm hoge roodachtig gekleurde bloemsteel. De komvormige en zeer grote scharlaken bloemen glanzen. 'Ingens' betekend: enorm. Aan de binnenzijde, nabij de basis, treffen we lange zwarte vlekken aan; overigens is dit ook aan de buitenkant duidelijk waarneembaar. De bladeren zijn 'plat' en lintvormig.

Bestelnr. 1124	10 st.	3.95
	25 st.	9.50



Tulipa kaufmanniana 'Ice Stick'

De wildvorm komt voor in het Tien Shan-gebergte op gras- en rotschellingen. 'Ice Stick' is door de Botanische Tuin in Tashkent geselecteerd uit het wild. Via Janis Ruksans en J.S. Pennings in Nederland geïntroduceerd en in 2002 geregistreerd. Valt op door zijn vroege bloei.

De witte bloemen hebben aan de buitenzijde van de bloemblaadjes een purperrode blos.

Bestelnr. 9519	10 st.	3.75
	25 st.	8.75




Tulipa kolpakowskiana

Herkomst: In de heuvels tegen het Tien Shan-gebergte aan, Kazachstan in het Altai-gebergte en over de grens in het noordwesten van China.

De één, soms drie gele bloempjes met spits toelopende bloemblaadjes zijn aan de buitenkant voorzien van rozerode vlekjes, het geheel is omgeven door een waas van groen.

De helmknopjes zijn geel. De bladeren zijn gegolfd en aan het einde gepunt.


Bestelnr. 1126	10 st.	2.75
	25 st.	6.50



Tulipa linifolia

Herkomst: Tadzjikistan hoog in de bergen, zeer variabel maar wel alleen rood. De smalle, gegolfd, grijsgroene bladeren hebben rode randjes en vormen een rozet. Het schitterende scharlakenrode bloempje, met spitse bloemblaadjes, verkleurt iets lichter naar de rand en is voorzien van een paarszwart hart met grijsgroene helmknoppen. Wanneer de bloemen geopend zijn, lijken ze op een omgeslagen paraplu.

Bestelnr. 1192	25 st.	3.50
	100 st.	13.00



Tulipa montana

T. wilsoniana door Hoog genoemd. *T. montana* was toen ten onrechte gegeven aan een vorm van *T. oculus-solis*, *T. staffii* of *T. systola*. *T. montana* kent vele verschillende kleuren en vormen en komt voor in de Kopet-Dag, Turkmenistan en in het Elbrus en Zagros-gebergte in Iran. Het aanbod is een perfecte rode tulp. Door John Lindley in 1827 geïntroduceerd. De bloemkleur is donker vermiljoen. De buitenste bloemblaadjes zijn omhuld met 'n paarse gloed. Het hartje is zwart.



Bestelnr. 1148 **10 st. 3.75**
25 st. 9.00




Tulipa neustruevae

Veelal foutief aangeboden onder de naam: *T. dasystemon*. In 1877 door Eduard Regel geïntroduceerd. Voorkomend in de bergen van Tien Shan, Pamir Alai en verder in het noordwesten van China.

De kleine, geelbloeiende species is nauw verwant aan *Tulipa tarda*, echter het heeft minder blad, de bloemen staan solitair en er komt geen wit voor in de bloem.



Bestelnr. 9520 **10 st. 2.75**
25 st. 6.50




Handgereedschap

Verplantschepje



Bestelnr. 4702 p.st. 22.00

Plantschepje met puntsnede



Bestelnr. 4703 p.st. 22.00

Hovenierschepje




Bestelnr. 4712 p.st. 22.00

Zeer hoogwaardige kwaliteit. Smeedijzer, volledig gehard. Handvat: essenhout.

Tulipa orphanidea 'Flava'

Dit meerbloemige tulpje heeft gele bloemen en rode topjes met op de buitenste bloemblaadjes een zweem van groen en oranje. Het hart is bronskleurig evenals de helmknoppen. Vindplaats van de variabele species is met name West-Turkije, Griekenland en Bulgarije. 'Flava' is een cultuurvorm die in 1970 een Award of Merit ontving.

Bestelnr. 1134 **5 st. 3.50**
10 st. 6.50




Tulipa polychroma

(Synoniem: *T. biflora* var. *grandiflora*)

Intro: 1885. Herkomst: Noord-Iran en het noordwesten van Afghanistan. Een meerbloemig slechts 10-15 cm hoog tulpje. Wanneer het zonnetje erop schijnt, is het net een bos 'sterretjes'. De bloemkleur is wit met wat violet op de buitenste bloemblaadjes. Zowel de basis als de helmknoppen zijn geel en al dit fraais is te bewonderen vanaf maart-april.

Bestelnr. 1138 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50




Tulipa praecox

De aan *T. agenensis* verwante species komt voor in Zuid-Europa en West-Turkije, meestal in gecultiveerd gebied, soms op berghellingen. In 1811 maakt Michele Tenore melding van deze makkelijk groeiende tulp, die hij in de omgeving van Napels aantrof.

De oranjerode bloemen worden gedragen door een stevige stengel omgeven door drie tot vijf langwerpige bladeren.

Bestelnr. 9521 **3 st. 7.50**
5 st. 12.00




Tulipa sogdiana

(Synoniem: *T. bucharica*)

Geïntroduceerd door de Russische botanicus Alexander Bunge in 1851. Herkomst: Centraal-Azië, voornamelijk in Karakum, Amurdar'ya en Kyzylkum, groeiend op zanderige, stenige bodem.

Nauw verwant aan *Tulipa turkestanica*. De één of twee witte bloempjes zijn niet al te groot en hebben een geel hartje.

Bestelnr. 1142 10 st. 4.95
25 st. 11.50



Tulipa stapfii

Herkomst: West-Iran en Noord-Irak. Vernoemd naar Otto O. Stapf (1857-1933), een botanicus die zijn leven lang het geslacht *Tulipa* bestudeerde.


Donker karmozijnscharlaken, bekervormige bloemen met een donkerviolette vlek in het hart.

Die vlek is soms voorzien van een gele vies.

Het blad is wasachtig met een gegolfde rand.

Nauw verwant aan *T. systola*, soms ook als synoniem gezien.

Bestelnr. 1197 3 st. 3.75
5 st. 6.00




Tulipa subbiflora

Een vrij zeldzame species waarover in de literatuur nog niet veel te vinden is. Inheems in de bergen in Tadzjikistan, nauw verwant aan *T. orythioides*.

De grote witte stervormige bloemen hebben een geel hart tot halverwege de bloemblaadjes en worden door korte steeltjes gedragen. Slechts twee bladeren.

Bestelnr. 9737 10 st. 3.50
25 st. 8.25




Tulipa sylvestris

(Synoniemen: *T. florentina*, *T. repens*,
T. tchitounyi en *T. thirkeana*)

Nederlandse naam: bostulp. Door Carl Linnaeus in 1753 voor het eerst beschreven. Herkomst: Iran, Noord-Afrika en Europa, ook in Nederland, maar waarschijnlijk verwilderd, stinzenplant. Eén, soms twee geurende heldergele 6 tot 8 cm lange bloem(en) met op de buitenste bloemblaadjes een groene gloed. De meeldraden van dit 30-40 cm hoge tulpje zijn geel. AGM in 2008.


Bestelnr. 1144	10 st.	3.50
	25 st.	8.00



Tulipa tarda

Intro: 1933 daarvoor jarenlang met de naam *T. dasystemon* door het leven gegaan. Herkomst: Tien Shan. De vier tot zeven kronkelige en glanzende bladeren vormen een rozet. De tot zes -gemiddeld twee à drie-, stervormige bloempjes staan zo dicht opeen, dat het lijkt alsof ze een trosje vormen. De bloemkleur is wit met een groot geel hart, terwijl de basis aan de buitenzijde bruinachtig paars is. AGM in 1993.


Bestelnr. 1156	25 st.	3.50
	100 st.	13.00



Tulipa tetraphylla

Herkomst: Oost-Tien Shan en China (Dzungaria). Dit 15-20 cm hoge tulpje is nauw verwant aan *T. kolpakowskiana*, maar de bloemen zijn enigszins kleiner, geel van kleur met aan de buitenzijde purperen vlekjes. In 1875 beschreven door Eduard Regel. De naam doet vermoeden dat de *Tulipa* slechts vier blaadjes heeft, maar het kunnen er ook zeven zijn.


Bestelnr. 1158	5 st.	4.00
	10 st.	7.50



Tulipa 'Tiny Timo'

Een aantal jaar geleden werden kruisingen van *T. hageri* x *T. aucheriana* verricht door het Centrum voor Plantveredeling en Reproductie Onderzoek. Daaruit is onder andere dit vrolijke tulpje ontstaan, vernoemd naar Timo, onze bijna vijf jaar oude zoon. Een schitterend laag rood tulpje, waarvan het blauwe hart met een witte zweem verweven is.


Bestelnr. 1182 **10 st. 3.50**
25 st. 8.00



Tulipa turkestanica

Intro: 1875. Herkomst: Centraal-Azië, Turkestan en Noordwest-China. Eén der vroegstbloeiende species. De bladeren zijn grijsgroen van kleur en het 20 cm hoge bloemsteelje is behaard. De wel twaalf spits toelopende witte bloempjes met ovale kroonbladeren zijn voorzien van een schitterend oranjegeel hart. Op de buitenste bloemblaadjes ligt een grijszwarte glans. Na de bloei verschijnen de prachtige zaaddozen. AGM 1993.

Bestelnr. 1160 **25 st. 3.00**
100 st. 11.50



Tulipa 'Velvet Lily'

T. eichleri x *T. acuminata* (?). Een spectaculaire vondst met een robuuste groeiwijze, terwijl het grillige van *T. acuminata* duidelijk aanwezig is. Helderrode bloemen met een zwart hart en gele vlekken op een 30 cm hoge bloemsteel.

Bestelnr. 8261 **5 st. 4.00**
10 st. 7.50



Tulipa vvedenskyi

Vernoemd naar de Russische botanicus en taxonoom A.I. Vvedensky. Herkomst: Kuramin-gebergte, Zuidelijke Tien Shan, tussen Oezbekistan en Noord-Tadzjikistan. Tulpen die nog niet bloeien smaken zoet. Lokaal worden de tulpen door kinderen opgesnoept. Het blad is opvallend zeegroen gekleurd. De grote licht scharlaken tot oranje bloemen, die eind mei hun pracht tonen, hebben een geelbruin hart en paarse helmknoppen.

Bestelnr. 1110 **10 st. 4.50**
25 st. 10.50




Tulipa whittallii

(Synoniem: *T. orphanidea* var. *whittallii*)

Intro: 1929. Herkomst: West-Turkije. Vernoemd naar Edward Whittall die een kwekerij exploiteerde in de buurt van Izmir. De naam werd al in 1920 gebruikt, maar is pas gepubliceerd in 1940. Van dit in april bloeiende tulpje zijn de binnenste bloemblaadjes helder oranje met naar de basis een donkere gloed, de buitenste bloemblaadjes zijn bruingeel met 'n groene gloed; de helmknoppen zijn bijna zwart. AGM in 1999.

Bestelnr. 1146 **10 st. 4.00**
25 st. 9.50



Ergonomische snoeischaar Bahco PX

minder spierpijn, minder vermoeiend en meer comfort.

Gesmeed, Zweeds stalen mes voor een maximale snoeicapaciteit van 20 mm. De ergonomische snoeischaar verhoogt uw comfort, veiligheid en gezondheid. De neerwaartse en zijwaartse messtand houden uw hand en onderarm in een rechte lijn. Daardoor wordt pijn aan pezen en spieren tijdens het snoeien voorkomen. Het snoeimes is aan de binnenzijde hol geslepen, dat vermindert het risico op frictie en vastzitten van takken tijdens het snoeien. De bovengreep is voorzien van een elastomeer coating.

Bestelnr. 4714 **p.st. 49.00**
Bahco PX-S Geschikt voor maximale handlengte van 17 cm.


Bestelnr. 4715 **p.st. 49.00**
Bahco PX-M Geschikt voor maximale handlengte tussen 17 en 20 cm.

Bestelnr. 4716 **p.st. 49.00**
Bahco PX-L Geschikt voor maximale handlengte groter dan 20 cm.

Bestelnr. 4717 **p.st. 54.00**
Bahco PX-ML, linkshandig. Geschikt voor maximale handlengte tussen 17 en 20 cm.



DUK VAN TOL



'Duc van Tol Red and Yellow'

1595

Bestelnr. 1213

3 st.

7.50

5 st.

12.00

De eerste nieuwe kweekvormen van tulpen ontstonden uit wilde soorten, waaronder de variabele *Tulipa schrenkii*. De soorten waren afkomstig uit de Kaukasus en Centraal Azië, vanwaar ze via Iran en Turkije vanaf de tweede helft van de 16de eeuw geleidelijk in het westen werden geïntroduceerd. De kleuren en tekening van de vele natuurlijke variëteiten van *T. schrenkii* zijn in de Duc van Tol Tulpen terug te vinden. Nieuwe aanwinsten werden dikwijls genoemd naar hun kweker. Zo is de naam Du(y)c(k) van Tol afkomstig van Adriaan Duyck uit Oud-Karspel en zijn vrouw Aleid van Tol. De groep behoort tegenwoordig eigenlijk tot de Enkele Vroege Tulpen, maar wordt als een aparte groep beschouwd. Het zijn lage, vroeg bloeiende tulpen waarvan de bloembladen vaak contrasterende kleuren hebben. Ze worden 20-40 cm hoog, maar de meeste halen niet meer dan 25 cm. De oudste soorten zijn de kortste. Hierdoor zijn ze heel geschikt om op potten te kweken, en dat is samen met de vroege bloeitijd waarschijnlijk de reden dat ze nog steeds verkrijgbaar zijn.



'Duc van Tol Primrose'

1700

Bestelnr. 1211

3 st.

7.50

5 st.

12.00



'Duc van Tol Salmon'

1914

Bestelnr. 1217

5 st.

5.95

10 st.

11.00



'Duc van Tol Double'

1830

Bestelnr. 1207

5 st.

5.95

10 st.

11.00



'Duc van Tol Orange'

1700

Bestelnr. 1209

3 st.

7.50

5 st.

12.00

DUC VAN TOL (vervolg)



**'Duc van Tol
Scarlet'**

1850

Bestelnr. 1219

5 st. 5.95
10 st. 11.00



**'Duc van Tol
Cocchineal'**

1700

Bestelnr. 1203

5 st. 5.95
10 st. 11.00



**'Duc van Tol
Red and White'**

1750

Bestelnr. 8351

5 st. 5.95
10 st. 11.00



**'Duc van Tol
Rose'**

1700

Bestelnr. 1215

5 st. 5.95
10 st. 11.00



**'Duc van Tol
White'**

1805

Bestelnr. 1223

3 st. 7.50
5 st. 12.00



**'Duc Van Tol
Max Cramoisie'**

1700

Bestelnr. 1205

15 st. 4.95
30 st. 9.00



**'Duc van Tol
Yellow'**

1700

Bestelnr. 1225

5 st. 5.95
10 st. 11.00



**'Duc van Tol
Violet'**


1700

Bestelnr. 1221

5 st. 5.95
10 st. 11.00



LELIEBLOEMIGE TULPEN



'Ballerina'

1980

Bestelnr. 8309




10 st.
25 st.

3.50
8.25

Leliebloomige tulpen laten zich perfect combineren met vaste planten. Hun elegante bloemen met puntige bloembladen vormen een sierlijk schouwspel.

Volop aanbod van historische cultivars uit deze groep op: www.historicalbulbs.eu

 *Uit ervaringen en diverse proeven is gebleken dat dit soort geschikt is om meerdere jaren te bloeien zonder dat deze na de bloei opgerooid dient te worden. Voorwaarden zijn o.a. dat het loof volledig kan afsterven en de bol op een drogere bodem kan overzomeren. Over het algemeen lukt dat goed tussen de beplanting in de border. Een aanvullende bemesting direct na de bloei is zeker aan te bevelen.*



'Moonlight Girl'

2004

Bestelnr. 8901

10 st. 4.00
25 st. 9.50



'White Triumphator'

1942

Bestelnr. 1373

10 st. 4.00
25 st. 9.50



'Ballade'

1953

Bestelnr. 8649

10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Merlot'


2008

Bestelnr. 9989

10 st. 4.00
25 st. 9.50



DUBBELE LATE TULPEN



Deze pioenbloemige tulpen hebben enorme bloemkronen met een overvloed aan bloemblaadjes. Deze groep kwam pas in het laatste kwart van de zeventiende eeuw in de mode. Fantastisch op de vaas, statige bloemen in de border.

Volop aanbod van historische cultivars uit deze groep op: www.historicalbulbs.eu

'Angélique'

1959

Bestelnr. 1351

10 st.

4.00

25 st.

9.50



'Gerbrandt Kieft'

1951

Bestelnr. 9990

10 st.

4.00

25 st.

9.50



'Mount Tacoma'

<1924

Bestelnr. 1355

10 st.

4.00

25 st.

9.50



'Black Hero'

1984

Bestelnr. 8301

10 st.

4.50

25 st.

10.75



'Orange Princess'

1983



Bestelnr. 9530

10 st.

4.50

25 st.

10.75



'Carnaval de Nice'

1953

Bestelnr. 1921

10 st.

4.00


25 st.

9.50



DUBBELE VROEGE TULPEN

-Premium Murillo Mix-



Bestelnr. 9991	10 st.	4.00
	25 st.	9.50

De meeste Dubbele Vroege Tulpen zijn voornamelijk voortgekomen uit de stevige Murillo uit 1860. De bloemen zijn breder dan dat ze hoog zijn, met een volle bos bloembladen waardoor zij een uitbundig karakter hebben. Prima te gebruiken in potten en goed te combineren met voorjaarbloeiers zoals vergeet-mij-niet en violen.

Volop aanbod van historische cultivars uit deze groep op: www.historicalbulbs.eu



'Caravaggio'
1960

Bestelnr. 9992	10 st.	4.00
	25 st.	9.50



'Jan Steen'
1943

Bestelnr. 9993	10 st.	4.00
	25 st.	9.50



'Vincent'
2003

Bestelnr. 9995	10 st.	4.00
	25 st.	9.50




'Gerard Dou'
1960

Bestelnr. 9994	10 st.	4.00
	25 st.	9.50



PARKIET TULPEN



'Green Wave'

1984

Bestelnr. 1367

10 st.
25 st.

4.75
11.25

Parkiet Tulpen zijn bekend sinds 1665. De bizarre bloemvormen met hun grillig gedraaide bloemblaadjes zijn ontstaan als spontane mutaties. Omdat de bloemen zelf zo uitbundig zijn, is het wellicht mooi wanneer ze iets verder uit elkaar worden gepland met fijnbladige bladplanten ertussen.



'Blue Parrot'

1937

Bestelnr. 9997

10 st. 4.50
25 st. 10.75



'Estella Rijnveld'

1954

Bestelnr. 8909

10 st. 4.50
25 st. 10.75



'Orange Favourite'

1930



Bestelnr. 9996

10 st. 4.50
25 st. 10.75



'Black Parrot'


1937

Bestelnr. 1361

10 st. 4.50
25 st. 10.75



VIRIDIFLORA TULPEN



'Spring Green'

1969



Bestelnr. 1363

10 st.
25 st.

3.50
8.25

Een in 1981 ingestelde groep waartoe tulpen met groene bloemen of groene tekeningen behoren. Al in 1613 werd door illustrators de groene tekeningen op de bloembladen opgemerkt. Vanwege het subtiele groen laat deze groep tulpen zich perfect combineren met uitbundig bloeiende vaste planten.



'Green Jay'

2010

Bestelnr. 9739

10 st. 4.75
25 st. 11.25



'Greenstar'

2009

Bestelnr. 9740

10 st. 4.50
25 st. 10.75



'Flaming Springgreen'

1999



Bestelnr. 9528

10 st. 5.95
25 st. 14.50



'China Town'


1988

Bestelnr. 8303

10 st. 4.75
25 st. 11.25



FOSTERIANA TULPEN



'Flaming Purissima'

1999

Bestelnr. 9346



10 st.

25 st.

3.50

8.25

Interessant vanwege de vroege bloei en de daarbij behorende lengte van de bloemsteel.
De beste resultaten voor de meerjaren bloei zijn wel behaald met deze groep.



'Purissima'

1943



Bestelnr. 9348

10 st.

3.00

25 st.

7.00



'Sweetheart'

1976



Bestelnr. 9999

10 st.

3.50

25 st.

8.25



'Orange Emperor'

1962



Bestelnr. 9998

10 st.

3.00

25 st.

7.00



'Exotic Emperor'

2001



Bestelnr. 8321

10 st.


3.50

25 st.

8.25



ENKELE LATE-, TRIUMF- EN DARWIN TULPEN



'Angel's Wish'

2007

Bestelnr. 9527

10 st.

3.50

25 st.

8.25

De eenvoud zelfe! De klassieke bloemvorm, zoals we een tulp kennen en zouden tekenen.



'Shirley'

1968



Bestelnr. 6004

10 st.

3.50

25 st.

8.25



'Rem's Favourite'

2000

Bestelnr. 8305

10 st.

4.50

25 st.

10.75



'Synaeda Amor'

1997

Bestelnr. 6003

10 st.

3.00

25 st.

7.00



'Hemisphere'

1999

Bestelnr. 6002

10 st.

3.50

25 st.

8.25

ENKELE LATE-, TRIUMF- EN DARWIN TULPEN (vervolg)



'Salmon Dynasty'

2006

Bestelnr. 9743

10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Prinses Margriet'

1960

Bestelnr. 6001

10 st. 3.00
25 st. 7.00



'Prinses Irene'

1949

Bestelnr. 9356

10 st. 3.00
25 st. 7.00



'Negrita'

1970

Bestelnr. 9741

10 st. 3.50
25 st. 8.25



'Couleur Cardinal'

1845

Bestelnr. 8307

10 st. 3.00
25 st. 7.00




'Queen of Night'

1944

Bestelnr. 1917

10 st. 3.00
25 st. 7.00

 *Uit ervaringen en diverse proeven is gebleken dat dit soort geschikt is om meerdere jaren te bloeien zonder dat deze na de bloei opgerooid dient te worden. Voorwaarden zijn o.a. dat het loof volledig kan afsterven en de bol op een drogere bodem kan overzomeren. Over het algemeen lukt dat goed tussen de beplanting in de border. Een aanvullende bemesting direct na de bloei is zeker aan te bevelen.*

MEER TULPEN OP WWW.PC-NIJSSEN.NL

ONS AANBOD GROEIT VERDER OP HET WEB



Top 10 tuinboeken

Samen met Boekhandel H. de Vries uit Haarlem hebben wij een top tien samengesteld van onze keuze tuinboeken. Van een roman over de Tulpomanie tot een praktisch boek over je eigen groentetuin op 1 m².



Ambiente

Stijlvolle, kwalitatief hoogwaardige servetten en een uitgebreide collectie bijpassende tafelaccessoires.



Beking & Blitz Museum collectie

Dubbele wenskaarten met enveloppen, los of in prettig geprijsde verzamelmappjes.

O.a. kaarten met de schitterende tekeningen van wetenschappelijk illustrator en botanisch kunstenaar Anita Walsmit Sachs.



Tuinbenodigheden

Handige kweekmaterialen, steetiketten, turfpotjes en kweekkasjes van Nortene. Maar ook Kixx kwaliteitshandschoenen en o.a.

SlakkenSchrik® koperproducten om slakken te weren uit de tuin.



ONS AANBOD GROEIT VERDER OP HET WEB

Historische bol- en knolgewassen

Sinds jaar en dag is ons aanbod van historische bol- en knolgewassen toonaangevend. Nergens is zo'n collectie verkrijgbaar als bij ons. Door het kweken en opbouwen van een eigen assortiment, al bijna 200 historische tulpenrassen en de samenwerking met diverse liefhebbers en specialisten, is het aanbod uniek te noemen. U kunt de collectie uitgebreid bekijken en bestellen op www.historicalbulbs.eu



Narcissen-site.nl

Een enorme collectie van zelden aangeboden narcissen. Een verleidelijke site voor de ware narcissenliefhebber. Er bestaan meer cultivars van narcissen dan van tulpen! Door een plezierige samenwerking met Kwekerij H.M. Meeuwissen biedt deze site ons de mogelijkheid u een aanbod van ruim 200 onbekende, meestal niet commerciële rassen te presenteren. Veelal bestelbaar in kleine hoeveelheden, dus ideaal voor de verzamelaar. Regelmatig wordt op de website een narcis in het zonnetje gezet. www.narcissen-site.nl



GENIETEN VAN ROZEN

100% biologische rozen van Rozenkwekerij de Bierkreek.

Gezonde rozen, is het uitgangspunt geweest bij het samenstellen van dit aanbod. Ruim 70 soorten krachtige rozen, geselecteerd op hun hoge resistentie tegen meeldauw en blackspot. Natuurlijk is de schoonheid, toepasbaarheid en niet te vergeten de geur zeker van invloed geweest op onze keuze.



Biologisch gekweekte rozen zijn sterker, hebben meer weerstand en zijn minder opgejaagd met kunstmest, waardoor ze beter vertakt zijn en een sterker wortelgestel hebben.

Bij de teelt is er géén gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. De controle hierop gebeurt door SKAL www.skal.nl



Skal NL-BIO-01/18383

Als introductieaanbod worden de rozen begin november **franco verzonden** naar een afleveradres in Nederland en ontvangt u **gratis rozenmest** vanaf drie bestelde rozen!

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Leveringen geschieden uitsluitend binnen de Europese Unie.
2. Op alle leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.
3. De prijzen, in euro's, zijn inclusief BTW en gelden tot 30-11-2013.
4. Verzending geschiedt via PostNL of een andere pakketdienst. Voor vrachtkosten en verpakking brengen wij per bestelling kosten in rekening. Bij bestellingen boven de € 125.00 met een afleveradres in Nederland nemen wij deze kosten voor onze rekening. Voor een actueel overzicht van de verzendkosten kunt u onze website raadplegen. Verzending geschiedt op eigen risico koper, hetgeen u kunt onderwerpen door een transportverzekering af te sluiten.
5. De ondergrootte bedraagt minimaal € 35.00, exclusief verzendkosten. Nabestellingen worden als een nieuwe order beschouwd.
6. In ons assortiment bevinden zich enige soorten die schaars zijn, hetgeen in de tekst(en) wordt aangegeven. Daarom worden bestellingen in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien er een artikel mocht zijn uitverkocht, geldt het overige door u bestelde als zijnde de definitieve bestelling.
7. Bol- en knolgrootte: wij leveren uitsluitend eerste grootte, tenzij anders in deze catalogus wordt aangegeven.
8. Bij iedere bestelling treft u een cultuurbeschrijving per species, cultivar of hybride aan. We verzoeken u de aanwijzingen op te volgen.
9. Er worden geen soorten geremplaceerd.
10. Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.
11. Eventuele klachten, voor wat betreft gebreken en tekorten, moeten binnen vijf dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten) schriftelijk worden gemeld. Uw email kunt u richten aan: service@pcnijssen.nl of een briefje per post aan ons correspondentieadres vermeld op pagina 1. Klachten over vermeende soortonechtheid, tijdens de aanvang van de bloei waargenomen, dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld. Een vergoeding zal nooit meer bedragen dan de factuurwaarde. Voor hergroei kunnen wij niet instaan.
12. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van het pakket (de pakketten), dan wel uiterlijk binnen elf dagen na verzending daarvan, op één van de op de factuur vermelde bankrekeningnummers. Degenen, die ons eenmalig machtigen het factuurbedrag automatisch te incasseren, kunnen de afschrijving binnen acht dagen na factuurdatum verwachten. Bij overschrijding van de vermelde termijn is de koper vanaf de datum van verzending een half procent rente per maand verschuldigd over de koopprijs, waarbij een gedeelte van de maand geldt als zijnde een hele maand.
13. Al onze op de invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten zullen vijftien procent van de hoofdsom bedragen, zulks met een minimum van € 40.00. Bij een herinnering wordt € 2.50 en bij een aanmaning wordt € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht.
14. Alle geschillen, voortvloeiende uit onze leveranties, dan wel voortvloeiende uit de toepasselijkheid van onze leveringsvoorwaarden, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem en in beroep de in dat Arrondissement bevoegde beroepsrechter.
15. Zonder opgave van redenen kunnen wij een order weigeren, dan wel weigeren uit te voeren. Wanneer aan de financiële gegoedheid wordt getwijfeld, kunnen wij een vooruitbetaling eisen.
16. Bij het plaatsen van uw bestelling wordt aangenomen, dat u volledig met voornoemde voorwaarden akkoord gaat.