

V= aanwezig zonder bloemen; B = aanwezig met bloemen; B/V = aanwezig, niet genoteerd of bloeit; - = niet genoteerd.

Datum	4	3	0	8	0	4	8	0	Onderscheidend kenmerk	wetenschappelijke naam
	m	a	m	a	a	a	m	m		
	r	p	e	p	p	p	r	r		
	t	r	i	r	r	r	t	t		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	1	1	1	1	1	0	0		
	9	7	5	2	1	0	9	8		
aardbei, Schijn-	V		B							<i>Potentilla indica</i>
andoorn, Bos-	V									<i>Stachys sylvatica</i>
anemoon, Gele	B									<i>Anemone ranunculoides</i>
Appelboom				B					Loofboom	<i>Malus spec.</i>
Appeltjesblad		V							Groenblijvende struik van 60 tot 80 cm hoog. Vaak in boeketten gebruikt	<i>Gaultheria shallon</i>
aronskelk, Gevlekte	V									<i>Arum maculatum</i>
balsemien, Spring- (Reuzenbalsemien)	V			V		V		B/V	opvallende 2-5 cm grote lila, roze, lichtgele of witte bloemen. Bloemen in trossen van 2 tot 14 bloemen	<i>Impatiens glandulifera</i>
Bamboe		V		V			V		De stengels bestaan uit dichte parallelle vezelbundels, ze zijn van binnen hol en worden op regelmatige afstanden onderbroken door knopen waar de bladeren aanhechten.	<i>Tribus spec.</i>
Berberis, Zuurbes		V								<i>Berberis gagnepainii</i>
bereklaau, Grote				V	V	V			witte bloemen in scherm, stengel niet roodgevekt, onderste bladeren enkelvoudig en ondiep handlobbig, de hogere enkelvoudig	<i>Heracleum sphondylium</i>
bereklaau, Reuze		V							De rechtopstaande stengels zijn gegroefd en rood gevekt.	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
bes, Aal-	V									<i>Ribes uva-crispa</i>
bes, Kruis-	V									<i>Ribes rubrum</i>
Berberis, Zuurbes	V									<i>Berberis vulgaris</i>
Beuk		V	V	V					Loofboom tot 46 m hoog; stam is glad en grijs. Stam is gevoelig voor plotse blootstelling aan zonlicht en schorsbrand. Het blad is veernervig,	<i>Fagus sylvatica</i>
beuk, Driekleurige		V							Bruinrood blad met roze rand	<i>Fagus sylvatica</i> var. <i>roseomarginata</i>
beuk, Treur-				V					Loofboom, hangende takken	<i>Fagus sylvatica</i>
Beverboom		B								<i>Magnolia spec.</i>
biggenkruid, Gewoon	V									<i>Hypochaeris radicata</i>
blaasjeskruid, Groot		V								<i>Utricularia vulgaris</i>
boterbloem, Knol-			B							<i>Ranunculus bulbosus</i>
boterbloem, Kruipe	V									<i>Ranunculus repens</i>
boterbloem, Scherpe	V	V				V			gele bloem	<i>Ranunculus acris</i>
braam, Gewone	V	V	V							<i>Rubus fruticosus</i>
brandnetel, Grote	V	V	V	V	V	V			groene bloem, blad en stengel behaard. Grote brandnetel heeft okselstandige hangende bloemaren, bij kleine brandnetel staan ze	<i>Urtica spec</i>
ceder, Atlas-		V								<i>Cedrus atlantica</i>
Brem	V									<i>Cytisus scoparius</i>
ceder, Wierook-		V								<i>Calocedrus decurrens</i>
cipres, Dwerg-				V						<i>Chamaecyparis obtusa pygmaea</i>
cipres, Japanse		V								<i>Cryptomeria japonica</i>
cipres, Moeras-		V	B		V				bladverliezende naaldboom, naar beneden toe loopt stam in brede geplooid voet uit. Aan langloten, schubvormige naalden, radiaal spiraalvormig. Kegels zijn ovaal-rond,	<i>Taxodium distichum</i>
Chinees klokje	B									<i>Forsythia</i>
Dalkruid		B	B							<i>Maianthemum bifolium</i>
den, Oostenrijkse siertuin		V	B							<i>Pinus nigra, subsp. nigra</i>
den, Parasol-				V					Conifeer, met paraplu of parasolvormige kroon	<i>Pinus pinea</i>
den, Japanse parasol- of Kransspar		B							De dubbelnaalden staan in kransen	<i>Sciadopitys verticillata</i>

Distel * zie onder voor sleutel						V						spec
distel, Krul-	V										hoofdjes alleenstaand of tot maximaal 5 bij elkaar, omwindselblaadjes afstaand, stekels	<i>Carduus crispus</i>
distel, Speer-				V							paarse bloemen in 3-5 cm lange hoofdjes die onder de paarse bloempjes zijn ingesnoerd, bladrozet, bladeren sterk ingesneden, onderzijde blad is kort tot spinnenwebachtig	<i>Cirsium vulgare</i>
Dotterbloem siertuin			B									<i>Calthe palustris</i>
dovenetel, Bonte gele	V	B	B	B	B	V	V	B/V			gele lip bloem, bladen vooral in het topdeel met vele vrij grote witte of zilverige vlekken	<i>Lamiastrum Galeobdolon subsp. Argentatum</i>
dovenetel, Gele siertuin			B									<i>Lamiastrum galeobdolon</i>
dovenetel, Paarse	B	B	B		B						roze tot paarse lipvormige bloem. Lichtgroene driehoekige, behaarde bladeren. Nectar is in trek bij bijen en hommels. Zaden worden door	<i>Lamium purpureum</i>
dovenetel, Witte		B										<i>Lamium album</i>
druif, Blauwe					B						blauwe bloem, druifjes	<i>Muscari botryoides</i>
Duizendblad	V		V		V						roze bloempjes, dubbel veerdelig blad	<i>Achillea millefolium</i>
duizendknoop, Japanse					V						cremewitte, rozewitte bloempjes, lange holle stengel met zijtaken en 5-12 cm grote	<i>Fallopia japonica</i>
Eenbes siertuin			B									<i>Paris quadrifolia (RL)</i>
eik, Japanse keizer-				V				B/V			blad is groot 10 tot 40 cm en 15 tot 30 cm breed, met licht gelobde rand	<i>Quercus dentata</i>
eik, Kurk-								B/V			groenblijvende eik; ruwe schors met richels, bladeren eivormig en spits, 5 tot 6 ondiepe stekelpuntige lobben, blad onderzijde dicht	<i>Quercus suber</i>
eik, Libanon								B/V				<i>Quercus libani</i>
eik, Turners	V											
eik, Zomer-		B	V	V							Loofboom, blad is onregelmatig gelobd, bladdeel is kort	<i>Quercus robur</i>
Elfenbloem		B										<i>Epimedium perralchicum Frohnleiten</i>
Enkianthus		B										<i>Enkianthus campanulatus</i>
ereprijs, Draad-			B									<i>Veronica filiformis</i>
ereprijs, Gewone	B	B	B								2 rijen haren langs stengel	<i>Veronica chamaedris</i>
ereprijs, Klimop-	B	B	B	B	B						lichtblauw of lila bloemen alleenstaand of soms 2 bijelkaar in oksel van blad. Blad in omtrek	<i>Veronica hederifolia</i>
esdoorn, Gewone	V	V										<i>Acer pseudoplatanus</i>
esdoorn, Japanse		B										<i>Acer japonicum cv aconitifolium</i>
esdoorn, Japanse											verschillende variëteiten	<i>Acer palmatum, A. japonicum</i>
Fijnstraal	V											
Fluitekruid	V	B	B	V	V	V					witte bloempjes in scherm, 2 tot 3 voudig geveerd blad, stengel is hol en gegroefd	<i>Anthriscus sylvestris</i>
framboos, Pracht	V	V				V	B/V	B/V			roze bloemen op nog kale takken, struiken	<i>Rubus spectabilis</i>
Geranium						V						<i>Geranium spec</i>
Gingko siertuin			V									<i>Ginkgo biloba</i>
glaskruid, Groot	V	V	V	V	V	V	V	B/V			groene bloemen met gele meeldraden, soort kluwens in de bladoksels, meestal met 4. holle stengel, bladeren langwerpig eirond,	<i>Parietaria officinalis</i>
glaskruid, Klein siertuin			B								De liggende, opstijgende of soms rechtopstaande stengels zijn gevuld, dicht behaard, sterk vertakt en vaak dieprood van	<i>Parietaria judaica (beschermd)</i>
Goudaardbei		V									Bodembedekker. Bladhoudend in de winter.	<i>Waldsteinia ternata</i>
gouwe, Stinkende siertuin			B	V		V					kleine gele bloemen en op eikenblad gelijkende bladeren. Oranje geel melksap	<i>Chelidonium majus</i>
gras, Lies-	V											<i>Glyceria maxima</i>
gras, Schaduw-		V										<i>Poa nemoralis</i>
gras, Straat-	B											<i>Poa annua</i>
havikskruid, Oranje						V					oranje bloemen in trossen (2 tot 12 hoofdjes); behaarde stengel en bladeren, spatelvormige bladeren met klierharen. Boven en ondergrondse wortelstokken waardoor dichte	<i>Hieracium Aurantiacum</i>
hazelaar, Schijn-Heermoes		B										<i>Corylopsis pauciflora</i>
helmbloem, Rankende		V					B/V				plant is kruipend of klimmend, bleekgele spiegelsymmetrische bloemen, bloemen lijken	<i>Ceratocarpus claviculata</i>
helmkruid, Voorjaars-siertuin			B	B	B			B/V			geel/groene bloemen, plant 15-80 cm hoog	<i>Scrophularia vernalis</i>



Look zonder Look	V	B	B	V		V		B/V	witte bloemen met 4 kroonbladeren, lange hawen, bovenste bladeren hartvormig en <del>geheelmatig getand</del>	<i>Alliaria petiolata</i>
maagdenpalm, Kleine	B	B	B	B		B	B	B/V	blauw-paarse bloemen met 5 kroonbladen, groenblijvende lage struik, bladeren tegenoverstaand, breed lancetvormig tot ovaal	<i>Vinca minor</i>
Madeliefje	B	B	B	B	B	B			bloemen met witte straalbloemen en geel hart van buisbloemen, bladeren in wortelrozet en <del>soeteluumig</del>	<i>Bellis perennis</i>
Mansbloed	V									<i>Hypericum androsaemum</i>
meidoorn, Tweestijlige	V	V								<i>Crataegus laevigata</i>
Muizenoor	V									<i>Hieracium pilosella</i>
munt, Water-	V	V			V				roodachtig lila lipbloemen, in bolvormige trossen in een of twee schiinkransen	<i>Mentha aquaticum</i>
Muskuskruid				B					grondstandige bladeren lang gesteeld, grasgroene bloemen, 5-7 bijeen in een <del>dekselsteunachtig hoofdje</del>	<i>Adoxa moschatellina</i>
muur, Grote siertuin			B							<i>Stellaria holostea</i>
muur, Drienerf-	B		B	B					wit bloempje, klekbladen langwerpig en spits, kroonbladen korter dan kelkbladen. Stengel <del>liggend en aartijsdend, rondom behaard</del>	<i>Moehringia trinerva</i>
muur, Vogel-	B		B		B				witte bloem, vijf kroonbladen, zeer diep ingesneden, kelkbladen zijn even lang als <del>kelkbladen, steunende, flet, kant behaard</del>	<i>Stellaria media</i>
Muursla	V	V		V	V				bleek gele bloemen, bloemhoofdjes zijn vijf bloemig. Hoofdjes op vertakte stengels. Onderste bladeren zijn gesteeld en liervormig	<i>Mycelis muralis</i>
nagelkruid, Gewoon	V	B			V				gele bloem	<i>Geum spec.</i>
Narcis	B	B				B	B		Verskillende variëteiten	<i>Narcissus spec.</i>
narcis, Dichters-		B		B	B		B	B/V	stinzenplant, Wit met kleine oranje trompet, <del>lekkere geur</del>	<i>Narcissus poeticus</i>
narcis, Wilde	B					B	V		stinzenplant, lichtere kelkbladeren en donkere kroon	<i>Narcissus pseudonarcissus subsp. Pseudonarcissus</i>
ooievaarsbek, Donkere	V	B	B				V		bloemen donkerpaars	<i>Geranium phaeum</i>
ooievaarsbek, Zachte	V									<i>Geranium</i>
ossentong, Gewone siertuin		B	B							<i>Anchusa officinalis</i>
Paardenbloem		B	B	B		V			gele straal en gele buisbloemen, bladrozet met ingesneden bladeren,	<i>Taraxacum officinale</i>
Parelstruik		B								<i>Exochorda racemosa</i>
Pinksterbloem	V	B	B	B	B	V			lila tot witte bloem, wortelbladen in rozet, stengel is hol, rolrond tot iets kantig, blaadjes 4 tot 7 <del>parig</del>	<i>Cardamine Pratensis</i>
Roberts kruid	V	B	B					B/V	roze bloemen (2 cm), vijf eironde kelkbladen. Bladeren zijn driehoekig en een of tweemaal geveerd. Bladeren zijn drie tot vijftalig	<i>Geranium robertianum</i>
Rhododendron		B	B	V					struiken met gespreid staande bladeren, blad is <del>gaafrandig</del>	<i>Rhododendron spec.</i>
salomonszegel, Gewone siertuin			B							<i>Polygonatum multiflorum,</i>
sierkwee, Japanse	B									
Slangenden of apenboom			V	V					Conifeer van Chili, de naalden zijn schubachtig, dik, driehoekig en scherp. Symmetrisch <del>vertakte takken</del>	<i>Araucaria araucana</i>
Sleedoorn	B									<i>Prunus spinosa</i>
sleutelbloem, Gulden siertuin			B							<i>Primula veris (RL)</i>
smeerwortel, Gewone	V		B							<i>Symphytum officinale</i>
Sneeuwbal										<i>Viburnum tinus</i>
Sneeuwbes	V									<i>Symphoricarpos albus</i>
sneeuwlokje, Gewoon	B				B	V	B	B/V	stinzeplant,	<i>Galanthus nivalis</i>
sneeuwlokje, Glanzend	V									<i>Galanthus ikariae</i>
sneeuwlokje, Groot							V		stinzeplant, Heeft ook een groene vlek op kroon	<i>Galanthus elwesii</i>
sneeuwlokje, Kaukasisch							B	B/V	Groter dan gewone en blauwig en breed blad, in het klokje zit ook bovenaan het <del>bloembladje groene kleur</del>	<i>Galanthus caucasicus</i>
Sneeuwlokje				V						<i>Galanthus spec.</i>
Sneeuwlokjesboom										<i>Halesia carolina</i>
sneeuwroem, Kleine	B									<i>Chionodoxa sardensis</i>
Sneeuwroem						B	B		stinzenplant, blauwe bloemblad heeft kapvormige top; de bladen gaan boven de <del>grond uit elkaar (op steel)</del>	<i>Chionodoxa spec</i>
spar, Westerse hemlock-		V								<i>Tsuga heterophylla</i>
spar, Kaukasische		V	B							<i>Picea orientalis</i>
Speenkruid	B	V	V	B	B	B	B	B/V	geel bloemetje, wortel heeft speenvorm en okselknolletjes	<i>Ranunculus ficaria</i>



zuring, Ridder-	V	V																<i>Rumex obtusifolius</i>	
zuring, Schapen-	V	V	B															<i>Rumex acetosella</i>	
zuring, Veld-	V	V	V				V											rode bloemen in losse en enkelvoudige pluim, balderen zijn langwerpig en hebben voetslippen die in tweeën gespleten zijn. Bladeren van bladrozet gesteeld, langs de stengel ongesteeld, voetslippen	<i>Rumex acetosa</i>
Aantal planten B	27	44	58	23	24	13	16	27											
Aantal planten V	67	53	19	30	17	29	16	25											
Totaal aantal planten	94	97	77	53	41	42	32	52											
Datum	Bijzondere waarnemingen																		
30-3-2008	2 eekhoorns, phtoftera op rododendron																		
29-3-2009																			
4-4-2010																			
10-4-2011																			
7-4-2012	kleine muisjes vluchtend in de dode bladeren, buizerd																		
10-5-2015																			
23-4-2017	goudvliesbundelzwam op dode beuk, ooievaar op nest																		
24-3-2019	ooievaarspaar op nest, halsbandparkiet, roest op speenkruid, judasoor op peterselievlier, groene specht																		

#### Andere wetenswaardigheden

Paarden grazen op de helft van het veld en op de andere helft poepen ze en daar groeit van alles. Koeien poepen overal en rondom de vlaaien eten ze niet dus zie het veld. Schapen poepen overal, maar dat geeft geen specifiek kenmerk in het landschap.

Rode bloempjes op de grond blijken van de larix te komen

Huisje links was de ziekenboeg voor de dieren van Blaauw

\* <https://www.wildebloemen.info/pages%20sleutels/sleutel%20distels.php>







**Habitat of opmerkingen**

mooi in bloei.

Plant groeit graag langs water, bodem stikstofrijk en basisch. Verspreiding van zaden mechanisch, bij aanraking rijpe vrucht, rollen 5 delen zich op en schieten zo de zaden weg.

Bamboe is een van de snelst groeiende planten. In de Chinese cultuur wordt de bloei van Bamboe gezien als een slecht teken. Bamboe in Chinese schilderijen . worden daarom vrijwel nooit afgebeeld in de bloeitijd. Voedsel van de reuzenpanda.

vochtige zeer voedselrijke grond op licht beschaduwde plaatsen

beukenootjes worden omsloten door een napje. Op vochthoudende, goed doorlatende en kalkrijke leemhoudende grond.

waterplant

Variant onbekend

aan de top van brandhaar zit een weerhaakje dat in de huid komt vast te zitten, daarbij breekt top eraf en komt een mengsel van stoffen vrij die brandende en langdurige pijn veroorzaken.

ademwortels, stam is roodbruin en spiraalsgewijs draaiend. Schors heeft neiging te schilferen en is vezelig

De zaden van de kegel zijn pijnboompitten



Variant onbekend
<p>tweejarige plant, in eerste jaar vormt de wortel en het bladrozet en in het tweede jaar de bloem en vruchten. Plant is rijk aan nectar en wordt bezocht door honingbij (akker)hommels en vlinders. De speerdistel is de nationale plant van Schotland.</p>
is een verwilderde tuinplant
<p>in wegbermen, parkranden, tuinen; voorkeur voor schaduw. Bloemen lokken bijen en hommels, De zaden worden door mieren verspreid.</p>
aangeplant
op voedselrijke en verstoorde grond; werd vroeger gebruikt bij de bierbereiding; medicinale plant, onder andere tegen verkoudheid
invasieve exoot, op voedselrijk vochtige bodem langs beken en rivieren, staat het liefst in volle zon.
Quercus dentata; heeft heel groot blad
groenblijvend
bladeren verteren moeilijk wat invloed heeft op de strooisellaag in het bos. Eiken worden voornamelijk verspreid door Gaai en
op open, droge en voedselrijke grond in akkers, bermen en graslanden en in lichte loofbossen
van stengel kun je fluitjes maken.
Deze diende als beschutting voor t wild; daarna konden ze dat dan doodschieten en opeten; van de vruchten kun je lekkere saus maken
Variant onbekend
tussen struikgewas en op beschutte omgewerkte grond aan de voet van muren, rotsen, bosranden, heggen, loofbossen, onder stoeptoosters en aan trottoirkanten
langs heggen en op ruige plaatsen
tussen het gras op droge tot vrij vochtige, iets zure plaatsen, zonnig. Bezocht door vlinders, kleine vos, morgenrood en kleine parelmoervlinder
zure, droge tot vrij natte plaatsen in bossen. Zaadverspreiding door mieren

langs het water
op vochtige tot natte plaatsen, langs slootkant.
langs slootkant, blad met wit pluis
schaduw, in allerlei begroeiingen. Allerlei solitaire bijen, zoals andoornbij, bosmetselbij. Medicinaal, werkt bij jeuk door brandnetels
waterplant
voor de mens zijn de bessengiffig voor de vogels niet.
Veel planten zijn waarschijnlijk kruisingen van <u>Wilde hyacint</u> ( <i>S. non-scripta</i> ) en <u>Spaanse hyacint</u> ( <i>S. hispanica</i> ).
op vochtige, voedselrijke, beschaduwde plaatsen
oeverplant, wortelstok is smaakmaker van diverse gerechten. Kan giftig zijn in grote hoeveelheden
alle delen voor mensen giftig.
wordt verspreid door harige dieren, zowel in de zon als schaduw, voedselrijke vochtige bodem
er zijn 25 soorten
in loofbossen en tuinen. In de grond een kruipende wortelstok.
in eiken-haagbeukenbos, schaduwrijk, Na drogen ruikt het lekker en het werd tussen de lakens gelegd; kruipende wortelstok
oeverplant; zaden zitten als rolletje munten opgestapeld in driekantige zaaddozen, deze blijven drijven door luchtholten. Lissnuitkever leeft van de sappen van de gele lis, de larve van deze kever leeft van en in de zaden
Stinsenplant, bestoven door sachembij, geneesmiddel voor longen
groeiplaats: in schaduwrijke loofbossen, humus en kalkrijke grond. sterke uien lucht. In tuinen afweermiddel tegen katten.

vochtige voedselrijke grond in loofbossen, langs bospaden en beken.liefst enigszins in schaduw. Ruikt naar uien en/of knoflook
Stinsenplant, bloeien hele jaar door.
bloeit hele jaar door; keltische sagen: fee Milka zou de zoon van de koning stiekem madeliefjes te eten hebben gegeven waardoor hij nooit volwassen zou worden. symbool van maagdelijkheid
langs slootkant, in het water en natte weilanden; bladeren ruiken naar pepermunt. Je kan er thee meezetten.
Op vochtige, matig voedselrijke grond in loofbossen, beekoevers en beschaduwde bermen
op droge, matig voedselarme grond in loofbossen en onder struikgewas
typische onkruid, vaak een van de eerste die kiemt na een schoffelbeurt. Voliere houders geven plant als groenvoer aan vogels
Op vochtige, beschaduwde plekken, in bossen, op muren en knotwilgen.
waarschijnlijk geel nagelkruid
Deze komen uit tuincentrum
narcissus poeticus
standplaats in bos in de schaduw, vochtige voedselrijke grond
stinzebegeleider; groeit in schaduw langs wandelpaden in loofbossen, vrucht lijkt op snavel van kraanvogel
naam (Monkey puzzle tree) afkomstig van een van de eerste westerlingen die de vreemde bomen zag zei: Climbing this tree would puzzle a monkey.
smal blad
Breed blad
onbekende soort
blad aan steel
tegen scheurbuik (vitamine C)

Stinzeplant. Drie blaadjes, dus niet bifolia. Het bloempje hangt en is helemaal blauw, sneeuwroem heet een wit hartje.
op droge tot matig vochtige en zure grond in schrale graslanden, bermen en vergraste heide, zaden hebben mierebroodje
natte, voedselrijke grond in loofbossen en langs sloten en beken.
Zaadjes kiemen in de herfst, plantjes blijven in de winter groen en bloeien in het daaropvolgende voorjaar.
Variant onbekend
giftige plant, blad onderzijde grijs behaard; hommels moeten in de bloem kruipen om hier de nectar te komen. Soms wordt een gaatje in aan beschaduwde slootkanten of onder heggen op rijke en vochtige grond. Medisch: tegen hoesten, kinkhoest, reumatische klachten.
giftig voor dieren behalve edelhert. Van bloesem siroop maken, vruchten voor jam. San. vlierhessenienever
Heeft veel fijner blad dan de gewone vlier (staat links van ingang siertuin)
op vochtige plaatsen, langs slootkanten, veel licht. Waardplant voor een wants en dagvlinders
zeldzaam, grondmatig voedselarm, iets humeuze zandgrond. Zonnig
op open, droge, voedselrijke grond, eetbaar; komt uit Cuba; Duits: Kubaspinat
de vruchten zijn balletjes zoals plataan heeft
sterke wortelstokken; langs waterkant en in vochtige bossen. Zaad heeft mierenbroodje.
beschaduwde plaatsen in heggen, tuinen, wegbermen en vochtige bemeste grond
rode lijst soort, moerassige weilanden, natte bossen, langs rivieren tussen het riet

